

Fórmulas de Cálculo Diferencial e Integral VER.6.8

Jesús Rubi Miranda (jesusrubim@yahoo.com)
http://www.geocities.com/calculusjrm/

VALOR ABSOLUTO

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$$|a| = |-a|$$

$$a \leq |a| \text{ y } -a \leq |a|$$

$$|a| \geq 0 \text{ y } |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$$

$$|ab| = |a||b| \text{ ó } \left| \prod_{k=1}^n a_k \right| = \prod_{k=1}^n |a_k|$$

$$|a+b| \leq |a|+|b| \text{ ó } \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$$

EXPONENTES

$$a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

$$\frac{a^p}{a^q} = a^{p-q}$$

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

$$(a \cdot b)^p = a^p \cdot b^p$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$$

$$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$$

LOGARITMOS

$$\log_a N = x \Rightarrow a^x = N$$

$$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a N^r = r \log_a N$$

$$\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a} = \frac{\ln N}{\ln a}$$

$$\log_{10} N = \log N \text{ y } \log_e N = \ln N$$

ALGUNOS PRODUCTOS

$$a \cdot (c+d) = ac+ad$$

$$(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$$

$$(a+b) \cdot (a+b) = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b) \cdot (a-b) = (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(x+b) \cdot (x+d) = x^2 + (b+d)x + bd$$

$$(ax+b) \cdot (cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$

$$(a+b) \cdot (c+d) = ac+ad+bc+bd$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a-b) \cdot (a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$$

$$(a-b) \cdot (a^3 + a^2b + ab^2 + b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a-b) \cdot (a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4) = a^5 - b^5$$

$$(a-b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$(a+b) \cdot (a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$$

$$(a+b) \cdot (a^3 - a^2b + ab^2 - b^3) = a^4 - b^4$$

$$(a+b) \cdot (a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4) = a^5 + b^5$$

$$(a+b) \cdot (a^5 - a^4b + a^3b^2 - a^2b^3 + ab^4 - b^5) = a^6 - b^6$$

$$(a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n + b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ impar}$$

$$(a+b) \cdot \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a^{n-k} b^{k-1}\right) = a^n - b^n \quad \forall n \in \mathbb{N} \text{ par}$$

SUMAS Y PRODUCTOS

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n c = nc$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$$

$$\sum_{k=1}^n [a + (k-1)d] = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

$$= \frac{n}{2}(a+1)$$

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = d \frac{1-r^n}{1-r} = \frac{a-r}{1-r}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}(n^2 + n)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}(2n^3 + 3n^2 + n)$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4}(n^4 + 2n^3 + n^2)$$

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{1}{30}(6n^5 + 15n^4 + 10n^3 - n)$$

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}, \quad k \leq n$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^n = \sum_{n_1, n_2, \dots, n_n} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_n!} x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_n^{n_n}$$

CONSTANTES

$$\pi = 3.14159265359\dots$$

$$e = 2.71828182846\dots$$


TRIGONOMETRÍA

$$\text{sen } \theta = \frac{CO}{HIP} \quad \text{csc } \theta = \frac{1}{\text{sen } \theta}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{CA}{HIP} \quad \text{sec } \theta = \frac{1}{\text{cos } \theta}$$

$$\text{tg } \theta = \frac{\text{sen } \theta}{\text{cos } \theta} = \frac{CO}{CA} \quad \text{ctg } \theta = \frac{1}{\text{tg } \theta}$$

$$\pi \text{ radianes} = 180^\circ$$



θ	sin	cos	tg	ctg	sec	csc
0°	0	1	0	∞	1	∞
30°	1/2	$\sqrt{3}/2$	1/ $\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	2/ $\sqrt{3}$	2
45°	1/ $\sqrt{2}$	1/ $\sqrt{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
60°	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	1/ $\sqrt{3}$	2	2/ $\sqrt{3}$
90°	1	0	∞	0	∞	1

$$y = \angle \sin x \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = \angle \cos x \quad y \in [0, \pi]$$


$$y = \angle \text{tg } x \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = \angle \text{ctg } x = \angle \text{tg } \frac{1}{x} \quad y \in (0, \pi)$$


$$y = \angle \sec x = \angle \cos \frac{1}{x} \quad y \in [0, \pi]$$

$$y = \angle \csc x = \angle \text{sen } \frac{1}{x} \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$


Gráfica 1. Las funciones trigonométricas: $\sin x$, $\cos x$, $\text{tg } x$:




Gráfica 2. Las funciones trigonométricas $\csc x$, $\sec x$, $\text{ctg } x$:



Gráfica 3. Las funciones trigonométricas inversas $\arcsin x$, $\arccos x$, $\text{arctg } x$:



Gráfica 4. Las funciones trigonométricas inversas $\text{arctg } x$, $\text{arcsec } x$, $\text{arccsc } x$:



IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$1 + \text{ctg}^2 \theta = \text{csc}^2 \theta$$

$$\text{tg}^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta$$

$$\cos(-\theta) = \cos \theta$$

$$\text{tg}(-\theta) = -\text{tg } \theta$$

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta$$

$$\cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta$$

$$\text{tg}(\theta + 2\pi) = \text{tg } \theta$$

$$\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$$

$$\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$$

$$\text{tg}(\theta + \pi) = \text{tg } \theta$$

$$\sin(\theta + n\pi) = (-1)^n \sin \theta$$

$$\cos(\theta + n\pi) = (-1)^n \cos \theta$$

$$\text{tg}(\theta + n\pi) = \text{tg } \theta$$

$$\sin(n\pi) = 0$$

$$\cos(n\pi) = (-1)^n$$

$$\text{tg}(n\pi) = 0$$

$$\sin\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = (-1)^n$$

$$\cos\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = 0$$

$$\text{tg}\left(\frac{2n+1}{2}\pi\right) = \infty$$

$$\sin \theta = \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\cos \theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\text{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\text{tg } \alpha \pm \text{tg } \beta}{1 \mp \text{tg } \alpha \text{tg } \beta}$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\text{tg } 2\theta = \frac{2 \text{tg } \theta}{1 - \text{tg}^2 \theta}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$$

$$\text{tg}^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{1}{2}(\alpha + \beta) \cdot \sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)$$

$$\text{tg } \alpha \pm \text{tg } \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$$

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\text{tg } \alpha \cdot \text{tg } \beta = \frac{\text{tg } \alpha + \text{tg } \beta}{\text{ctg } \alpha + \text{ctg } \beta}$$

FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{tgh } x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{ctgh } x = \frac{1}{\text{tgh } x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$\text{sech } x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\text{csch } x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

$$\sinh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\cosh: \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty)$$


$$\text{tgh}: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$$

$$\text{ctgh}: \mathbb{R} \rightarrow \{0\} \rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

$$\text{sech}: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1]$$

$$\text{csch}: \mathbb{R} \rightarrow \{0\} \rightarrow \mathbb{R} - \{0\}$$

Gráfica 5. Las funciones hiperbólicas $\sinh x$, $\cosh x$, $\text{tgh } x$:



FUNCIONES HIPERBÓLICAS INV

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cosh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1$$

$$\text{tgh}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right|, \quad |x| < 1$$

$$\text{ctgh}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right|, \quad |x| > 1$$

$$\text{sech}^{-1} x = \ln \left(\frac{1 \pm \sqrt{1-x^2}}{x} \right), \quad 0 < x \leq 1$$

$$\text{csch}^{-1} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{|x|} \right), \quad x \neq 0$$

IDENTIDADES DE FUNCIONES HIP

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= 1 \\ 1 - \operatorname{tgh}^2 x &= \operatorname{sech}^2 x \\ \operatorname{ctgh}^2 x - 1 &= \operatorname{csch}^2 x \\ \sinh(-x) &= -\sinh x \\ \cosh(-x) &= \cosh x \\ \operatorname{tgh}(-x) &= -\operatorname{tgh} x \\ \sinh(x \pm y) &= \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y \\ \cosh(x \pm y) &= \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y \\ \operatorname{tgh}(x \pm y) &= \frac{\operatorname{tgh} x \pm \operatorname{tgh} y}{1 \pm \operatorname{tgh} x \operatorname{tgh} y} \\ \sinh 2x &= 2 \sinh x \cosh x \\ \cosh 2x &= \cosh^2 x + \sinh^2 x \\ \operatorname{tgh} 2x &= \frac{2 \operatorname{tgh} x}{1 + \operatorname{tgh}^2 x} \\ \sinh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1) \\ \cosh^2 x &= \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1) \\ \operatorname{tgh}^2 x &= \frac{\cosh 2x - 1}{\cosh 2x + 1} \\ \operatorname{tgh} x &= \frac{\sinh 2x}{\cosh 2x + 1} \\ e^x &= \cosh x + \sinh x \\ e^{-x} &= \cosh x - \sinh x \end{aligned}$$

OTRAS

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= 0 \\ \Rightarrow x &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ b^2 - 4ac &= \text{discriminante} \\ \exp(\alpha \pm i\beta) &= e^\alpha (\cos \beta \pm i \sin \beta) \quad \text{si } \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

LÍMITES

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e = 2.71828... \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} &= 1 \end{aligned}$$

DERIVADAS

$$\begin{aligned} D_x f(x) &= \frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ \frac{d}{dx}(c) &= 0 \\ \frac{d}{dx}(cx) &= c \\ \frac{d}{dx}(cx^n) &= ncx^{n-1} \\ \frac{d}{dx}(u \pm v \pm w \pm \dots) &= \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx} \pm \dots \\ \frac{d}{dx}(cu) &= c \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(uv) &= u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(uvw) &= uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v(du/dx) - u(dv/dx)}{v^2} \\ \frac{d}{dx}(u^n) &= nu^{n-1} \frac{du}{dx} \\ \frac{dF}{dx} &= \frac{dF}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad (\text{Regla de la Cadena}) \\ \frac{du}{dx} &= \frac{1}{dx/du} \\ \frac{dF}{dx} &= \frac{dF/du}{dx/du} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{f_2'(t)}{f_1'(t)} \quad \text{donde } \begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases} \end{aligned}$$

DERIVADA DE FUNCIONES LOG & EXP

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\ln u) &= \frac{du/dx}{u} = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\log u) &= \frac{\log_e e \cdot du}{u \cdot dx} \\ \frac{d}{dx}(\log_a u) &= \frac{\log_a e \cdot du}{u \cdot dx} \quad a > 0, a \neq 1 \\ \frac{d}{dx}(e^u) &= e^u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(a^u) &= a^u \ln a \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(u^v) &= vu^{v-1} \frac{du}{dx} + \ln u \cdot u^v \cdot \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

DERIVADA DE FUNCIONES TRIGO

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin u) &= \cos u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\cos u) &= -\sin u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{tg} u) &= \sec^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{ctg} u) &= -\operatorname{csc}^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{sec} u) &= \operatorname{sec} u \operatorname{tg} u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{csc} u) &= -\operatorname{csc} u \operatorname{ctg} u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\operatorname{vers} u) &= \operatorname{sen} u \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

DERIV DE FUNCIONES TRIGO INVER

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\angle \sin u) &= \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\angle \cos u) &= -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\angle \operatorname{tg} u) &= \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\angle \operatorname{ctg} u) &= -\frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx}(\angle \operatorname{sec} u) &= \pm \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} + \text{ si } u > 1 \\ - \text{ si } u < -1 \end{cases} \\ \frac{d}{dx}(\angle \operatorname{csc} u) &= \mp \frac{1}{u\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } u > 1 \\ + \text{ si } u < -1 \end{cases} \\ \frac{d}{dx}(\angle \operatorname{vers} u) &= \frac{1}{\sqrt{2u-u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

DERIVADA DE FUNCIONES HIPERBÓLICAS

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sinh u &= \cosh u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \cosh u &= \sinh u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{tgh} u &= \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{ctgh} u &= -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{sech} u &= -\operatorname{sech} u \operatorname{tgh} u \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{csch} u &= -\operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u \frac{du}{dx} \end{aligned}$$

DERIVADA DE FUNCIONES HIP INV

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \operatorname{senh}^{-1} u &= \frac{1}{\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{cosh}^{-1} u &= \frac{\pm 1}{\sqrt{u^2-1}} \cdot \frac{du}{dx}, \quad \begin{cases} + \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u > 0 \\ - \text{ si } \operatorname{cosh}^{-1} u < 0 \end{cases} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{tgh}^{-1} u &= \frac{1}{1-u^2} \cdot \frac{du}{dx}, \quad |u| < 1 \\ \frac{d}{dx} \operatorname{ctgh}^{-1} u &= \frac{1}{1-u^2} \cdot \frac{du}{dx}, \quad |u| > 1 \\ \frac{d}{dx} \operatorname{sech}^{-1} u &= \frac{\mp 1}{u\sqrt{1-u^2}} \cdot \frac{du}{dx} \quad \begin{cases} - \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u > 0, u \in (0,1) \\ + \text{ si } \operatorname{sech}^{-1} u < 0, u \in (0,1) \end{cases} \\ \frac{d}{dx} \operatorname{csch}^{-1} u &= -\frac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}} \cdot \frac{du}{dx}, \quad u \neq 0 \end{aligned}$$

INTEGRALES DEFINIDAS, PROPIEDADES

Nota. Para todas las fórmulas de integración deberá agregarse una constante arbitraria c (constante de integración).

$$\begin{aligned} \int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \\ \int_a^b c f(x) dx &= c \cdot \int_a^b f(x) dx \quad c \in \mathbb{R} \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \\ \int_a^b f(x) dx &= -\int_b^a f(x) dx \\ \int_a^a f(x) dx &= 0 \\ m \cdot (b-a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq M \cdot (b-a) \\ &\Leftrightarrow m \leq f(x) \leq M \quad \forall x \in [a,b], m, M \in \mathbb{R} \\ \int_a^b f(x) dx &\leq \int_a^b g(x) dx \\ &\Leftrightarrow f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a,b] \\ \left| \int_a^b f(x) dx \right| &\leq \int_a^b |f(x)| dx \quad \text{si } a < b \end{aligned}$$

INTEGRALES

$$\begin{aligned} \int dx &= ax \\ \int af(x) dx &= a \int f(x) dx \\ \int (u \pm v \pm w \pm \dots) dx &= \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx \pm \dots \\ \int u dv &= uv - \int v du \quad (\text{Integración por partes}) \\ \int u^n dx &= \frac{u^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1 \\ \int \frac{du}{u} &= \ln|u| \end{aligned}$$

INTEGRALES DE FUNCIONES LOG & EXP

$$\begin{aligned} \int e^u du &= e^u \\ \int a^u du &= \frac{a^u}{\ln a} \quad \begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases} \\ \int u a^u du &= \frac{a^u}{\ln a} \cdot \left(u - \frac{1}{\ln a}\right) \\ \int u e^u du &= e^u (u-1) \\ \int \ln u du &= u \ln u - u = u(\ln u - 1) \\ \int \log_a u du &= \frac{1}{\ln a} (u \ln u - u) = \frac{u}{\ln a} (\ln u - 1) \\ \int u \log_a u du &= \frac{u^2}{4} (2 \log_a u - 1) \\ \int u \ln u du &= \frac{u^2}{4} (2 \ln u - 1) \end{aligned}$$

INTEGRALES DE FUNCIONES TRIGO

$$\begin{aligned} \int \sin u du &= -\cos u \\ \int \cos u du &= \sin u \\ \int \sec^2 u du &= \operatorname{tg} u \\ \int \operatorname{csc}^2 u du &= -\operatorname{ctg} u \\ \int \sec u \operatorname{tg} u du &= \sec u \\ \int \operatorname{csc} u \operatorname{ctg} u du &= -\operatorname{csc} u \\ \int \operatorname{tg} u du &= -\ln|\cos u| = \ln|\sec u| \\ \int \operatorname{ctg} u du &= \ln|\sin u| \\ \int \sec u du &= \ln|\sec u + \operatorname{tg} u| \\ \int \operatorname{csc} u du &= \ln|\operatorname{csc} u - \operatorname{ctg} u| \\ \int \sin^2 u du &= \frac{u}{2} - \frac{1}{4} \sin 2u \\ \int \cos^2 u du &= \frac{u}{2} + \frac{1}{4} \sin 2u \\ \int \operatorname{tg}^2 u du &= \operatorname{tg} u - u \\ \int \operatorname{ctg}^2 u du &= -(\operatorname{ctg} u + u) \\ \int u \sin u du &= \sin u - u \cos u \\ \int u \cos u du &= \cos u + u \sin u \end{aligned}$$

INTEGRALES DE FUNCIONES TRIGO INVER

$$\begin{aligned} \int \angle \sin u du &= u \angle \sin u + \sqrt{1-u^2} \\ \int \angle \cos u du &= u \angle \cos u - \sqrt{1-u^2} \\ \int \angle \operatorname{tg} u du &= u \angle \operatorname{tg} u - \ln|\sqrt{1+u^2}| \\ \int \angle \operatorname{ctg} u du &= u \angle \operatorname{ctg} u + \ln|\sqrt{1+u^2}| \\ \int \angle \operatorname{sec} u du &= u \angle \operatorname{sec} u - \ln(u + \sqrt{u^2-1}) \\ &= u \angle \operatorname{sec} u - \angle \cosh u \\ \int \angle \operatorname{csc} u du &= u \angle \operatorname{csc} u + \ln(u + \sqrt{u^2-1}) \\ &= u \angle \operatorname{csc} u + \angle \cosh u \end{aligned}$$

INTEGRALES DE FUNCIONES HIP

$$\begin{aligned} \int \sinh u du &= \cosh u \\ \int \cosh u du &= \sinh u \\ \int \operatorname{sech}^2 u du &= \operatorname{tgh} u \\ \int \operatorname{csch}^2 u du &= -\operatorname{ctgh} u \\ \int \operatorname{sech} u \operatorname{tgh} u du &= -\operatorname{sech} u \\ \int \operatorname{csch} u \operatorname{ctgh} u du &= -\operatorname{csch} u \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tgh} u du &= \ln \cosh u \\ \int \operatorname{ctgh} u du &= \ln|\sinh u| \\ \int \operatorname{sech} u du &= \angle \operatorname{tg}(\sinh u) \\ \int \operatorname{csch} u du &= -\operatorname{ctgh}^{-1}(\cosh u) \\ &= \ln \operatorname{tgh} \frac{1}{2} u \end{aligned}$$

INTEGRALES DE FRAC

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{u^2 + a^2} &= \frac{1}{a} \angle \operatorname{tg} \frac{u}{a} \\ &= -\frac{1}{a} \angle \operatorname{ctg} \frac{u}{a} \\ \int \frac{du}{u^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \ln \frac{u-a}{u+a} \quad (u^2 > a^2) \\ \int \frac{du}{a^2 - u^2} &= \frac{1}{2a} \ln \frac{a+u}{a-u} \quad (u^2 < a^2) \end{aligned}$$

INTEGRALES CON \sqrt{\quad}

$$\begin{aligned} \int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} &= \angle \sin \frac{u}{a} \\ &= -\angle \cos \frac{u}{a} \\ \int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} &= \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) \\ \int \frac{du}{u\sqrt{a^2 \pm u^2}} &= \frac{1}{a} \ln \left| \frac{u}{a + \sqrt{a^2 \pm u^2}} \right| \\ \int \frac{du}{u\sqrt{u^2 - a^2}} &= \frac{1}{a} \angle \operatorname{csc} \frac{u}{a} \\ &= \frac{1}{a} \angle \operatorname{sec} \frac{u}{a} \\ \int \sqrt{a^2 - u^2} du &= \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \angle \operatorname{sen} \frac{u}{a} \\ \int \sqrt{u^2 \pm a^2} du &= \frac{u}{2} \sqrt{u^2 \pm a^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{u^2 \pm a^2}) \end{aligned}$$

MÁS INTEGRALES

$$\begin{aligned} \int e^{au} \sin bu du &= \frac{e^{au} (a \sin bu - b \cos bu)}{a^2 + b^2} \\ \int e^{au} \cos bu du &= \frac{e^{au} (a \cos bu + b \sin bu)}{a^2 + b^2} \\ \int \sec^3 u du &= \frac{1}{2} \sec u \operatorname{tg} u + \frac{1}{2} \ln|\sec u + \operatorname{tg} u| \end{aligned}$$

ALGUNAS SERIES

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)(x-x_0)^2}{2!} \\ &\quad + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n}{n!} \quad : \text{Taylor} \\ f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2!} \\ &\quad + \dots + \frac{f^{(n)}(0)x^n}{n!} \quad : \text{Maclaurin} \\ e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-2}}{(2n-2)!} \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \\ \angle \operatorname{tg} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} \end{aligned}$$

ALFABETO GRIEGO				
	Mayúscula	Minúscula	Nombre	Equivalente Romano
1	A	α	Alfa	A
2	B	β	Beta	B
3	Γ	γ	Gamma	G
4	Δ	δ	Delta	D
5	E	ε	Epsilon	E
6	Z	ζ	Zeta	Z
7	H	η	Eta	H
8	Θ	θ θ̄	Teta	Q
9	I	ι	Iota	I
10	K	κ	Kappa	K
11	Λ	λ	Lambda	L
12	M	μ	Mu	M
13	N	ν	Nu	N
14	Ξ	ξ	Xi	X
15	O	ο	Omicron	O
16	Π	π π̄	Pi	P
17	P	ρ	Rho	R
18	Σ	σ σ̄	Sigma	S
19	T	τ	Tau	T
20	Υ	υ	Ipsilon	U
21	Φ	φ φ̄	Phi	F
22	X	χ	Ji	C
23	Ψ	ψ	Psi	Y
24	Ω	ω	Omega	W

NOTACIÓN

- sin Seno.
- cos Coseno.
- tg Tangente.
- sec Secante.
- csc Cosecante.
- ctg Cotangente.
- vers Verso seno.
- $\arcsin \theta = \angle \sin \theta$ Arco seno de un ángulo θ .
- $u = f(x)$
- sinh Seno hiperbólico.
- cosh Coseno hiperbólico.
- tgh Tangente hiperbólica.
- ctgh Cotangente hiperbólica.
- sech Secante hiperbólica.
- csch Cosecante hiperbólica.
- u, v, w Funciones de x , $u = u(x)$, $v = v(x)$.
- \mathbb{R} Conjunto de los números reales.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ Conjunto de enteros.
- \mathbb{Q} Conjunto de números racionales.
- \mathbb{Q}^c Conjunto de números irracionales.
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ Conjunto de números naturales.
- \mathbb{C} Conjunto de números complejos.