Segunda Prueba de Matemáticas I

Programa de Bachillerato. Universidad de Chile.

30 de Mayo, 2009.

Tiempo: 2 horas.

Nombre:

1. Elija entre a y b

a) Calcule el límite $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^3 - x^2 + 2x - 1}{2x - 1}$.

Si evaluamos, resulta de la forma $0/0$, por lo tanto si $p(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$ se tiene que $p(1/2) = 0$. Por lo tanto $2x - 1$ divide a p , haciendo la división se obtiene:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x^3 - x^2 + 2x - 1}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(x^2 + 1)(2x - 1)}{2x - 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x^2 + 1 = \frac{5}{4}$$

b) Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = -5x + 4$. Considere además el intervalo $J = (3 - 10^{-2}, 3 + 10^{-2})$. Encuentra un intervalo I para el cual se cumpla que si $x \in I$, entonces $f(x) \in J$.

Solución:

Como $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{5}} = 3$ y como la función amplifica por 5 el largo de los intervalos se tiene que basta tomar

$$I = \left(\frac{1}{5} - \frac{10^{-2}}{5}, \frac{1}{5} + \frac{10^{-2}}{5} \right)$$

para asegurar lo que se pide, de hecho, si $x \in I$ se tiene que

$$\begin{aligned} \frac{1}{5} - \frac{10^{-2}}{5} < x < \frac{1}{5} + \frac{10^{-2}}{5} \\ -1 + 10^{-2} > -5x > -1 - 10^{-2} \\ 3 + 10^{-2} > -5x + 4 > 3 - 10^{-2} \end{aligned}$$

es decir, $f(x) \in J$.

2. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x \sin(x) - x$. Elije tres de las siguientes preguntas y respóndelas, argumentando tus respuestas.

a) ¿Existe $\alpha \neq 0$ tal que $f(\alpha) = \alpha$?

Solución: Si tal α existiera, $\alpha \sin(\alpha) - \alpha = \alpha$ como $\alpha \neq 0$ se tiene que $\sin(\alpha) = -2$ lo cual no tiene solución pues $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ para cualquier valor de α .

b) ¿Es f inyectiva?

Solución: No, pues $f(0) = 0$, y además si $\sin(x) = 1$, se tiene que $f(x) = x \sin(x) - x = 0$, por ejemplo $f(\pi/2) = 0$.

c) ¿Es f creciente?

Solución: No, pues $f(-\pi) = \pi$, y $f(\pi) = -\pi$.

d) Si $x > 0$, ¿Es cierto que $f(x) \leq 0$?

Solución: Si, pues si $x > 0$, entonces $f(x) = x \sin(x) - x = x(\sin(x) - 1)$, pero como $-1 \leq \sin(x) \leq 1$, se tiene que $\sin(x) - 1 \leq 0$, por lo tanto, si $x > 0$, entonces $f(x) = x \sin(x) - x = x(\sin(x) - 1) \leq 0$

e) ¿Cuáles son todos los valores β tal que $f(\beta) = 0$?

Solución: Claramente $\beta = 0$ es uno de ellos. Si $\beta \neq 0$ y $f(\beta) = 0$, entonces $\sin(\beta) - 1 = 0$. Es decir, $\beta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ o bien $\beta = 0$.

3. Encuentre todos los números reales α tal que

$$2 \cos^3(\alpha) + 11 \cos^2(\alpha) + 17 \cos(\alpha) + 6 = 0$$

(Ayuda: Estudie las raíces del polinomio

$$p(x) = 2x^3 + 11x^2 + 17x + 6)$$

Solución:

Estudiando las raíces racionales de p vemos que -2 es una de ellas. Haciendo la división de p en $x + 2$ resulta un cociente de grado 2 al cual se les puede encontrar las raíces usando la fórmula o completando cuadrados y resulta $p(x) = (x + 2)(x + 3)(2x + 1)$. Es decir:

$$2 \cos^3(\alpha) + 11 \cos^2(\alpha) + 17 \cos(\alpha) + 6 = 0 = (\cos(\alpha) + 2)(\cos(\alpha) + 3)(2 \cos(\alpha) + 1) = 0$$

Como $|\cos(\alpha)| \leq 1$ se tiene que el único factor que es cero es

$$2 \cos(\alpha) + 1,$$

es decir

$$\cos(\alpha) = -\frac{1}{2}$$

Es decir

$$\alpha = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{o bien,} \quad \alpha = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

4. Considera la función $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{1-x}{x}$.

a) Grafica f , indicando intersección con los ejes y asíntotas.

b) Determina el ínfimo de $A = \{f(n) / n \in \mathbb{N}\}$

Solución: Primero notar que

$$\frac{1-n}{n} = \frac{1}{n} - 1$$

Como

$$\frac{1}{n} > 0$$

se tiene que

$$\frac{1}{n} - 1 > -1$$

Luego -1 es cota inferior de A .

Si -1 no es ínfimo, existe un número α mayor que -1 que es cota inferior de A . Luego $\frac{1+\alpha}{2} > 0$. Por propiedad arquimideana se tiene que existe $N \in \mathbb{N}$ y $N > \frac{2}{1+\alpha}$ o lo que es lo mismo

$$0 < \frac{1}{N} < \frac{1+\alpha}{2}$$
$$-1 < \frac{1}{N} - 1 < -1 + \frac{1+\alpha}{2} < \alpha$$

Lo que contradice el hecho de que α es cota inferior.

$$\inf(A) = -1$$