Bioenergética

Diferencia fundamental entre una célula y el conjunto de moléculas que la componen es **su mayor organización con respecto al medio:**

Axioma

"los organismos vivos presentan un alto grado de orden, y cuando crecen y se dividen crean más orden a partir de materiales que están en un mayor grado de desorden"

Principios de Termodinámica

- Principio Cero:
 - Si dos **sistemas** se encuentran en **equilibrio** con un tercero, entonces, están en equilibrio entre sí.
 - **Equilibrio**: intercambio energético mínimo, que no implica cambio de energía de cada sistema.
- Primera Ley:
 - “La Energía de un sistema aislado es constante”
 - Principio de Conservación de Energía: la energía puede cambiar de estado, pero no se crea o se destruye.
- Segunda Ley
 - “El calor no puede fluir desde una zona fría a una más caliente.”
 - Decaimiento. A lo largo del **tiempo**, las **energías** de un sistema tienden a disiparse. La **Entropía** es la medida de cuanto ha progresado, aumentando a lo largo del tiempo y siendo máxima cuando el sistema llegue al equilibrio
- Tercera Ley (poco importante en biología)
 - En la medida que un sistema se aproxima al cero absoluto de energía, todos los procesos cesan.
 - Cero absoluto, donde toda actividad se detendría es $-273.15\text{ }^{\circ}\text{C}$

Todos los organismos

Fotótrofos
La energía
proviene
de la luz

Quimiótrofos
La energía proviene
de compuestos
químicos

Células captan Energía de su entorno y la usan para generar Orden.

Parte de la energía usada se disipa como calor (Entalpía: H) y se libera al entorno.

Aumenta la Entropía (S) del universo.

CAMBIOS DE ENTROPÍA

A → **B**

S: entropía del estado

p: probabilidad del estado

El cambio de entropía ($S_B - S_A$) $\propto \ln p_B/p_A$

$$\Delta S = R \ln p_B/p_A$$

El cambio de entropía para convertir 1 mol de A a B es igual a la constante de los gases **R** (2 cal. grad⁻¹ mol⁻¹) multiplicado por el **logaritmo natural** de la razón de probabilidad del estado B dividido por la probabilidad del estado A.

Si el proceso es espontáneo, $B/A > 1$ y ΔS será positivo.

LA ORGANIZACIÓN CELULAR Y EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA.

El segundo principio de la termodinámica:

"los sistemas cambian espontáneamente de estados de baja probabilidad a estados de alta probabilidad".

Ya que los estados de baja probabilidad son más ordenados, se establece que **"el universo cambia constantemente a un estado de desorden mayor ($\Delta S_{\text{univ}} > 0$)"**.

¿Cómo cumple la organización celular este segundo principio?

$$\text{El cambio de entropía } (S_B - S_A) \propto \ln p_B/p_A$$
$$\Delta S = R \ln p_B/p_A$$

Sistema, medio, universo:

$$\Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{medio}} = \Delta S_{\text{universo}} \text{ (1er principio de la TD)}$$

Las células para ordenarse utilizan energía. Parte de la energía utilizada se libera al medio en forma de calor.

El calor liberado induce un cambio de entropía en el medio determinado por la relación $\Delta S_{\text{Medio}} = h/T$

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{medio}}$$

ΔS sistema: negativo

ΔS medio: positivo

El cambio de entropía inducido en el medio es más grande que el cambio de entropía del sistema, por lo que

$$\Delta S_{\text{universo}} > 0$$

Moléculas complejas:
ADN, ARN, proteínas.

food molecules

the many molecules that form the cell

Figure 2-36 *Molecular Biology of the Cell* (© Garland Science 2008)

ENTALPÍA (H)

La célula entrega energía al medio en forma de calor (h) y de trabajo ($P\Delta V$).

La **entalpía (H)** es la función termodinámica que integra la energía calórica y el trabajo realizado por el sistema:

$$\Delta H_s = -h + P\Delta V$$

"el cambio de entalpía de un sistema es igual al calor transferido al medio más el trabajo realizado por el sistema"

En la mayoría de los sistemas biológicos $P\Delta V$ es muy pequeño por lo que

$$\Delta H_{\text{sistema}} = -h$$

Un proceso que entrega calor al medio (ΔH_s negativo) es un proceso de tendencia espontánea porque el sistema llega a un estado energético más bajo y por lo tanto más estable.

Trabajo ($P\Delta V$)

(a) Synthetic work

(b) Mechanical work

(c) Concentration work

(d) Electrical work

(e) Heat

(f) Bioluminescent work

A veces es difícil predecir si un proceso es o no posible, porque su probabilidad de ocurrencia depende tanto del cambio de entalpía como del cambio de entropía.

Por ejemplo, un sistema que entrega calor al medio ($\Delta H_{\text{sistema}} -$), y disminuye su entropía ($\Delta S_{\text{sistema}} -$).

Una relación muy utilizada para determinar la espontaneidad de un proceso biológico es la determinación de la *energía libre de Gibbs* o **G.**

ENERGIA LIBRE

La función combinada **G** relaciona los cambios de entropía y de entalpía en el sistema:

$$\mathbf{G = H - TS; \text{ o: } \Delta G_{\text{sistema}} = \Delta H_{\text{sistema}} - T\Delta S_{\text{sistema}} \text{ (a T ctte)}}$$

$$\Delta S_{\text{Medio}} = h/T$$

"el cambio de energía libre de un sistema es igual al cambio de entalpía de este sistema menos el cambio de entropía del sistema multiplicado por la temperatura absoluta".

Si no hay cambio de volumen, $\Delta H = -h$ (calor transferido), y

$$\Delta G = -h - T\Delta S$$

Como el 2do. principio de la termodinámica dice que ΔS del universo es siempre positivo se cumple que **una reacción ocurrirá en forma espontanea si ΔG es negativo.**

Fotosíntesis y Respiración como Procesos Complementarios.

Energía que permite Trabajo Biológico:
 Síntesis de macromoléculas,
 trabajo mecánico.

Figure 2-41 *Molecular Biology of the Cell* (© Garland Science 2008)

ATP

La ruptura de los enlaces fosfoanhídrido libera energía (reacción con un valor de energía libre negativo) $\longrightarrow$ TRABAJO BIOLÓGICO

Moléculas de relevancia en el Metabolismo

Table 2-5 Some Activated Carrier Molecules Widely Used in Metabolism

ACTIVATED CARRIER	GROUP CARRIED IN HIGH-ENERGY LINKAGE
ATP	phosphate
NADH, NADPH, FADH ₂	electrons and hydrogens
Acetyl CoA	acetyl group
Carboxylated biotin	carboxyl group
S-Adenosylmethionine	methyl group
Uridine diphosphate glucose	glucose

Table 2-5 *Molecular Biology of the Cell* (© Garland Science 2008)

Fermentación, o, cómo sacar energía rápidamente de la glicólisis y no quedarse sin NAD⁺

(B) FERMENTATION LEADING TO EXCRETION OF ALCOHOL AND CO₂

Biochemistry, V ed. Berg et al. 2000

SUMMARY OF STEPS 6 AND 7

Much of the energy of oxidation has been stored in the activated carriers ATP and NADH.

La oxidación de la Glucosa genera ATP y NADH

MITOCONDRIAS

0,2 A 10 um de diámetro
1 a 4 um de longitud

DNA
mitocondrial

ATP sintasa (F₀F₁)

crestas

Membrana externa
permeable a iones y moléculas pequeñas

Membrana interna
impermeable a la mayor parte de los iones y moléculas pequeñas incluyendo H⁺.
Contiene:
*transportadores de electrones (complejos I-IV)
*intercambiadores ATP-ADP
*ATP sintasa
*otros transportadores

Matriz
contiene:
*piruvato deshidrogenasa
*enzimas del ciclo de Krebs
*enzimas de la β-oxidación de ácidos grasos
*enzimas para oxidación de aminoácidos
*DNA y ribosomas
*ATP, ADP, P_i

ribosomas

porinas

Las Mitocondrias: Resumen

1. Son **organelos característicos de las células eucarióticas**, resultado de un evento **endosimbiótico**.
2. En ellas se produce una serie de **reacciones de óxido-reducción** cuya energía libre es utilizada para la síntesis de **ATP**.
3. En las células aeróbicas, el **piruvato** formado en la glicólisis (anaeróbica) es transportado a la mitocondria donde es **oxidado a CO₂**.

http://www.ortadoc.org/media/d/c/05el_1000k.swf

Origen de las Mitocondrias

Características probables de los protoeucariontes

1. Células Depredadoras:
 - Sin pared celular, por lo tanto, capaces de fagocitar.
 - Gran Tamaño,
 - Citoesqueleto
 - Núcleo protegido (de las presas y de las enzimas digestivas).

Características probables de las protomitocondrias

1. ¿Parásitos intracelulares? Poco probable debido a su eficiente metabolismo.
2. Cadena transportadora de H⁺ en la membrana. Probablemente asociada ya a la generación de energía, pero desarrollada inicialmente para...
3. Sin núcleo definido.

Las mitocondrias son organelos móviles y activos

Movimiento: Las mitocondrias no son organelos sésiles. Están asociados al citoesqueleto y responden a estímulos.

División: ¿qué forma tiene una mitocondria? Estamos acostumbrados a una visión estática, sin embargo, las mitocondrias forman retículos mitocondriales o se dividen en múltiples organelos.

Imágenes de Alberts et al.
MBC, 2008

péptido señal de translocación a mitocondrias+GFP.
Expresado en levaduras.
Microscopía Confocal

Mitocondrias en movimiento por sobre citoesqueleto de microtúbulos. Células H9c2 expresan tubulinaGFP, con las mitocondrias marcadas con mitoDsRed.
Yi et al, 2004. JCB, Volume 167, Number 4, 661-672

Ciclo de Krebs: Sustratos y Productos

MITOCONDRIA

Vías metabólicas que ocurren en la mitocondria: Ciclo de Krebs y Fosforilación Oxidativa

Estructuras del NAD y del FAD en sus formas oxidadas y reducidas

Transporte de sustratos al interior de la mitocondria:
piruvato y Acil-CoA-de-AcGrasos

Activación: de piruvato a Acetil-CoA,

Las mitocondrias pueden usar piruvato ($\text{CH}_3\text{-CO-COO}^-$) o ácidos grasos como combustible, para formar la importante molécula portadora activada: acetil CoA.

El piruvato generado durante la glicólisis es transportado a través de las membranas mitocondriales a la matriz. Allí reacciona con la coenzima A para formar acetil CoA, NADH y CO_2 en una reacción catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa.

complejo piruvato deshidrogenasa

Ciclo del ácido cítrico

Fosforilación Oxidativa = Síntesis de ATP manejada por la transferencia de electrones hasta el Oxígeno y la formación en paralelo de un gradiente de H⁺.

Fotosíntesis = Síntesis de ATP manejada por la luz solar.

➔ Explican la mayor parte del ATP producido por los organismos aerobios.

➔ La degradación de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos convergen en esta etapa.

Acoplamiento quimiosmótico

La hipótesis quimiosmótica, propuesta por Peter Mitchell en 1961, consistía de cuatro postulados. En términos de las funciones de la mitocondria eran los siguientes:

- 1.- La cadena respiratoria mitocondrial es **translocadora de protones**. La cadena bombea protones fuera de la matriz cuando se transportan electrones a lo largo de ella.
- 2.- El complejo ATP sintasa **también transloca protones** a través de la membrana interna. Debido a su actividad reversible puede usar la energía de la hidrólisis del ATP para bombear protones a través de la membrana, pero si existe una gradiente electroquímica de protones suficientemente grande, los protones fluyen en dirección inversa a través del complejo y permiten la síntesis de ATP.
- 3.- La membrana mitocondrial interna es **impermeable** a H^+ , OH^- y en general a cationes y aniones.
- 4.- En la membrana mitocondrial interna existe un conjunto de **proteínas transportadoras** encargadas de la entrada y la salida de metabolitos y de ciertos iones orgánicos.

Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es el proceso en cual se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o $FADH_2$ al O_2 por medio de una serie de transportadores de electrones en la membrana interna mitocondrial.

Las reacciones de la vía glicolítica y del ciclo de Krebs producen la conversión de 1 molécula de glucosa en 6 de CO_2 y la reducción de 10 NAD^+ a 10 $NADH$ y 2 FAD a 2 $FADH_2$.

STAGE 1: ELECTRON TRANSPORT
DRIVES PUMP THAT PUMPS
PROTONS ACROSS MEMBRANE

(A)

Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es el proceso en cual se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o FADH₂ al O₂ por medio de una serie de transportadores de electrones en la membrana interna mitocondrial.

Las reacciones de la vía glicolítica y del ciclo de Krebs producen la conversión de 1 molécula de glucosa en 6 de CO₂ y la reducción de 10 NAD⁺ a 10 NADH y 2 FAD a 2 FADH₂.

Fosforilación oxidativa

El NADH y el FADH₂ transfieren electrones a la cadena respiratoria ubicada en la membrana interna mitocondrial (MIM) constituida por tres grandes complejos enzimáticos:

el complejo I NADH deshidrogenasa (NADH-CoQ reductasa, 880 kD), el complejo III citocromo b-c1 (CoQ-citocromo c reductasa) y el complejo IV citocromo c oxidasa.

Síntesis quimiosmótica de ATP

La síntesis de ATP se realiza utilizando la energía almacenada en forma de gradiente electroquímico de protones a través de la membrana interna, vía la ATPasa F_0F_1 .

Este mecanismo, de un acoplamiento quimiosmótico fue propuesto por Peter Mitchell en 1961, hipótesis que no fue aceptada al comienzo pero después fue comprobada experimentalmente. P. Mitchell recibió por ello el premio Nobel en 1978.

Los 2 componentes del gradiente electroquímico de protones

Síntesis de ATP

La ATPasa F_0F_1 funciona esencialmente como un motor molecular. Están formadas por dos dominios: F_1 y F_0

El complejo F_0F_1 o ATPasa F_0F_1 acopla el flujo de protones a favor de su gradiente a la síntesis de ATP.

Actúa como una ATP sintetasa. (3 H^+ /ATP)

F_0 contiene tres tipos de subunidades a , b y c .

F_1 está compuesto de 5 polipéptidos diferentes: α , β , γ , δ y ϵ ,

Síntesis de ATP

La ATP sintasa (o sintetasa) es en esencia un motor molecular.

Están formadas por dos dominios: el rotor y la porción F_1/F_0

El rotor permite acoplar el flujo de protones a favor de su gradiente de concentración a la síntesis de ATP realizada por el complejo F_0F_1

Actúa como una ATP sintetasa. ($3 H^+/ATP$)

F_0 contiene tres tipos de subunidades a, b y c .

F_1 está compuesto de 5 polipéptidos diferentes: α , β , γ , δ y ϵ ,

¿cómo evolucionó?

Los motores moleculares con características similares a la F₀F₁ ATP-sintetasa pueden rastrearse a su similitud con los flagelos bacterianos.

ATPasas de membrana tipo F

Están presentes en las membranas plasmáticas de las bacterias, en la membrana tiloide de cloroplastos y en la membrana interna de las mitocondrias.

Catalizan la reacción de síntesis de ATP ($\Delta G > 0$) a partir de ADP y Pi.

La energía proviene del gradiente de potencial electroquímico de protones (H^+) a través de la membrana generado por la actividad de la cadena transportadora de electrones. Es decir, actúan como ATP sintetasas.

Al igual que las ATPasas tipo V están formadas por dos dominios: F_1 y F_0

El complejo integral F_0 contiene tres tipos de subunidades a, b y c: ($a_1b_2c_{10}$ en bacterias) y contiene el canal a través del que se transportan los protones. El complejo F_1 está compuesto de 5 polipéptidos diferentes: $\alpha, \beta,$ y γ .

Lodish et al. 2000

ATPasas de membrana tipo V

Presentes en las membranas de las vacuolas y en organelos como lisosomas, retículo endoplásmico, cisternas del aparato de Golgi y vesículas cubiertas, bombean electrogenicamente H^+ desde el citosol al lumen del organelo (hidrolizando ATP). Una cabeza (V_1) hidrofílica que está orientada hacia el citoplasma y donde se realiza la hidrólisis del ATP.

CLOROPLASTOS

2 a 4 μm diámetro
5 a 10 μm de largo
20 a 40 por célula

Comparación entre mitocondrias y cloroplastos

CLOROPLASTO

Luz
↓

Excitación electrónica a niveles de mayor energía.

Sucede:

Transferencia electrónica a un receptor de electrones (Fotosistemas).

La clorofila capta electrones del Agua.

Clorofila

Esquema de un Fotosistema (Centro de reacción+Complejo Antena)

En la membrana tilacoide ocurre la transferencia electrónica, a la par, los H^+ son bombeados hacia el interior del tilacoide. El flujo de estos H^+ retornando al estroma a través de la ATP asa permite la síntesis del ATP.

Reacción catalizada por la ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa (Rubisco)

Ciclo de Calvin Benson