1.4. Guía 1

Cálculo II Cs. Exactas

2010

1. Suponga que f y g son diferenciables en todo $\mathbb{R}$, $f'(x) > g'(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y $f(a) = g(a)$. Demuestre que $f(x) > g(x)$ para $x > a$ y $f(x) < g(x)$ para $x < a$.
2. Si para una función f definida en un intervalo $[a, b]$ existe $\alpha > 1$ tal que $\forall x, y \in [a, b] |f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$ entonces f es continua en $[a, b]$. Trabaje un poco más y demuestre que f es derivable en $]a, b[$, que su derivada es nula en $]a, b[$, y entonces f es constante en $[a, b]$.
3. Si $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es continua en su dominio y derivable en el interior de su dominio, y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f' = L \in \mathbb{R}$, entonces

$$a) \forall c > 0 \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x+c) - f(x)) = cL \qquad b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = L$$

4. Si f y g son continuas en $[a, b]$ y derivables en $]a, b[$, entonces existe $c \in]a, b[$ tal que $(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c)$
5. La figura muestra la gráfica de la derivada de f . Marque todos los puntos en que se asumen los máximos y mínimos locales de f , indicando si es máximo o si es mínimo local.

6. Analice completamente (incluyendo concavidad) cada una de las siguientes funciones. Además, encuentre el supremo y el ínfimo en los intervalos indicados (o demuestre que no existe).

$$a) f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1 \text{ en } [-2, 2].$$

$$g) f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 \text{ en } \mathbb{R}.$$

$$b) f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1 \text{ en } \mathbb{R}.$$

$$h) f(x) = \frac{1}{x^5 + x + 1} \text{ en } [-1/2, 1].$$

$$c) f(x) = x^3 - x^2 - 8x + 1 \text{ en } [0, \infty).$$

$$i) f(x) = \frac{x+1}{x^2+1} \text{ en } [-1, 1/2].$$

$$d) f(x) = x^5 + x + 1 \text{ en } [-1, 1].$$

$$e) f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 \text{ en } [-1, 1/2].$$

$$j) f(x) = \frac{x+1}{x^2+1} \text{ en } \mathbb{R}.$$

$$f) f(x) = \frac{x}{x^2-1} \text{ en } [0, 5].$$

7. Determine un intervalo en torno a $x = 4$ donde la función $g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \frac{\sqrt{x}(x-5)^2}{4}$$

tenga una función inversa (local) $f = g^{-1}$ y calcule la derivada $f'(\frac{1}{2})$.

8. Demuestre que:

$$a) (\operatorname{Arcsen}(x))' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1.$$

$$b) (\operatorname{Arccos}(x))' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}, |x| < 1.$$

$$c) (\operatorname{Arctan}(x))' = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}.$$

$$d) (\operatorname{Arcsec}(x))' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}, |x| > 1.$$

9. Demuestre que si f derivable en un intervalo I y para todo $x \in I$ se cumple $f'(x) < -4$, entonces f tiene inversa derivable en I .

10. Calcule los siguientes límites, usando la regla de l'Hôpital si se puede.

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \operatorname{sen}(x)}{x - \operatorname{sen}(x^2)}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \tan(x)}{\operatorname{sen}(x^2)}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x + x^3)}{x + \operatorname{sen}(x^2)}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow \pi^+} \frac{\operatorname{sen}(x)}{\sqrt{x - \pi}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\operatorname{sen}(x^2 + \operatorname{sen}(x))}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(x^2)}{\operatorname{sen}^2(x)}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x^2 - x - 2}{x^3 - 3x^2 + 3x - 2}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{sen}(x + \sqrt{x})}$$