




Actinopterygii

*Peces con aleta
radiada*

Curso Paleontología de Vertebrados 2018

¿Cuál es morfológicamente más derivado?



¿Qué es un actinopterigio?



Polypteriformes



Bichires –

Polypterus
Erpetoichthys







Chondrostei

Esturiones

—

Acipenser

Huso

Pseudosaphirhynchus

Scaphirhynchus



Peces espátula

—

Polyodon

Psephurus



Holostei



Bowfin — *Amia*



Gar o pejelagarto — *Lepisosteus*
Atractosteus

Actinopterigios recientes

(Número de géneros)

POLYPTERIFORMES

Bichirs (2)



CHONDROSTEI

Paddlefish (2)



Sturgeon (4)




HOLOSTEI

Bowfin (1)




Gar (2)



ACTINOPTERII

NEOPTERYGII

TELEOSTEI
(4,500+)



Cladistia: Polypteriformes

Bichires

2 géneros, 10 especies
Humedales de África
tropical y el Nilo.

Espiráculos, pulmones,
placas gulares.



Polypterus



Erpetoichthys



Larva de *Polypterus*

Pulmones de *Polypterus*







FIGURE 1 (a) *Polypterus senegalus* Ventral view of the lung. The right lobe is much longer than the left one. Note the presence of parallel, transversely arranged arterial branches (arrowheads). h, heart. (b) *Erpetoidichthys calabaricus*. The dorsal wall of pharynx (Ph) and oesophagus (Oe) is opened. The pharyngeal communication with the lung is a ventral, slit-like opening (asterisk) with slightly thickened borders. The left (L) and right (R) lungs locate ventrally. (c) *Polypterus senegalus* Ventral view. The dissection has eliminated the ventral wall of the left (L) and right (R) lobes. The pharyngeal aperture (asterisk) shows thick lips. The communication between lobes is a rounded orifice deviated to the left. Note that the dorsal side of this orifice (arrowheads) is formed by the left rim of the pharyngeal aperture. Arrow indicates ventral pulmonary vessel. (d) *Erpetoidichthys calabaricus*. Semi-thin section. Toluidine blue. The muscle component of the lip of the pharyngeal aperture is depicted. The amount of muscle decreases toward the lung wall (upper portion of the panel). Note different muscle bundle orientations. Scale bars: (a) 2 cm; (b) 0.5 cm; (c) 0.5 cm; (d) 50 μ m



- Espiráculos: respiración aérea

Caminando como *Polypterus*



Chondrostei

Acipenseriformes (Cretácico Tardío –)

Endoesqueleto **cartilaginoso**

Perdida de centro vertebral

Intestino con **válvula espiral**

Formas fósiles con hueso
datan Jurásico-Cretácico




Acipenser




Polyodon

Esqueleto Cartilagenoso



Protrusión mandíbula



¿Qué es un actinopterigio?

Linnaeus

Systema Naturae 1758

IV PISCES.

Corpus apodum, pinis veris instructum, nudum, vel squamosum.

PLAGIURI. <i>Cauda horizontalis.</i>	Thrichechus.	<i>Dentes in utraque maxilla. Dorsum impenne.</i>	Manatus f. <i>Foca mar.</i>
	Catodon.	<i>Dentes in inferiore maxilla. Dorsum impenne.</i>	Cot. <i>Fistula in rostro Art. Cete Claf.</i>
	Monodon.	<i>Dens in superiore max. 1. Dorsum impenne.</i>	Monoceros. <i>Unicornus.</i>
	Balæna.	<i>Dentes in sup. max. cornel. Dorsum saepius impenne.</i>	B. Groenland. B. Finlisch. B. Maxill. inf. latiore. <i>Art.</i>
	Delphinus.	<i>Dentes in utraque maxilla. Dorsum pinnatum.</i>	Orcha. Delphinus. Phocæna.
CHONDROPTERY- GIL. <i>Pinnæ cartilagineæ.</i>	Raja.	<i>Foramina branch. utriusq. 5. Corpus depresso.</i>	Raja clav. asp. læv. &c. Squatino-Raja. Altavela. Pastinaca mar. Aquila. Torpedo. Bos <i>Pat.</i>
	Squalus.	<i>Foram. branch. utriusq. 5. Corpus oblongum.</i>	Lamia. Galeus. Carulus. Vulpes mar. Zygæna. Squatina. Centrine. Pristis.
	Acipenser.	<i>Foram. branch. utriusq. 17. Os edentul. tubulatum.</i>	Sturio. Hufo. <i>Ichthyocolla.</i>
	Petromyzon.	<i>Foram. branch. utriusq. 7. Corpus bipenne.</i>	Enneophthalmus. Lampeira. Mustela.

BRANCHIOSTEGI.
*Pinnæ offic. carinæ,
Branch. off. & membran.*

Lophius.
Cyclopterus.
Ostracion.
Balistes.

ACANTHOPTERYGII.
Pinnæ offic. quantum aculeate.


Gasterosteus.
Zeus.
Cottus.
Trigla.
Trachinus.
Perca.
Sparus.
Labrus.
Mugil.
Scomber.
Xiphias.
Gobius.

MALACOPTERYGII.
Pinnæ offic. quæ omnes molles.

Gymnotus.
Muræna.
Blennius.
Gadus.
Pleuronectes.
Ammodytes.
Coryphæna.
Echeneis.
Esox.
Salmo.
Osmerus.
Coregonus.
Clupea.
Cyprinus.
Cobitus.
Syngnathus.

Paleontología - Louis Agassiz

Recherches sur les poisson fossiles (1833-44)



"Placoidei" Escama placoide



"Ganoidei" Escama ganoide



"Ctenoidei" Escama ctenoide



"Cycloidei" Escama cicloide



Agassiz “Ganoidei”

Esturiones

Gar – Pejelagarto

Bichires

Peces pulmonados

Peces gato



Anatomía Comparada - Johannes Müller


Teleostei – Holostei – Chondrostei – Dipnoi - Cyclostomi

(1844-1845)

Dipnoi



Holostei



Chondrostei



Teleostei






Actinopterygii - Edward Drinker Cope

Transformación del “Archipterygium” de Gegenbauer

(1871)

Dipnoi

Polypterus



Actinopterygios recientes

(Número de géneros)

POLYPTERIFORMES

Bichirs (2)



CHONDROSTEI

Paddlefish (2)



Sturgeon (4)




HOLOSTEI

Bowfin (1)




Gar (2)



ACTINOPTERYGII


NEOPTERYGII

TELEOSTEI
(4,500+)




Grande 2010

Filogenia Actinopterygii




Mesozoico

Actinopterygii / Chondrichthyes



Origen Actinopterygios

Cheirolepis



†*Cheirolepis* Agassiz, 1835



Primer indiscutible actinopterigio



- Devónico Medio-Tardío
Norteamérica y Europa




Actinopterygios tempranos



**Grupo relativamente homogéneo
morfológicamente**


Innovaciones Actinopterygios

Actinopterygio stem - *Mimipiscis*




1 aleta dorsal (en vez de dos)

Sarcopterygio stem - *Guiyu*




Innovaciones Actinopterygios

Actinopterygio stem - *Mimipiscis*




Perdida de rayos óseos epicordales en la aleta caudal

Actinistia - *Diplurus*





Innovaciones Actinopterigios

Sarcopterigio - *Eusthenopteron*





Aletas **anal** y **dorsal** reforzadas con **radiales** delgados y paralelos





Innovaciones Actinopterygios

Escama Ganoidea



Articulación
entre escamas




10 μ m


Schultze 2016

Tipos de escama en actinopterigios



Escama ganoide y elamoide



Actinopterigio basal paleoniscoídeo



Lepisosteus osseus





g = ganoína
c = cavidad vascular
d = dentículos
i = isopedina o capa de hueso interna



Escamas

actinopterigios vs
sarcopterigios


Actinopterio basal
paleoniscoídeo





Sarcopterigio basal *Osteolepis*




Evolución de las escamas en osteíctios




Innovaciones Actinopterygios




Cubierta de acrodina en dientes







Moythomasia durgaringa



Moythomasia nitida



Mimipiscis



Moythomasia lineata sp. nov.

**Grupo relativamente homogéneo
morfológicamente**

Tendencias en el linaje:

- **Acortamiento** de la **boca**
- **Aumento** del tamaño de los huesos **operculares**
- **Estabilización** del techo del **cráneo** por grandes huesos (huesos parietal y postparietal)
- Cambio de **escamación** micromerica a **rómbica**

Carbonífero-Pérmico

Paleonisciformes, Paleoniscoideos y Condrósteos







FIGURA 2. Hipótesis abreviada de las relaciones filogenéticas de ciertos clados de Actinopterygii basada en Arratia (2001), Grande (2010) y Betancur-R. *et al.* (2013). Los polypteriformes no fueron incorporados en la ilustración.

†Palaeonisciformes


Devónico-Triásico

Grupo heterogéneo

Más de 17 familias



Mansfieldiscus



Ebonaqua ritchiei

En formas avanzadas:

- **Aumento en articulaciones** al interior del **cráneo**
- **Órbitas** mas **posteriores**
- Aleta **caudal** heterocerca **reducida**






FIGURA 2. Hipótesis abreviada de las relaciones filogenéticas de ciertos clados de Actinopterygii basada en Arratia (2001), Grande (2010) y Betancur-R. *et al.* (2013). Los polypteriformes no fueron incorporados en la ilustración.

Diversificación de formas Devónico-Jurásico

“Paleoniscoideos”

- †Cheirolepiformes
- †Guildayichthyiformes
- †Luganoiiformes
- †Perleidiformes
- †Phanerorhynchiformes
- †Pholidopleuriformes
- †Ptycholepiformes
- †Saurichthyiformes
- †Tarrasiiformes

Aun no bien resueltos





Friedman 2015

Tendencias en “Paleoniscoideos” a Neopterygii

- **Escamas** cambian de pesadas, gruesas y en forma de diamante a **delgadas, livianas y circulares**.
- Incremento en la **osificación** de la **columna vertebral**
- Aumento en la **movilidad** de la **mandíbula**


Chondrostei



A black and white photograph of a fossilized skull of a chondrichthyan, likely a shark. The skull is shown in lateral view, with the rostrum (snout) pointing towards the right. The eye socket is visible, and the gill arches are prominent. A scale bar in the bottom right corner indicates 2 cm.


Figure 1 is a detailed line drawing of the skull of a new species of the genus *Eryops*. The skull is shown in lateral view, with various bones labeled. The premaxilla (pm) is at the front, followed by the maxilla (mx) and the orbit (or). The postorbital (po) and parietal (pa) bones are visible. The occipital (oc) and nuchal (nu) bones are at the back. The mandible (md) is shown below the orbit. A scale bar of 2 cm is provided.






Innovaciones Chondrostei

Parasfenoides elongado posteriormente



Cladistia - *Polypterus*

Holostei - *Lepisosteus*



Triásico-Jurásico

Neopterygii: Holostei y Teleostei

POLYPTERIFORMES

Bichirs (2)

CHONDROSTEI

Paddlefish (2)

Sturgeon (4)

HOLOSTEI


Bowfin (1)

Gar (2)

ACTINOPTERYGII

NEOPTERYGII

TELEOSTEI
(4,500+)




Neopterygii

“Nueva aleta”

Holostei + Teleostei




Controversia Gar-Amia-Teleostei




after Huxley, 1861

Regan, 1923
 Goodrich, 1930
 Romer, 1945, 1966
 Jarvik, 1959, 1980
 Andrews et al., 1967
 McAllister, 1968
 Nelson, 1969
 Jollie, 1984
 Olsen and McCune, 1991
 Normark et al., 1991
 Lecointre et al., 1994
 Venkatesh et al., 1999
 Inoue et al., 2002



after Gardiner, 1960

Patterson, 1973
Wiley, 1976
 Nelson, 1976, 1984, 1994
 Bartram, 1977
 Rosen et al., 1981
Lauder & Liem, 1983
 Wiley & Schultz, 1984
 Gardner, 1984
 Nolf, 1985
 Verran, 1988
Gardner et al., 1996
 Liem et al., 2001




after Olsen, 1984



Neopterygii

“Nueva aleta”


1:1 rayo óseo /
pterigioforo



Chondrosteus




Polyodon spathula




Aleta anal pez neopterygio

Polypterus




Innovaciones Neopterygii

Amia




Pérdida articulación posterior maxila (mx)





Basal teleost

Polypterus



Innovaciones Neopterygii

Amia



Supramaxilar (smx)

Basal teleost

Grande 2010


Alimentación *Polypterus*



Protrusión Mandíbula



Polypterus





Basal teleost



Grande 2010

Innovaciones Neopterygii

Polypterus



Simpléctico y formación del suspensorium





Lepisosteus

Articulation between quadrate and quadratojugal

Grande 2010



Innovaciones Neopterygii



Teleost

Simpléctico y formación del suspensorium

Innovaciones Neopterygii




Simpléctico y formación del suspensorium

4-bar linkage model




Kinematics of jaw movement

Animations of 4-bar models fit to the
opercular mechanism of largemouth bass



From: Olsen, AM, Camp, AL, & Brainerd, EL (2017). The opercular mouth-opening mechanism of largemouth bass functions as a 3D four-bar linkage with three degrees of freedom

Otro diagrama






Alimentación por Succión




Innovaciones Neopterygii


Pérdida de la clavícula y extensión del cleithrum



Polypterus




Innovaciones Neopterygii



Basal teleost

Supraorbitales (su/sob)



Lepisosteus




FIGURA 2. Hipótesis abreviada de las relaciones filogenéticas de ciertos clados de Actinopterygii basada en Arratia (2001), Grande (2010) y Betancur-R. *et al.* (2013). Los polypteriformes no fueron incorporados en la ilustración.

Holostei (Triásico-)

Amiiformes (Jurásico-)

Amia calva

Dulceacuícola de Norteamérica.

(Cretácico-) Lepisosteiformes

"Pejelagartos" 2 géneros; 7 spp.

Dulceacuícolas de Norteamérica.





Amia calva



Lepisosteus





†Semionotiformes

Late Triassic – Early Cretaceous

Marinos y dulceacuícolas
Europa y Norteamérica






FIGURE 531. †*Semionotus elegans* (Newberry, 1888) *sensu* the †“*Semionotus elegans* species group” of Olsen and McCune (1991) (†Semionotiformes: †Semionotidae) used here for outgroup comparison in analysis of Lepisosteiformes and ingroup comparison for analysis of Neopterygii. From the Lower Jurassic freshwater deposits of the Boonton Formation of the Newark Supergroup, New Jersey. **A**) Black latex rubber peel of specimen YPM 6567 (150 mm SL) coated with ammonium chloride. **B**) Close-up of head region from **A**.



†Macrosemiiformes

Late Triassic – Early
Cretaceous

Marinos de arrecife
Europa y Norteamérica




FIGURE 534. †*Macrosemius rostratus* Agassiz, 1844 (†Macrosemiiformes: †Macrosemiidae) used here for outgroup comparison in analysis of Lepisosteiformes and ingroup comparison for analysis of Neopterygii. From the Upper Jurassic marine deposits of the Solnhofen Limestone, Germany. Anterior facing left. **A**) Well preserved acid-transfer prepared specimen (BMNH 37094; 105 mm SL); photograph of ammonium chloride coated specimen (left) and print of radiograph (right). **B**) Line drawing reconstruction of complete individual, mostly after Bartram (1977:fig. 1).

Lepisosteiformes

Early Cretaceous - Recent

Dulceacuícolas







FIGURE 552. Distribution maps of known Lepisosteiformes discussed in this monograph. Base map (equal area projection) is of present-day geography and was modified after Scotese and Golonka (1992). Stars indicate general localities and geographic range of occurrence. **A)** Extant species only. **B)** Extant range plus fossil occurrences.

Halecomorphi

o Amiiformes

Mid Triassic - Recent



Marinos y Dulceacuícolas

Amiidae

†Parasemionotiformes









†Onoscopiformes

†Caturroidea



Grande 2010

Holósteo (*Atractosteus*)





Holostei


“Todo hueso”

Fusión de las primeras
dos vértebras con cóndilo
occipital



Teleósteo (*Elops*)




2

Chondrostei - †*Psammorhynchus*Innovaciones
Holostei

Vómer pareado


Cladistia - *Polypterus*Holostei - *Lepisosteus*

Controversia Gar-Amia-Teleostei




after Huxley, 1861

Regan, 1923
 Goodrich, 1930
 Romer, 1945, 1966
 Jarvik, 1959, 1980
 Andrews et al., 1967
 McAllister, 1968
 Nelson, 1969
 Jollie, 1984
 Olsen and McCune, 1991
 Normark et al., 1991
 Lecointre et al., 1994
 Venkatesh et al., 1999
 Inoue et al., 2002



after Gardiner, 1960

Patterson, 1973
Wiley, 1976
 Nelson, 1976, 1984, 1994
 Bartram, 1977
 Rosen et al., 1981
Lauder & Liem, 1983
 Wiley & Schultz, 1984
 Gardner, 1984
 Nolf, 1985
 Verran, 1988
Gardner et al., 1996
 Liem et al., 2001





after Olsen, 1984

Consenso
 Morfología / Molecular

Síntesis

Actinopterygii:

- Aleta dorsal única
- Aleta caudal sin rayos epicordales (Aleta heterocerca)
- Radiales en aletas impares
- Ganoína y acrodina




Chondrostei:


Esqueleto desmineralizado

Neopterygii:

Alimentación por succión




Elopomorpha



Ostariophysi



Euteleostei




Clupeiformes

Teleósteos corona



Osteoglossomorpha



Bibliografia sugerida

- Vertebrados Fósiles de Chile (2015)
- Long, J. (2011) *The rise of fishes*. 2 ed.
- Helfman, Collette, Facey & Bowen (2009) *The diversity of fishes*. 2 ed.
- Arratia (2015) *Complexities of early Teleostei and the evolution of particular morphological structures through time*. *Copeia* 103(4), 999-1025

Actinopterygii

Peces con aleta radiada

Nicolás Cumplido S.

Estudiante Doctorado
Biología Molecular, Celular y
Neurociencias

Univ. de Chile

nicump@gmail.com






Curso Paleontología de Vertebrados. Enero 2016

Teleostei

Nicolás Cumplido S.
nicump@gmail.com



Curso Paleontología de Vertebrados. Abril 2016



El proceso posteroventral (puntas de flechas) del hueso cuadrado es una osificación membranosa en cambio la parte posterior del palatoc cuadrado (*pars quadrata*) es condral.