Ayudantia 15

1 de octubre de 2021

Teorema de Lusin

Sea f una función medible en el intervalo $[a, b]$. Para todo $\delta > 0$ existe una función continua g tal que

$$m\{x \in [a, b] : f(x) \neq g(x)\} < \delta$$

Sabemos que en un conjunto compacto una sucesión de funciones continuas que converge de manera uniforme converge a una función continua.

Va necesario usar dos cotas, por lo que contruiremos una sucesion f_n que converge a f excepto en un conjunto A de medida $\frac{\delta}{2}$. Sabemos que para una funcion medible y un real $\varepsilon > 0$ existe una funcion continua g tal que $|f - g| < \varepsilon$ excepto en un conjunto A_ε de medida menor a ε . Sea f_n una funcion continua tal que

$$|f - f_n| < \frac{\delta}{2} \frac{1}{2^n}$$

Excepto en un conjunto A_n tal que $mA_n < \frac{\delta}{2} \frac{1}{2^n}$

Sea $A = \bigcup A_n$. La medida de A esta acotada

$$mA < \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\delta}{2} \frac{1}{2^n} = \frac{\delta}{2}$$

y f_n converge uniformemente a f en $[a, b] \setminus A$.

El conjunto $[a, b] \setminus A$ es medible por lo que existe un conjunto cerrado $K \subset ([a, b] \setminus A) \subset [a, b]$ tal que $m([a, b] \setminus A) \setminus K < \frac{\delta}{2}$ y K es compacto porque $[a, b]$ es compacto.

Calculamos $m[a, b] \setminus K$

$$m[a, b] \setminus K = m([a, b] \setminus A) \setminus K + m(A) < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

Hemos encontrado un conjunto K tal que

- $m[a, b] \setminus K < \delta$
- $f = \lim f_n$
- f_n converge uniformemente y K es compacto por lo que f es continua en K

Falta demostrar que podemos extender una función continua en K a una función continua en $[a, b]$. Definimos $g = f$ en K . El conjunto K^c es abierto por lo que podemos escribirlo como la unión de intervalos abiertos y disjuntos. En cada uno de estos intervalos definimos g como la función lineal conectando los valores en cada extremo de estos intervalos. La función g es continua en $[a, b]$ e igual a f en K

Ejercicio

Sea $f : \mathbb{R} \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(x, t)$ es integrable para cada t . Si existe una función integrable $g(x)$ tal que $|f(x, t)| < g(x)$ para todo par (x, t) y $f(x, t)$ es continua para todo x entonces la función

$$F(t) = \int f(x, t) dx$$

es continua

En este ejercicio vemos que la condición $|f(x, t)| < g(x)$ para todo par (x, t) nos permite usar el teorema de convergencia dominada pero a diferencia de problemas que hemos visto antes, la variable t no es discreta. Tendremos que contruir una sucesion para aplicar este teorema.

Queremos demostrar la continuidad de la función F y sabemos que una función es continua si y solo si $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(x)$ para toda sucesión x_n que converge a x . Dado $t_0 \in [a, b]$ sea t_n una sucesión que converge a t_0 . La función $f_{t_n}(x) = f(x, t_n)$ esta acotada por $|f_{t_n}(x)| < g(x)$ para todo t_n por lo que podemos usar el teorema de convergencia dominada

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(t_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_{t_n}(x) dx = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_{t_n}(x) dx$$

La función $f(x, t)$ es continua en la variable t por lo que para toda sucesión t_n y todo x es cierto que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n, x) = f(t_0, x)$$

luego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(t_n) = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_{t_n}(x) dx = \int f(t_0, x) dx = F(t_0)$$

Esto es cierto para todo $t_0 \in [a, b]$ y toda sucesion que converge a t_0 , por lo que $F(t)$ es continua

Ejercicio

Demostrar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \log t = \int_1^{\infty} e^{-t} \log t$$

Para demostrar esta igualdad podemos usar el teorema de convergencia dominada o el teorema de convergencia monotonía. En esta ocasión usaremos el teorema de convergencia monotonía. Sabemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n = e^{-t}$$

por lo que basta demostrar que esta sucesión es creciente.

Llamemos $f_n(t) = (1 - \frac{t}{n})^n$ Dado que integramos en el intervalo $[1, n]$ podemos asumir que $t < n$ (el punto 1 tiene medida 0).
Desarrollamos esta fraccion

$$f_n(t) = \left(\frac{n-t}{n}\right)^n$$

$$f_{n+1}(t) = \left(\frac{n+1-t}{n+1}\right)^{n+1}$$

Vemos que en ambos casos (ignorando la potencia) el numerador es igual al denominador menos t . Podemos usar esta relacion para contruir una funcion g_n que relacione a f_n con f_{n+1}

Para definir esta funcion g_n intercambiamos el denominador de f_{n+1} por el numerador de f_n y obtenemos

$$g_n(t) = \frac{(n+1-t)^{n+1}}{(n-t)^n}$$

$$g_n(0) = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^n}$$

Ahora podemos usar g_n para demostrar que la sucesion f_n es creciente pues $f_n \leq f_{n+1}$ si y solo si $g_n(0) \leq g_n(t)$

Podemos comprobar esta desigualdad derivando

$$g'_n(t) = \frac{n(n-t)^{n-1}(n+1-t)^{n+1} - (n+1)(n+1-t)^n(n-t)^n}{(n-t)^{2n}}$$

Podemos factorizar el numerador por $(n-t)^{n-1}(n+1-t)^n$ y obtenemos

$$g'_n(t) = \frac{t(n-t)^{n-1}(n+1-t)^n}{(n-t)^{2n}}$$

esta derivada es positiva para $t < n$ por lo que $g_n(0) \leq g_n(t)$ y posemos usar el teorema de convergencia monotona para demostrar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \log t = \int_1^\infty e^{-t} \log t$$