


A. Sommerfeld: considerar órbitas elípticas.

Átomo de H:



$$V(r) = -\frac{e^2 Z^2}{r} \quad (0 \leq s, s = -1)$$

$$s = -1 \Rightarrow \langle T \rangle = -E \quad (1)$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 = T_r + T_\theta$$

$$\langle T_\theta \rangle = \left\langle \frac{1}{2} m r^2 \dot{\theta}^2 \right\rangle = \left\langle m r^2 \dot{\theta} \cdot \frac{1}{2} \dot{\theta} \right\rangle = \frac{L}{2} \langle \dot{\theta} \rangle = \frac{\hbar l}{2} \langle \dot{\theta} \rangle$$

$$\text{pero } \langle \dot{\theta} \rangle = 2\pi \nu_E \Rightarrow \langle T_\theta \rangle = \frac{\hbar l}{2} \cdot 2\pi \nu_E = \boxed{\frac{\hbar l \nu_E}{2}}$$

$$\text{end } \langle T_r \rangle = \frac{n \hbar}{2\tau} = \boxed{\frac{n \hbar \nu_E}{2}}$$

$$\Rightarrow E = -\langle T \rangle = -\frac{\hbar \nu_E}{2} (n+l) = -\frac{\hbar \nu_E}{2} N$$

$$\text{Kepler: } \tau^2 = \frac{m \pi^2}{2 Z e^2} R^3, \text{ end } E = -\frac{Z e^2}{R}$$

$$\Rightarrow E^2 = \frac{\hbar^2 N^2}{4 \tau^2} = \frac{\hbar^2 N^2}{4} \cdot \frac{2 Z e^2}{m \pi^2 R^3} = \frac{\hbar^2 N^2 Z e^2}{2 \pi^2 m} \cdot \frac{E^3}{Z^3 e^6}$$

$$\Rightarrow l = \frac{n^2 \hbar^2 E}{(ze^2)^2 2\pi^2 m}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{nl} = -\frac{m z^2 e^4}{2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{(n+l)^2}}$$

numero cuantico radial

numero cuantico angular

Una partícula no-relativista de masa m es mantenida en órbita circular alrededor del origen por una fuerza $f(r) = -kr$, donde k es una constante positiva.

(a) Demuestre que la energía potencial se puede escribir como

$$U(r) = kr^2/2$$

Asumiendo $U(r) = 0$ cuando $r = 0$.

(b) Asumiendo la cuantización de Bohr del momento angular de la partícula, muestre que el radio de la órbita de la partícula y su velocidad v pueden ser escritos como

$$v^2 = \left(\frac{n\hbar}{m} \right) \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2} \quad r^2 = \left(\frac{n\hbar}{k} \right) \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2}$$

donde n es un entero.

(c) Por lo tanto, demuestre que la energía total de la partícula es

$$E_n = n\hbar \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2}$$

(d) Si $m = 3 \times 10^{-26}$ kg y $k = 1180 \text{ Nm}^{-1}$, determine numericamente la longitud de onda del fotón en nm que causará una transición entre niveles sucesivos de energía.



$$f = -kr$$

$$(a) \quad U = - \int f \cdot dr = + \int kr dr = \frac{k}{2} r^2 \quad U(0) \text{ si } r=0$$

$$(b) \quad 2\pi r = n\lambda = \frac{nh}{p} = \frac{nh}{mvr}$$

$$\Rightarrow r = \frac{nh}{mvr} \quad \text{but} \quad \frac{mv^2}{r} = kr \Rightarrow v^2 = \frac{kr^2}{m}$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{n^2 h^2}{m^2 v^2} = \left(\frac{nh}{m} \right)^2 \frac{m}{kr^2} \Rightarrow r^4 = \left(\frac{m}{k} \right) \left(\frac{nh}{m} \right)^2$$

$$\Rightarrow r^2 = \left(\frac{nh}{m} \right) \sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{nh}{\sqrt{mk}} = \frac{nh}{\sqrt{mk}} \sqrt{\frac{k}{k}} = \left(\frac{nh}{k} \right) \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$c = \lambda v$$

$$\text{we go, } v^2 = \frac{k}{m} \left(\frac{nh}{k} \right) \sqrt{\frac{k}{m}} = \left(\frac{nh}{m} \right) \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E = \hbar \omega$$

$$E = K + U = \frac{1}{2} m \cdot \left(\frac{nh}{m} \right) \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2} + \frac{1}{2} k \cdot \left(\frac{nh}{k} \right) \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2} = \left[nh \left(\frac{k}{m} \right)^{1/2} \right]$$

$$(c) \quad m = 3 \times 10^{-26} \text{ kg}, \quad k = 1180 \text{ N m}^{-1} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \left[1.983 \times 10^{14} \text{ Hz} \right]$$

$$\begin{aligned} E_n &= (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega \\ E_{n+1} &= (n + \frac{3}{2}) \hbar \omega \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \Delta E &= \hbar \omega = 6.626 \times 10^{-34} \frac{\text{m}^2 \text{kg}}{\text{s}} \times 1.983 \times 10^{14} = \\ &= 9.511 \times 10^{-6} \quad = \frac{hc}{\Delta E} \end{aligned} \right. \quad \left[9511 \text{ nm} \right]$$

Construyendo la ec. de Schrödinger

$\lambda = \frac{h}{p} \rightarrow$ cuál es la "ec. de onda" para una partícula?

onda infinita: $\psi = A \cos(kx - \omega t)$ (0)

Pulso finito = superposición de ondas planas,
aunque q' el pulso finito también satisface
la misma ec. q' la onda plana $\Rightarrow$ Ec. debe ser LINEAL

E. total partícula = $\hbar\omega$ $\leftarrow$ frec. onda.

$$\begin{aligned} E &= \hbar\omega \\ &= \frac{p^2}{2m} + V = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V \end{aligned} \quad (1)$$

$$(0) \rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} = -Ak \sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -Ak^2 \cos(kx - \omega t) = -k^2 \psi$$

$$\text{pero } k^2 = \frac{2m(E-V)}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{2m(E-V)}{\hbar^2} \psi} \quad (2)$$

$k = \text{cte.}, V = \text{cte.} \Rightarrow (2)$ solo reformulada de Broglie.

Idea de Schrödinger: $E_c(z)$ es válida también
cuando $V = V(x)$.

Introduciendo el tiempo:

$$\psi = A \cos(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \omega A \sin(kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos(kx - \omega t) = -\omega^2 \psi \quad (3)$$

de $E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi$ y cuando $\omega = E/\hbar$

$$\Rightarrow \hbar \omega \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi \quad (3')$$

si introducimos en (3) en (3'):

$$\hbar^2 \omega^2 \psi^2 = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi \right]^2$$

$$-\hbar^2 \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi \right]^2 \quad \text{NO LINEAL}$$

→ ←

Idea: usar $\psi = A e^{i(kx - \omega t)}$ (como en óptica)

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\omega A e^{i(kx - \omega t)} = -i\omega \psi$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{iE}{\hbar} \psi \quad (4)$$

$$\Rightarrow \boxed{i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi} \quad (5)$$

Ec. de S. t-dependiente en 1D.

$\psi(x) \rightarrow$ no observable

$$\text{Intensidad} = |\psi|^2 = \psi\psi^* = A^*A = |A|^2 \in \mathbb{R}$$

Justificación : acuerdo con incontables experimentos

$|\psi(x,t)|^2 :=$ densidad de probabilidad de hallar la partícula en posición x , en el instante t
 $= |\psi(x,t)|^2 dx dt$

CONSTRUYENDO LA EC. DE SCHRÖDINGER

Schrödinger 1^{er} intento

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4 \quad (\text{partícula libre})$$

$$\Psi = A e^{i(kx - \omega t)}$$

$$E = \hbar \omega, \quad \vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\omega \Psi \Rightarrow \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 \Psi = -\frac{E^2}{\hbar^2} \Rightarrow \boxed{E^2 = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}}$$

$$\Rightarrow \boxed{-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Psi = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \Psi + m^2 c^4 \Psi} \quad \text{Ec. de Klein-Gordon}$$

No resuelto para los e^- !

$\Rightarrow$ tomar límite no-relativista

$$E = (p^2 c^2 + m^2 c^4)^{1/2} \simeq mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \dots$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[mc^2 + \frac{p^2}{2m} + \dots \right] \Psi$$

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + mc^2 \Psi}$$

$\downarrow$ puede eliminarse

$$\Psi \rightarrow e^{-\frac{imc^2 t}{\hbar}} \Psi$$

desaparece el término cte.
No afecta $|\Psi|^2$.