Ayudantía 7 ☀

OBS: Se recomienda revisarlos de forma individual independiente de la solución hecha en ayudantía.

Matrices, grupos y Teo. de Cayley.

1. Muestre que los elementos de $GL_n(\mathbb{R})$ con entradas enteras y determinante $1, -1$ forman un subgrupo de $GL_n(\mathbb{R})$. Este grupo se denota $GL_n(\mathbb{Z})$.
Sea $GL_n(\mathbb{R})$ el grupo de todas las matrices invertibles $n \times n$ con entradas reales y determinante no nulo:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) \neq 0\}$$

donde $M_n(\mathbb{R})$ es el conjunto de matrices $n \times n$ con entradas en $\mathbb{R}$.

El subgrupo a demostrar es $GL_n(\mathbb{Z})$, y es definido como:

$$GL_n(\mathbb{Z}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) \mid A \in M_n(\mathbb{Z}) \text{ y } \det(A) = \pm 1\},$$

$$M_n(\mathbb{Z}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A_{ij} \in \mathbb{Z}, \forall i, j\}.$$

Dem:

1. El elemento identidad está en $GL_n(\mathbb{Z})$:

El elemento identidad de $GL_n(\mathbb{R})$ es la matriz identidad I_n , que es la matriz $n \times n$ con 1s en la diagonal y 0s fuera de la diagonal:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz identidad tiene entradas enteras y $\det(I_n) = 1$, por lo que $I_n \in GL_n(\mathbb{Z})$. Así, el elemento identidad está en $GL_n(\mathbb{Z})$.

2. Cerrado bajo el producto:

Sean dos matrices A y B en $GL_n(\mathbb{Z})$. Esto significa que A y B tienen entradas enteras y $\det(A), \det(B) = \pm 1$.

P.d que el producto AB también tiene entradas enteras y determinante ± 1 .

- Entradas enteras: Si A y B tienen entradas enteras, el producto de dos matrices con entradas enteras también tiene entradas enteras, ya que la multiplicación de enteros da como resultado un entero. Por lo tanto, AB tiene entradas enteras.

- Determinante: Sabemos que $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$. Como $\det(A) = \pm 1$ y $\det(B) = \pm 1$, el determinante de AB es:

$$\det(AB) = (\pm 1)(\pm 1) = \pm 1.$$

Por lo tanto, $GL_n(\mathbb{Z})$ es cerrado bajo el producto.

3. Cerrado bajo la inversión:

Finalmente, debemos probar que si $A \in GL_n(\mathbb{Z})$, entonces $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{Z})$, es decir, que la inversa de A tiene entradas enteras y determinante ± 1 .

- Determinante: Si $A \in GL_n(\mathbb{Z})$, entonces $\det(A) = \pm 1$. Por propiedades de los determinantes, el determinante de la inversa de A es:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Dado que $\det(A) = \pm 1$, tenemos que $\det(A^{-1}) = \pm 1$, por lo que A^{-1} tiene determinante ± 1 .

- Entradas enteras: Si A es una matriz con entradas enteras y $\det(A) = \pm 1$, entonces A^{-1} también tiene entradas enteras.

Por lo tanto, $A^{-1} \in GL_n(\mathbb{Z})$.

2. Verifique que el teorema de Cayley aplicado a $\mathbb{R}$ produce el subgrupo de $S_{\mathbb{R}}$ que contiene todas las traslaciones de la recta real.

Recuerdo de teorema de Cayley: Todo grupo G es isomorfo a un subgrupo del grupo simétrico S_G , el cual es el grupo de permutaciones de los elementos de G .

Sea la acción de $(\mathbb{R}, +)$ sobre sí mismo mediante traslaciones definiendo la función de traslación $T_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ para un elemento fijo $a \in \mathbb{R}$:

$$T_a(x) = x + a \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Esta traslación T_a es una permutación de $\mathbb{R}$ porque es biyectiva y tiene una inversa que es la traslación $T_{-a}(x) = x - a$.

La aplicación de una traslación T_a es una permutación del conjunto $\mathbb{R}$, y la composición de dos traslaciones corresponde a sumar los desplazamientos. Es decir, si aplicamos dos traslaciones sucesivas, T_a seguido de T_b , tenemos:

$$T_a \circ T_b(x) = T_a(T_b(x)) = T_a(x + b) = (x + b) + a = x + (a + b).$$

Esto muestra que la composición de las traslaciones es equivalente a la adición de los elementos a y b en $\mathbb{R}$.

El teorema de Cayley implica que cada elemento $a \in \mathbb{R}$ se puede representar como la permutación T_a en el grupo de permutaciones $S_{\mathbb{R}}$ (el grupo simétrico de todas las permutaciones de $\mathbb{R}$). Podemos definir un homomorfismo (que mantiene operación) de grupos $\phi : \mathbb{R} \rightarrow S_{\mathbb{R}}$ dado por:

$$\phi(a) = T_a.$$

Este homomorfismo es inyectivo porque si $T_a = T_b$, entonces $a = b$, lo que implica que ϕ es un monomorfismo. Por lo tanto, $(\mathbb{R}, +)$ es isomorfo a un subgrupo de $S_{\mathbb{R}}$, y este subgrupo está compuesto por las traslaciones de la forma T_a para $a \in \mathbb{R}$.

3. Sean G y H grupos. Si $(a, b) \in G \times H$ con a y b de orden finito k y h respectivamente, entonces el orden de $(a, b) \in G \times H$ es el $mcm(k, h)$.

Dem:

Se tiene que $a^k = e_G$ y $b^h = e_H$. Hay que encontrar el menor m tal que $(a^m, b^m) = (e_G, e_H)$.

Ya que k es el orden de a , con $n \in \mathbb{R}$. También, para b , con $l \in \mathbb{Z}$ se tiene

$$a^m = a^{k*n}$$

$$b^m = b^{h*l}.$$

El valor más pequeño de m debe cumplir que sea múltiplo tanto de k como de h , por lo que necesariamente debe ser su mcm . Por lo tanto, el orden de (a, b) es $mcm(k, h)$.