

::::: Guía 0 ::::: Problemas de Trigonometría y Geometría :::::
FÍSICA I Verano 2007 **::: Profesor:** Andrés Meza **::: Entrega Tarea 0:** 03 Enero 2007

:::: Objetivos ::::

- 1::** Ángulos. Sistema sexagesimal y radianes.
- 2::** Funciones e identidades trigonométricas. Aplicaciones.
- 3::** Aproximaciones numéricas.
- 4::** Estimaciones y ordenes de magnitud..
- 5::** Cálculo numérico.

La mayoría de estos ejercicios NO pretenden ser ingeniosos, se trata de repasar o aprender las herramientas básicas de matemáticas que se utilizan normalmente en la resolución de ejercicios en este curso.

Si tienes dificultades con estos ejercicios, consulta cualquier libro básico de trigonometría o la sección "Complemento Matemático" del libro "Introducción a la Mecánica" del Profesor Nelson Zamorano (**NZ**) que se encuentra en la página web <http://www.escueladeverano.cl/fisica>


:::: Indicaciones ::::

En esta guía se incluyen los problemas de la **Tarea 0 (problemas P12, P19 y P20)**. Estos problemas deben ser resueltos y entregados el primer día de clases **miércoles 03 enero 2007 de 14:30 a 16:00 hrs.** en un buzón ubicado en la oficina de la Escuela de Verano (Edificio Escuela, primer piso).

P1. Sistema sexagesimal: Definición de 1° , $1'$ (un minuto de arco), $1''$ (un segundo de arco)

¿Que es un Radián?

- 1::** Con un compás, dibuje un círculo en un papel. No olvide marcar el centro.
- 2::** Corte varios trozos de hilo, todos con un largo igual al radio de la circunferencia. ¿Cuántos de estos trozos de hilo se necesitan para cubrir el largo de la circunferencia? O puesto de otro modo, ¿cuántos radios caben en el largo de la circunferencia?
- 3::** Mida el ángulo que subtiende uno de estos trozos de cuerda. Esto es por definición **UN RADIÁN**.



- 4::** Repita la misma operación **1::**, **2::** y **3::** para una circunferencia de mayor radio que la anterior.
- 5::** Compare el valor del ángulo subtendido por el radio en ambos casos.
- 6::** Dado que el ángulo medido en radianes se obtiene a partir de la razón entre dos segmentos, ¿cuál debe ser la dimensión de un radián?

P2.

- > ¿A cuántos radianes equivale un segundo?
- > ¿A cuántos segundos equivale un radián?

P3.

Expresa en radianes los ángulos:

- a) 45°
- b) 30°
- c) 105°
- d) $22^\circ 30'$
- e) 18°

P4.

Expresar en grados sexagesimales los ángulos:

- a) $3\pi/4$
- b) $7\pi/45$
- c) $5\pi/27$
- d) $5\pi/24$
- e) 0,3927

P5.

Una manilla de una máquina da vueltas sin cambiar su rapidez, a una razón de 35 revoluciones por minuto (**RPM**).

> ¿Cuánto tiempo tarda en girar 5 radianes?

P6. Trigonometría (NZ pp. 441-452)

Demuestre que:

$$\sin \alpha \cos \alpha \tan \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \cot \alpha = 1.$$

P7.

Determine el valor numérico de:

$$3 \tan^2 30^\circ + \frac{1}{4} \sec 60^\circ - 5 \sin^2 60^\circ.$$

P8.

Encuentre los valores de θ que satisfacen la ecuación:

$$3 \sin^2 \theta + 5 \sin \theta = 2.$$

Indicación: Defina $x = \sin \theta$, reemplace en la ecuación y resuélvala para encontrar θ .

P9.

Determine el ángulo de elevación del Sol cuando la sombra de un poste de 6 m de altura es de $2\sqrt{3}$ m de largo.

P10.

Un asta de bandera es colocada en lo alto de un edificio. Desde una distancia D del edificio, los ángulos de elevación de la punta del asta y del borde superior del edificio son α y β , respectivamente.

> ¿Cuál es el largo del asta?

P11.


El punto medio de uno de los lados de un cuadrado se une a uno de los vértices opuestos del mismo,

> Encuentre la magnitud de los dos ángulos que se formaron en ese vértice.

P12. (Problema #1 Tarea 0)

El ángulo de elevación de la parte superior de una columna vista desde el pie de una torre es α y desde la parte superior de la torre es β . Si la torre tiene una altura **h**:

> ¿Cuál es la altura de la columna?



P13.

- a) Dado $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, calcule $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.
- b) Dado $\tan 135^\circ = -1$, calcule $\sin 135^\circ$.
- c) Dado $\sec\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2$, calcule $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ y $\cot\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.
- d) Si $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, evalúe $\sin \alpha$ y $\tan \alpha$.
- e) Si $\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, calcule $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ y $\sec\left(\frac{5\pi}{4}\right)$.

P14.

Evalúe:

- a) $\cos 0^\circ \sin^2 270^\circ - 2 \cos 180^\circ \tan 45^\circ = ?$
- b) $\tan \pi \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \sec(2\pi) - \operatorname{cosec}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = ?$
- c) $3 \sin 0^\circ \sec 180^\circ + 2 \operatorname{cosec} 90^\circ - \cos 360^\circ = ?$
- d) $2 \sec^2 \pi \cos 0^\circ + 3 \sin^3\left(\frac{3\pi}{2}\right) \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2}\right) = ?$

P16.

Determine el valor de:

- a) $\cos(480^\circ)$
- b) $\sin(960^\circ)$
- c) $\cos(-780^\circ)$
- d) $\sin\left(\frac{15\pi}{4}\right)$
- e) $\cot\left(\frac{23\pi}{4}\right)$
- f) $\sec\left(\frac{7\pi}{3}\right)$
- g) $\sin(1,125^\circ)$
- h) $\sin(855^\circ)$
- i) $\sec\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right)$

P17.

Encuentre **todos** los ángulos (menores que 360°) que satisfacen las ecuaciones:

- a) $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- b) $\sin \theta = -\frac{1}{2}$
- c) $\tan \theta = \sqrt{3}$

P18.

Simplifique las siguientes expresiones:

$$a) \frac{\sin(-\beta)}{\sin(180^\circ + \beta)} - \frac{\tan(90^\circ + \beta)}{\cot(\beta)} + \frac{\cos(\beta)}{\sin(90^\circ + \beta)} = ?$$

$$b) \frac{\cos(90^\circ + \beta) \sec(-\beta) \tan(180^\circ - \beta)}{\sec(360^\circ + \beta) \sin(180^\circ + \beta) \cot(90^\circ + \beta)} = ?$$

P19. (Problema #2 Tarea 0)

Demuestre que:

$$a) \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta$$

$$b) \sin(\alpha + 45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sin \alpha + \cos \alpha)$$


$$c) \cos(\alpha + 45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\cos \alpha - \sin \alpha)$$

$$e) \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = \tan \alpha + \tan \beta$$

P20. (Problema #3 Tarea 0)

> Determine el ángulo α que subtiende la barra de largo L , que permanece en reposo en el cilindro de radio R de la figura.

> ¿A qué altura se ubica el punto medio de la barra L medido a partir del piso? Dé su respuesta en función del ángulo θ , que suponemos conocido.

**P21.**

$$\text{Si } \sin \alpha = \frac{3}{5} \text{ y } \cos \alpha = \frac{12}{13}$$

> Evalúe $\cos(\alpha + \beta)$ y $\sin(\alpha - \beta)$

P22.

Compruebe las siguientes identidades:

$$a) \cos(\alpha + \beta) \cos \beta + \sin(\alpha + \beta) \sin \beta = \cos \alpha$$

$$b) \sin(3\alpha) \cos \alpha - \cos(3\alpha) \sin \alpha = \sin(2\alpha)$$

$$c) \frac{\tan(\alpha - \beta) + \tan \beta}{1 - \tan(\alpha - \beta) \tan \beta} = \tan \alpha$$

$$d) 1 + \tan(2\alpha) \tan \alpha = \sec(2\alpha)$$

P23.

Compruebe que:

$$a) \frac{\sin(2\alpha)}{1 + \cos(2\alpha)} = \tan \alpha$$

$$b) \frac{1 + \sec \alpha}{\sec \alpha} = 2 \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

P24. Aproximaciones (NZ pp. 424-434)

Haciendo uso de la aproximación $(1+x)^R \approx 1+Rx$, válida para $|x| \ll 1$

> Calcule en forma aproximada (**sin usar calculadora**) los siguientes valores (use $\pi \approx 3,14$):

a) $\sqrt{1,001}$

b) $\sqrt{0,98}$

c) $\sqrt{102}$

d) $\sqrt{\pi}$

e) $\frac{1}{\pi}$

f) π^2

g) $\sqrt{2}$

h) $\sqrt{60,5}$

P25.

Haciendo uso de la misma aproximación calcule los siguientes cuocientes:

a) $\frac{1}{101}$

b) $\frac{905}{77}$

c) $\frac{303}{220}$

d) $\frac{\sqrt{50}}{703}$

e) $\frac{800}{802}$

f) $\frac{\sqrt{88}}{0,015}$

P26.

En un tablero de ajedrez hay 8x8 casilleros. En el primero de ellos se pone un grano de maíz; en el segundo el doble del anterior; en el tercero el doble del anterior, y así sucesivamente.

> Calcule el número aproximado de granos de maíz que se requieren para toda la operación y estime su volumen. Compárelo con el volumen de la Tierra.

P27.

Una hoja de papel tipo carta, es doblada por la mitad, de esta manera el área resultante es la mitad y el espesor es el doble de la hoja original. Si este proceso se repite sucesivamente con la hoja resultante, estime el número de veces que se debe doblar una hoja para que el espesor cubra la distancia que separa a la tierra de la Luna.

> Calcule el área de la hoja resultante al final del proceso. Compare este número con el tamaño de un átomo.

P28. (Excel)

Se puede demostrar, por métodos que no nos interesan aquí, que la siguiente serie que contiene infinitos términos, tiene el valor

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \dots$$

Usando una tabla Excel, sume el número suficiente de términos de esta serie, de forma que alcance el resultado 3,142, es decir, obtenga el valor aproximado con tres decimales.

P29. (Excel)

Usando Excel, haga un gráfico de las siguientes funciones trigonométricas

- a) $\sin(\alpha)$ para $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.
- b) $\cos(\alpha)$ para $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.
- c) $\tan(\alpha)$ para $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.
- d) $\sin(5\alpha)$ para $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.
- e) $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right)$ para $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.

Misceláneos – Ordenes de Magnitud.

"Conocer el grado de precisión que permite la naturaleza del problema y no buscar exactitud donde sólo una verdad aproximada es posible, constituye el sello de una mente entrenada."

Aristóteles

P30.

Estime cuántos trabajadores se necesitaron para construir una pirámide. Necesita recolectar datos como la densidad de las piedras, el tamaño de las pirámides, cuánto trabajo puede hacer un hombre en un día, la energía potencial de la pirámide...y hacer algunas suposiciones como la siguiente: dónde se encontraban las piedras utilizadas.

Referencia: Juegos matemáticos, Ian Stewart, "Investigación y Ciencia", Noviembre 1998, pag. 86. (Problema 28).

P31.

Benjamín Franklin notó que al dejar una gota de aceite en la superficie de un lago, ésta no se esparcía más allá de una cierta superficie. También notó que si el número de gotas de aceite se aumentaba al doble, el área cubierta también se duplicaba. Concluyó que dicho valor era el máximo posible que una cierta cantidad de aceite lograba extenderse. Al realizar el experimento notó que $0,1 \text{ cm}^3$ de aceite cubrían un área de aproximadamente 40 cm^2 . ¿De qué espesor es la capa de aceite?

Si la distancia entre átomos de una molécula en un líquido o gas corriente es de $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$.

En el tipo de aceite que Franklin usó se puede suponer que cada molécula tenía 10 átomos.

> ¿De cuántos átomos de espesor era la película de aceite formada?

P32.

Estime la distancia promedio que separa a cada molécula de agua líquida H_2O , utilizando sólo los siguientes datos:

1.- el agua líquida tiene una densidad de 1 g cm^{-3} .

2.- 18 g de agua líquida contienen $N = 6,02 \times 10^{23}$ moléculas de H_2O .

Si la densidad del hielo disminuye en un 8% con respecto al agua líquida:

> Calcule el cambio porcentual en la distancia entre moléculas en ambos estados.