

Instrucciones Seminario 4: Vía Adrenérgica II

El Seminario 4: Vía Adrenérgica II tratará sobre el uso de fármacos **antagonistas adrenérgicos**. Esta actividad consistirá en la exposición de un reporte de caso (informe detallado de los síntomas, signos, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de un paciente individual), asociado al uso de estos fármacos.

Cada grupo en cada sección de seminario deberá exponer un reporte de caso distinto (ver **Distribución**) además de todo lo necesario para entender el artículo; pueden apoyarse de bibliografía adicional que sustente su exposición.

Se espera que sepan discriminar la información del reporte de caso que es pertinente al tema del seminario 4.

La presentación debe tener una duración **máxima de 10 minutos** y será seguida de una ronda de preguntas de **5 minutos**. El control será de salida, de desarrollo e individual, e incluirá contenidos revisados en el seminario.

En caso de consultas, no duden en comunicarse con el equipo de ayudantes.

Distribución:

- ★ **Grupo 1:** NEBIVOLOL INDUCED HYPERKALEMIA.
- ★ **Grupo 2:** Deep coma in a child treated with propranolol for infantile hemangioma.
- ★ **Grupo 3:** Complete atrioventricular block due to timolol eye drops: a case report and literature review.
- ★ **Grupo 4:** Tamsulosin-induced severe hypotension during general anesthesia: a case report.
- ★ **Grupo 5:** Yohimbine Induced Type II Myocardial Injury: An Underrecognized and Dangerous Adverse Effect.

Éxito!