Auxiliar #4 MA12A

Miguel Angel Carrasco.

1 Resumen

1.1 Derivadas de Orden Superior

Se define la derivada de orden n en forma inductiva como sigue

$$f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]'$$
$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

Notación: $f^{(n)}(x)$, $y^{(n)}$ o bien $\frac{d^n y}{dx^n}$

Ejemplos

- $y = x^n$

$$y^{(k)} = n(n-1) \cdots (n-k+1)x^{n-k}$$

Si $k > n$ la derivada k -ésima es 0

- $y = e^{-ax}$

$$y^{(n)} = (-1)^n e^{-ax} a^n$$

- $y = \operatorname{sen} x$

$$(\operatorname{sen} x)^{(n)} = \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{2} + x \right)$$

- $y = \operatorname{cos} x$

$$(\operatorname{cos} x)^{(n)} = \operatorname{cos} \left(\frac{n\pi}{2} + x \right)$$

1.2 Fórmula de Leibnitz

$$(f \cdot g)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$$

1.3 Recta Tangente y Normal

- Tangente: $y - y_0 = y'_0(x - x_0)$ con $y'_0 = f'(x_0)$
- Normal: $y - y_0 = -\frac{1}{y'_0}(x - x_0)$ cuando $f'(x_0) \neq 0$

Figura 1: Rectas Tangente y normal a una curva en el punto $P(x, y)$

2 Problemas

P1. Demuestre que la recta tangente a la curva

$$x^2 + y^2 = e^{2k \arctan \frac{y}{x}}$$

k constante, por un punto $P(x_0, y_0)$ de ella, forma un ángulo constante con la recta que une P con el origen.

P2. Sea $f(x) = x \cos x - \sin x$

1. Calcular $f^{(n)}(x)$
2. Demostrar que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left(\frac{\ln x}{x}\right)^n = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left[\ln(x) - 1 - \frac{1}{2} \cdots - \frac{1}{n} \right]$$

Ind: Calcule previamente $\left(\frac{1}{x}\right)^{(p)}$ y $(\ln x)^{(p)}$

P3. Sea $f(x) = \ln\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$ donde $a > 0$ y $|x| < a$

Calcular $f^{(n)}(x)$ y luego $f^{(n)}(0)$ para los casos n par y n impar.

3 Soluciones

P1. Demuestre que la recta tangente a la curva

$$x^2 + y^2 = e^{2k \arctan \frac{y}{x}}$$

k constante, por un punto $P(x_0, y_0)$ de ella, forma un ángulo constante con la recta que une P con el origen.

Sol: Calculemos y'

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= e^{2k \arctan \frac{y}{x}} & \left| \frac{d}{dx} \right. \\ (x + yy') &= k(y'x - y) \end{aligned}$$

luego $y' = \frac{x+ky}{kx-y}$

En el punto $P(x_0, y_0)$ tenemos

$$L1 : y - y_0 = y'(x_0, y_0)(x - x_0) \text{ recta tangente.}$$

y

$$L2 : y = \frac{y_0}{x_0}x \text{ recta que une } P \text{ con el origen}$$

Notemos que

$$\tan(\alpha) = y'(x_0, y_0) = \frac{x_0 + ky_0}{kx_0 - y_0}$$

$$\tan(\beta) = \frac{y_0}{x_0}$$

$\theta = \alpha - \beta$ pero

$$\tan(\theta) = \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan(\alpha) - \tan(\beta)}{1 + \tan(\alpha) \tan(\beta)}$$

desarrollando

$$\tan(\theta) = \frac{x_0^2 + y_0^2}{kx_0^2 + ky_0^2} = \frac{1}{k}$$

finalmente $\theta = \arctan\left(\frac{1}{k}\right)$

P2. Sea $f(x) = x \cos x - \operatorname{sen} x$

1. Calcular $f^{(n)}(x)$
2. Demostrar que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left(\frac{\ln x}{x}\right)^n = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left[\ln(x) - 1 - \frac{1}{2} \cdots - \frac{1}{n} \right]$$

Ind: Calcule previamente $\left(\frac{1}{x}\right)^{(p)}$ y $(\ln x)^{(p)}$

Sol:

1. $f^{(n)}(x) = (x \cos x)^{(n)} - (\operatorname{sen} x)^{(n)}$ Calculemos por separado ambas derivadas.
Por la *fórmula de Leibnitz* se tiene que

$$\begin{aligned} (x \cos x)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{(k)} (\cos x)^{(n-k)} \\ &= x (\cos x)^{(n)} + n (\cos x)^{(n-1)} \end{aligned}$$

y como $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$ y $(\operatorname{sen} x)^{(n)} = \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$ se obtiene

$$f^{(n)}(x) = x \cos\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) + n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + x\right) - \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$$

2.

$$\left(\frac{1}{x}\right)^{(p)} = \frac{(-1)^p p!}{x^{p+1}} \quad \text{y} \quad (\ln x)^{(p)} = \frac{(-1)^{p-1} (p-1)!}{x^p}$$

Sabiendo esto y utilizando la *fórmula de Leibnitz*

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{x} \ln x\right)^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{x}\right)^{(n-k)} (\ln x)^{(k)} \\ &= \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} \ln x + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{(-1)^{n-k} (n-k)!}{x^{n-k+1}} \cdot \frac{(-1)^{k-1} (k-1)!}{x^k} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x + \frac{(-1)^{n-1}}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (n-k)! (k-1)! \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x + \frac{(-1)^{n-1}}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(n-k)! k!} (n-k)! (k-1)! \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \ln x + \frac{(-1)^{n-1}}{x^{n+1}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}} \left[\ln x - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right] \end{aligned}$$

P3. Sea $f(x) = \ln\left(\frac{a+x}{a-x}\right)$ donde $a > 0$ y $|x| < a$

Calcular $f^{(n)}(x)$ y luego $f^{(n)}(0)$ para los casos n par y n impar.

Sol: notemos que

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln\left(\frac{a+x}{a-x}\right) \\ &= \ln(a+x) - \ln(a-x) \end{aligned}$$

ademas

$$f^{(n)}(x) = (\ln(a+x))^{(n)} - (\ln(a-x))^{(n)}$$

notando que $(\ln(a+x))^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(a+x)^n}$ y $(\ln(a-x))^{(n)} = (-1)^n \frac{(n-1)!}{(a-x)^n}$ con $n \geq 1$ se obtiene el resultado.

4 Problemas Propuestos

- 1. Encuentre la recta tangente a la curva de ecuación

$$e^{2 \operatorname{arcsen} yx} = \ln(1 + x^2 + y^2)$$

en el punto P donde la curva corta al eje de las abscisas ($y = 0$), con abscisa positiva ($x > 0$).

- 2. Sea $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos veces derivable con $g'(x) \neq 0$ en todo $\mathbb{R}$ y $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \cos(kg(x))$$

- (a) Muestre que f, f', f'', g, g', g'' satisfacen la relación

$$f'' - f' \frac{g''}{g'} + (kg')^2 f = 0$$

- (b) calcule $f^{(n)}(0)$ para $g(x) = x$.

- 1. Encuentre la recta tangente a la curva de ecuación

$$\ln\left(\frac{3}{4} + x^2 + y\right) = \operatorname{sen}(xy)$$

en el punto P donde la curva corta al eje de las abscisas ($y = 0$), con abscisa positiva ($x > 0$).

- 2. Calcule el límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x \cosh x} \right)$$

- 3. Sea f definida y continua sobre $[a, b]$ y derivable sobre $]a, b[$, con $0 < a < b$. Suponga que $f(a) = f(b) = 0$. Mostrar que existe $c \in]a, b[$ tal que $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$.

- Considere

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \ln(x)}{x-1} & x > 0 \text{ y } x \neq 1 \\ \alpha & x = 1 \end{cases}$$

1. Determine el valor de α para que f sea continua en $\mathbb{R}_+^*$.
2. Analice la existencia de $f'(x)$ para $x > 0$. En caso de existir, calcule f' .
3. Determine los puntos de continuidad de f' en $]0, \infty[$.
4. Asuma que $f^{(n)}$ existe para $n \geq 2$ y que es continua en 1. calcule una recurrencia para $f^{(n)}(1)$, utilizando la fórmula de Leibnitz para $(x-1)f(x)$.

5 Anexo: Aplicaciones Físicas

P1. La vuela y la manivela. Calcular $v(x)$, ω constante.

Figura 2: Notemos que $x = x(t)$, $\theta = \theta(t)$

Sol:

$$L^2 = (x + R(1 - \operatorname{sen} x))^2 + (R \cos \theta)^2 \quad \left| \frac{d}{dt} \right.$$

$$0 = 2(x + R(1 - \operatorname{sen} x))[v(x) + R \cos \theta \omega] + R^2 2 \cos \theta (-\operatorname{sen} \theta) \omega$$

finalmente

$$v(x) = \frac{R^2 \cos \theta \operatorname{sen} \theta \omega}{x - R(1 - \operatorname{sen} \theta)} - R \cos \theta \omega$$

P2. Problema de la escalera

Sol:

$$l^2 = x^2 + y^2 \quad \left| \frac{d}{dt} \right.$$

$$0 = 2xv_x + 2yv_y$$

$$v_x = -\frac{yv_y}{x}$$

P3. A que velocidad crece el área en penumbra

Sol:

Buscamos $\frac{dA}{dt}$ donde A corresponde al área en penumbra
 $\tan \theta = \frac{a}{y} \rightarrow \theta = \arctan(a/y)$

$$\begin{aligned} A &= \frac{\theta R^2}{2} \\ \frac{dA}{dt} &= \frac{dA}{d\theta} \frac{d\theta}{dy} \frac{dy}{dt} \\ \therefore \frac{dA}{dt} &= \frac{avR^2}{2(a^2 + (y_0 - v)^2)} \end{aligned}$$