CLASE AUXILIAR 1

2 de Agosto de 2006

Problema 1

1. Demuestre que la distribución de probabilidad exponencial tiene pérdida de memoria.

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

2. Demuestre que si
 $T_1 \rightarrow \text{exp}(\lambda)$
 $T_2 \rightarrow \text{exp}(\mu)$, se tiene que:

$$P(T_1 < T_2) = \frac{\lambda}{\mu + \lambda}$$

3. Sean $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ Variables aleatorias iid. Encuentre la distribución de probabilidad de la variable aleatoria:
 $X \rightarrow \min(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$
4. Encuentre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria que es la suma de 2 variables aleatorias que siguen distribuciones de Poisson independientes.

Problema 2

1. Usted se encuentra dando una prueba de su ramo preferido el cual está siendo cuidado por dos ayudantes. El primer ayudante dice la verdad $3/4$ de las veces. Por su parte el segundo de los ayudantes dice la verdad $4/5$ de las veces. La pregunta a una pregunta particular tiene 9 alternativas, y usted no sabe cuál es la respuesta correcta (pero los ayudantes sí la conocen). Por esto, usted ha decidido preguntarle a los 2 ayudantes su opinión respecto a la alternativa correcta.

Si ambos afirman que la alternativa correcta es la (d), ¿Cuál es la probabilidad que efectivamente esa sea la respuesta correcta a la pregunta (es decir, que ambos ayudantes estén diciendo la verdad)?.

Hint: La probabilidad a priori que cualquiera de las alternativas sea la correcta es $1/9$

Problema 3

Suponga que el dueño de un centro de dental quiere definir la política de citaciones de pacientes. Cada dentista puede atender 2 pacientes en el período en estudio. El primer paciente se cita al comienzo de la sesión ($t_1 = 0$) y el segundo se cita en el instante $t_2 = x$. Se ha observado que todos los pacientes son puntuales.

Los tiempos de cada atención son variables aleatorias iid con distribuciones Uniformes entre a y b [hrs]. Así, cuando el segundo paciente llega al centro dental existen dos posibilidades:

- El dentista está ocupado atendiendo al primer paciente. En este caso, el segundo cliente debe esperar hasta que termine la atención del primero para ser atendido.
- El dentista está ocioso, ya que terminó de atender al primer paciente. El segundo cliente se atiende de inmediato.

El dentista cobra $M[\$/hr]$ independientemente si está trabajando o no, por lo que a Ud. le interesa que este se desocupe en el menor tiempo posible de la atención de los 2 pacientes. Sin embargo, si un paciente llega y su dentista está ocupado el centro percibe un costo de $P[\$/hr]$ mientras éste espera.

Se quiere buscar cuál es el instante x óptimo para citar al 2° paciente si el tomador de decisiones es neutral al riesgo. Para ello conteste las siguientes preguntas.

- Si el segundo paciente es citado en el instante x y por lo tanto llega al sistema en el instante x (recuerde que es puntual), ¿Cuál es la probabilidad que encuentre al dentista ocupado atendiendo al primer paciente y por lo tanto tenga que esperar para recibir su atención?
- Si al llegar a la consulta, el segundo cliente encuentra al dentista ocupado, ¿Cuál es la esperanza del tiempo que tendrá que esperar hasta comenzar a ser atendido?. ¿Cuál es la esperanza si lo encuentra desocupado?. Entonces, si el segundo cliente llega a la consulta en el instante x , ¿Cuál es la esperanza del tiempo de espera ?.
- ¿Cuál es la esperanza del tiempo que el dentista estará en el centro dental?.
- Utilizando las partes anteriores, defina el problema de optimización que debe resolver el dueño de la consulta. Encuentre el momento óptimo para citar al segundo paciente.

Problema 4 (Ross 2.17)

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes continuas de densidad común f . Sea $X_{(i)}$ el i -ésimo menor valor entre $X_1, X_2, \dots, X_n$.

- Demuestre que la densidad de $X_{(i)}$ está dada por:

$$f_{X_{(i)}}(x) = \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} F(x)^{i-1} \bar{F}(x)^{n-i} f(x)$$

- $X_{(i)}$ será menor que x si, y sólo si, cuántas de las variables X son menores que x ?
- Use (2) para obtener una expresión para $P[X_{(i)} \leq x]$.
- Utilice (1) y (3) para establecer la siguiente identidad para $0 \leq y \leq 1$:

$$\sum_{k=i}^n \binom{n}{k} y^k (1-y)^{(n-k)} = \int_0^y \frac{n!}{(i-1)!(n-i)!} x^{i-1} (1-x)^{n-i} dx$$

Problema 5

- Pasajeros llegan a un estación de Metro según un proceso de Poisson de tasa λ [personas/hora]. El tiempo entre los arribos de los trenes es de t [horas] y su capacidad es tal que puede llevar a todos los pasajeros esperando. Si acaba de pasar un tren y la estación está vacía:
 - Calcule la esperanza de la suma de los tiempos de espera de los pasajeros que subirán al siguiente tren.
 - ¿Cómo cambia su respuesta de la parte anterior si los trenes llegan a la estación según un Proceso de Poisson de tasa μ [trenes/hora]?
- Clientes llegan a un banco como un proceso de Poisson de tasa λ [personas/hora]. Suponga que 2 clientes llegaron durante la primera hora.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hayan llegado en los primeros 20 minutos?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos haya llegado durante los primeros 20 minutos?

Problema 6

Partiendo en $t = 0$, los buses llegan a un paradero según un proceso de poisson de tasa λ . Por su parte, los pasajeros llegan a esperar al paradero según un proceso de poisson de tasa μ . Al llegar el bus, todos los pasajeros que se encuentren esperando se suben instantáneamente a él (i.e. capacidad del bus es infinita), y los pasajeros que llegan posteriormente a esperar se suben al siguiente bus.

- a) Encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros que entran al m -ésimo bus, dado que el tiempo entre las llegadas del bus $m - 1$ y del bus m -ésimo es t .
- b) Encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros que se suben al m -ésimo bus.
- c) Dado que un bus llega a las 10:30 AM y no llegan buses entre las 10:30 y las 11:00 AM, encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros que se suben al siguiente bus.
- d) Encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros esperando en algún momento cualquiera del tiempo, por ejemplo, 2 : 30 PM. Suponga que el proceso empezó *hace mucho* tiempo.
- e) Encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros que se suben al siguiente bus (que pasa después de las 2:30 PM).
- f) Dado que Ud. llega a esperar el bus a las 2:30 PM, encuentre la función de probabilidad del número de pasajeros que se suben al siguiente bus.