

Control 1, MA1001 Introducción al Cálculo
Departamento de Ingeniería Matemática, FCFM, U. de Chile
Semestre 2008/1 (29 de Abril)

Instrucciones: Este control tiene 3 partes con diferente puntaje (indicado en paréntesis). La nota N del control se calcula con la fórmula $N = P + 1$, donde P es el puntaje obtenido.

Parte a) (2 ptos.) Usando sólo los axiomas de cuerpo de los reales y los teoremas de unicidad de neutros e inversos, demuestre que si $a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ son tales que $a + b = 1$ entonces se cumple que:

El inverso multiplicativo de $(a \cdot b)$ es $(a^{-1} + b^{-1})$.

Solución

P.D.Q.: $(a \cdot b) \cdot (a^{-1} + b^{-1}) = 1$ 1 pto.

Esto último es cierto ya que:

$(a \cdot b) \cdot (a^{-1} + b^{-1})$	$= (a \cdot b) \cdot a^{-1} + (a \cdot b) \cdot b^{-1}$; Ax. Distributividad
	$= (b \cdot a) \cdot a^{-1} + (a \cdot b) \cdot b^{-1}$; Ax. Conmutatividad
	$= b \cdot (a \cdot a^{-1}) + a \cdot (b \cdot b^{-1})$; Ax. Asociatividad
	$= b \cdot 1 + a \cdot 1$; Ax. El. inverso
	$= b + a$; Ax. El. neutro
	$= a + b$; Ax. Conmutatividad
	$= 1$; Dato del problema

..... 1 pto.

Parte b) (1.5 ptos.) Usando las propiedades de orden de los reales, pruebe que si $0 < a < 1$ y $b > 1$ entonces

$$ab + 1 < a + b$$

Solución

P.D.Q: $ab + 1 < a + b$

En efecto, calculemos la diferencia entre las expresiones de la derecha y la izquierda de la proposición anterior. Se tiene que

$(a + b) - (ab + 1)$	$= a(1 - b) + (b - 1)$
	$= (1 - a)(b - 1)$

..... 0.5 ptos.

Como $a < 1$ y $b > 1$ se tiene que los factores $(1 - a)$ y $(b - 1)$ son estrictamente positivos. 0.5 ptos.

Como el producto de reales en \mathbb{R}_+^* es cerrado, se tiene que $(1 - a)(b - 1) > 0$. Con esto se concluye la demostración. 0.5 ptos.

Parte c) (2.5 ptos.) Resuelva la inecuación:

$$\frac{3 - 2x}{x^2 - |2x - 3|} \leq 0$$

Solución

El punto crítico de la expresión en módulo $2x - 3$ es $x = \frac{3}{2}$

0.4 ptos.

Parte 1: Si $x \in (-\infty, \frac{3}{2})$ la inecuación queda:

$$\frac{3 - 2x}{x^2 + 2x - 3} \leq 0.$$

.....

0.3 ptos.

Factorizando la expresión cuadrática $x^2 + 2x - 3 = (x + 1)^2 - 4 = (x - 1)(x + 3)$ se debe resolver la inecuación

$$\frac{3 - 2x}{(x - 1)(x + 3)} \leq 0.$$

.....

0.4 ptos.

Esta expresión factorizada tiene los puntos críticos $\frac{3}{2}, 1, -3$ Por lo tanto construimos la tabla de signos siguiente:

	$(-\infty, -3)$	$(-3, 1)$	$(1, \frac{3}{2})$
$3 - 2x$	> 0	> 0	> 0
$x - 1$	< 0	< 0	> 0
$x + 3$	< 0	> 0	> 0
$\frac{3 - 2x}{(x - 1)(x + 3)}$	> 0	< 0	> 0

Por lo tanto, la solución de la inecuación en este intervalo es $(-3, 1)$

0.4 ptos.

Parte 2: Si $x \in [\frac{3}{2}, +\infty)$ la inecuación queda:

$$\frac{3 - 2x}{x^2 - 2x + 3} \leq 0.$$

.....

0.3 ptos.

Como $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$ se tiene que esta expresión es siempre positiva. Por lo tanto la inecuación anterior es equivalente a

$$3 - 2x \leq 0.$$

La solución de esta última inecuación es todo el intervalo $[\frac{3}{2}, +\infty)$

0.4 ptos.

Juntando las soluciones de las dos partes se concluye que la solución total de la inecuación original es

$$(-3, 1) \cup [\frac{3}{2}, +\infty)$$

.....

0.3 ptos.