Clase Auxiliar FI2A1 Mecánica

Profesor: Luis Rodriguez

Auxiliares: Francisco Sepúlveda & Kim Hauser

7/Agosto/2008

P1. Se observa una partícula en movimiento desde un sistema de referencia inercial. La trayectoria está determinada por las siguientes ecuaciones (en coordenadas cilíndricas):

$$\rho = Ae^{k\theta}, z = h\rho$$

sabiendo que la rapidez de la partícula es conocida e igual a v_0 , determine:

- la velocidad $\vec{v}$ de la partícula
- la aceleración $\vec{a}$
- demuestre que $\vec{a} \perp \vec{v}$
- encuentre $\theta = \theta(t)$

P2. Una partícula se mueve a lo largo de una trayectoria espiral cilíndrica (ver figura) con una rapidez $v(t)$. La distancia desde cualquier punto de la trayectoria al eje de la espiral es R y el ángulo que forma el vector velocidad con el plano perpendicular al eje de la espiral α es constante. Determine en términos de R , $v(t)$ y α :

- las componentes de velocidad y aceleración en coordenadas cilíndricas.
- las componentes tangencial y normal de la aceleración.
- el radio de curvatura de la trayectoria.

P3. La aceleración de un bloque que se mueve a lo largo del eje x se expresa como:

$$\vec{a} = k\sqrt{x}\hat{x}$$

Donde k es una constante positiva. Tanto la rapidez v como el desplazamiento x son nulos para $t = 0$. Determine la aceleración, velocidad y posición del bloque en un instante t cualquiera.

P4. Considere una curva espiral descrita en coordenadas esféricas por las ecuaciones:

$$r = R, \phi = N\theta$$

donde R y N son constantes conocidas y positivas (N entero par). Una partícula se mueve sobre la espiral partiendo desde el extremo superior ($\theta = 0$) y manteniendo una velocidad zenital constante y conocida, $\dot{\theta} = \omega_0$. Se pide:

- Utilizando coordenadas esféricas, escriba los vectores velocidad y aceleración para una posición arbitraria de la partícula sobre la trayectoria.
- Determine el radio de curvatura de la trayectoria en el ecuador ($\theta = \pi/2$).
- Encuentre una expresión para la longitud total de la espiral y para el tiempo que la partícula tarda en recorrerla. **Indicación:** La integral resultante es difícil de calcular y la puede dejar expresada.