Profesor: Pablo Barceló
Auxiliares: Gonzalo Ríos, Juan Reutter
Fecha: 24 de Marzo

Auxiliar 2: Relaciones

1 Materia

1. Demostraciones

- (a) Una demostración directa de $p \rightarrow q$ se construye de la siguiente forma:
 - i. Asuma que p es verdadero.
 - ii. Deduzca otras proposiciones a partir de p utilizando las reglas de inferencias y los axiomas.
 - iii. Deténgase una vez que haya obtenido la proposición q .
- (b) Las demostraciones por contraposición están basadas en que para demostrar $p \rightarrow q$ basta demostrar $\sim q \rightarrow \sim p$
- (c) Una demostración por contradicción es:
 - i. Asuma que queremos demostrar p .
 - ii. encontrar una contradicción q tal que $\sim p \rightarrow q$ es cierto
 - iii. concluir que p es cierto
- (d) Bicondicionales
 - i. Para demostrar un teorema de la forma $p \leftrightarrow q$, basta
 - ii. Demostrar $p \rightarrow q$
 - iii. Demostrar $q \rightarrow p$
- (e) Demostraciones por casos
 - i. Queremos demostrar $p \rightarrow q$
 - ii. Sabemos que $p \leftrightarrow (p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n)$
 - iii. Basta demostrar que $(p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q$
 - iv. Basta demostrar que $(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow q)$
- (f) Demostraciones de existencia
 - i. Deseamos demostrar que $\exists x P(x)$
 - ii. Existen demostraciones constructivas de existencia. Lo que hacen es encontrar un elemento a tal que $P(a)$.
 - iii. Existen también demostraciones no-constructivas de existencia. Asuma que no existe elemento a tal que $P(a)$ y obtenga una contradicción.
- (g) Demostraciones de unicidad
 - i. Deseamos demostrar que $\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow x = y))$
 - ii. Tales resultados se prueban en dos partes
 - iii. Existencia: hay un elemento a tal que $P(a)$.
 - iv. Univocidad: si $b \neq a$, entonces $\sim P(b)$.

2. Relaciones

- (a) Sean A y B conjuntos. Una relación entre A y B es un subconjunto de $A \times B$, ie, $R \subseteq A \times B$
- (b) Si A es un conjunto, entonces una relación en A es una relación entre A y A , ie, $R \subseteq A \times A$
- (c) La cantidad de relaciones en un conjunto con n elementos es igual a la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n^2 elementos, ie, 2^{n^2}

3. Propiedades de las relaciones

Una relación R en un conjunto A es:

- (a) Refleja: $(a, a) \in R$, para todo $a \in A$

- (b) Simétrica: si $(a, b) \in R$, entonces $(b, a) \in R$
- (c) Antisimétrica: si $(a, b) \in R$ y $(b, a) \in R$, entonces $a = b$
- (d) Transitiva: si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$, entonces $(a, c) \in R$

4. Operaciones en relaciones

- (a) Unión: $R \cup R' = \{(a, b) | (a, b) \in R \vee (a, b) \in R'\}$
- (b) Intersección: $R \cap R' = \{(a, b) | (a, b) \in R \wedge (a, b) \in R'\}$
- (c) Diferencia: $R - R' = \{(a, b) | (a, b) \in R \wedge (a, b) \notin R'\}$
- (d) Composición: $R \circ R' = \{(a, c) | (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R'\}$
- (e) Si R relación en A , definimos $R^{n+1} = R^n \circ R$, donde $R^1 = R$, $n \geq 1$

5. Clausulas

La clausula transitiva R^* de R es la menor relación R' que contiene a R y tal que R' es transitiva. De forma análoga, se definen la clausula refleja y simétrica.

2 Ejercicios

1. La relación R en A es transitiva si y solo si $R^n \subseteq R$, para cualquier $n \geq 1$
2. R es simétrica si y solo si $R = R^{-1}$
3. Si R es simétrica, entonces R^n es simétrica para todo $n \geq 1$
4. Si A tiene n elementos, entonces $R^* = \bigcup_{1 \leq i \leq n} R^i$