

# INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NEWTONIANA

Nelson Zamorano H.

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Universidad de Chile

versión 20 de marzo de 2009

# Índice general

<b>I. COMPLEMENTO MATEMATICO</b>	<b>3</b>
I.1. INTRODUCCION . . . . .	3
I.2. TRIGONOMETRIA. . . . .	3
I.2.1. Unidades angulares: grados y radianes. . . . .	3
I.2.2. Angulo sólido. . . . .	5
I.2.3. Funciones seno y coseno: definición geométrica. . . . .	7
I.2.4. La Función tangente. . . . .	16
I.2.5. Teorema del seno . . . . .	18
I.2.6. Teorema del coseno. . . . .	18
I.3. SERIES . . . . .	19
I.3.1. Sucesiones . . . . .	19
I.3.2. Series . . . . .	20
I.4. LAS SERIES MAS USADAS. . . . .	32
I.4.1. El binomio y el número e. . . . .	32
I.4.2. Números complejos. . . . .	35
I.5. AREA ENCERRADA POR UNA CURVA . . . . .	38
I.5.1. Area encerrada por la curva $y = x^2$ . . . . .	38
I.5.2. Valor de la sumatoria $\sum_{n=1}^N n$ . . . . .	40
I.5.3. Valor de la sumatoria $\sum_{n=1}^N n^2$ . . . . .	42
I.5.4. Valor obtenido para el área bajo la curva $y = x^2$ . . . . .	45

---

I.5.5.	Método general para evaluar sumatorias del tipo $\sum_{n=1}^N n^k$ .	46
I.5.6.	Regla del trapecio.	47
I.6.	EJERCICIOS	49

# Índice de figuras

I.1.	En la Figura se muestra la medida de diversos ángulos como $180^\circ$ , $90^\circ$ , $45^\circ$ , y otros. Se define además, el sentido positivo y negativo de un ángulo. . . .	4
I.2.	Angulo sólido subtendido por una de las caras de un cubo con respecto al centro del mismo. La esfera tiene radio unitario. . . . .	6
I.3.	Al dibujar la esfera con centro en el punto de simetría de las caras, vemos que el ángulo sólido subtendido (área de la esfera) es la mitad de la superficie total de la esfera. . . . .	7
I.4.	El valor de $\text{sen } \alpha$ está dado por la proyección del vector $OA$ sobre el eje vertical y el valor del coseno es la proyección sobre el eje horizontal. El radio de la circunferencia es la unidad . . . . .	8
I.5.	De la Figura se desprende que $\text{sen}(180 - \alpha) = \text{sen } \alpha$ , y otras igualdades trigonométricas citadas anteriormente en el texto. . . . .	11
I.6.	Triángulo $\triangle ABC$ usado para encontrar geoméricamente el valor de $\text{sen}(\alpha + \beta)$ en función de senos y cosenos de los ángulos $\alpha$ y $\beta$ . . . . .	12
I.7.	A la izquierda se muestra el vector $e^{i\alpha}$ . En el disco de la derecha se grafica $e^{i(\alpha+\beta)}$ . El sumar un ángulo al vector anterior, sin cambiar su módulo, es equivalente a rotarlo en el ángulo $\beta$ . . . . .	14
I.8.	Resumen de las definiciones geométricas de las funciones: cotangente, cosecante y secante. La circunferencia tiene radio unitario. . . . .	17
I.9.	(The College Mathematics Journal, Vol. 62, # 5, Dec. 89.) . . . . .	21
I.10.	Comparación entre la función $1/(1 - x)$ (gráficada con +) y la aproximación polinomial, que incluye hasta potencias de orden 10 (línea continua). En la aproximación, se corta la serie infinita, manteniendo sólo los primeros términos. . . . .	25





# Capítulo I

## COMPLEMENTO MATEMATICO

### I.1. INTRODUCCION

La Geometría es una herramienta importante en la formulación y análisis de los problemas que interesa estudiar en Física, así como también lo es el cálculo. De hecho, esta herramienta matemática fue desarrollada por Newton (simultáneamente con Leibnitz) precisamente para poder formular sus leyes en forma precisa. Comenzaremos dando un breve repaso de Geometría y de los conceptos básicos de Trigonometría, posteriormente introduciremos nociones de cálculo haciendo énfasis en las aproximaciones y en el cálculo de áreas bajo una curva, que son los procedimientos más requeridos en Física.

### I.2. TRIGONOMETRIA.

#### I.2.1. Unidades angulares: grados y radianes.

Comenzamos con la definición de las unidades angulares más conocidas: grados ( $^{\circ}$ ), minutos ( $'$ ) y segundos ( $''$ ).

Estas unidades son *sexagesimales*; cada unidad contiene 60 subunidades, por ejemplo: 1 minuto contiene 60 segundos. El sistema establecido en las mediciones de longitud es *decimal*, 1 metro contiene 10 decímetros, un decímetro 10 centímetros,...

El sistema sexagesimal nació en Babilonia, donde se usó en las mediciones astronómicas que, en ese tiempo, consistían en determinar las posiciones de los planetas y estrellas más brillantes con el objeto de establecer un calendario y predecir eclipses, entre otros

finés.

Los grados, minutos, segundos están definidos a partir de una división en partes iguales, de la longitud de una circunferencia.

Las equivalencias son las siguientes:

- $360^\circ \equiv$  un giro completo alrededor de un circunferencia.
- $180^\circ \equiv$   $1/2$  vuelta alrededor de un circunferencia.
- $90^\circ \equiv$   $1/4$  de vuelta alrededor de un circunferencia.
- $45^\circ \equiv$   $1/8$  de vuelta alrededor de un circunferencia.
- $1^\circ \equiv$   $1/360$  de vuelta alrededor de un circunferencia.
- $1^\circ \equiv$   $60'$ , sesenta minutos.
- $1' \equiv$   $1/216,000$  de vuelta alrededor de una circunferencia.
- $1'' =$   $1/60$  de un minuto.
- $1'' \equiv$   $1/12,960,000$  de vuelta alrededor de una circunferencia.

En toda definición de unidades, existe un grado de arbitrariedad. En física, la usamos para redefinir esta unidad con una orientación geométrica, acorde con nuestros intereses.




Figura I.1: En la Figura se muestra la medida de diversos ángulos como  $180^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $45^\circ$ , y otros. Se define además, el sentido positivo y negativo de un ángulo.

El nombre de esta nueva unidad angular, que definimos a continuación, es **radián**.

### Definición de Radián

*La magnitud de un ángulo medido en **radianes** está dada por la longitud del arco de circunferencia que subtiende, dividida por el valor del radio de la circunferencia.*

Esta definición de **radián** es independiente del radio de la circunferencia. (Si divide una pizza en diez partes iguales, el ángulo central que subtiende cada pedazo es el mismo, cualquiera sea el tamaño de la pizza).

La longitud de la circunferencia de un círculo unitario es  $(2\pi \cdot 1)$ . De acuerdo a la definición anterior, el ángulo central que subtiende dicho arco es  $2\pi$  radianes.

Esta nueva definición tiene una gran ventaja: al multiplicar el ángulo central (medido en radianes) por el radio de la circunferencia, automáticamente se obtiene la longitud del arco subtendido por dicho ángulo.

$$\text{Longitud del arco de } \odot = [\text{Ángulo subtendido (en radianes)}] \times [\text{Radio de la } \odot].$$

Si medimos el ángulo subtendido en grados, no obtendremos una igualdad: el largo de una circunferencia es  $2\pi r$  y el ángulo central que subtiende toda la circunferencia es  $360^\circ$ . Este ejemplo define la nueva unidad angular que denominamos radián:


$$360^\circ = 2\pi = 6,28318\dots \quad \text{radianes.}$$

La equivalencia con los grados es:

$$1 \text{ radián} = \frac{360^\circ}{2\pi} = 57,29^\circ,$$

a partir de esta equivalencia podemos obtener las siguientes relaciones:

90° equivalen a  $(\pi/2)$  radianes,  
 45° equivalen a  $(\pi/4)$  radianes,  
 30° equivalen a  $(\pi/6)$  radianes,  
 60° equivalen a  $(\pi/3)$  radianes.




Esta unidad angular es la más **usada en física**.

## I.2.2. Ángulo sólido.

Podemos ahora definir un **ángulo sólido** como una extensión natural de la definición anterior. Si allí usamos una circunferencia, ahora recurrimos a una esfera. Para obtener

directamente el valor del ángulo sólido, usamos una **esfera de radio unitario**.

Si sombreamos un disco en la superficie de la esfera de la Figura y dibujamos, desde el centro de la esfera el cono que subtiende a dicho disco, la apertura del vértice de este cono se denomina **ANGULO SOLIDO**. Este ángulo sólido se mide entonces por el **área** recortada sobre la esfera de radio unitario, por el cono con vértice en su centro.



Como la superficie de una esfera es  $4\pi r^2$ , el máximo valor que puede tomar un ángulo sólido en la esfera de radio unitario es  $4\pi$




Figura I.2: Ángulo sólido subtendido por una de las caras de un cubo con respecto al centro del mismo. La esfera tiene radio unitario.

### Ejemplo

Calcular el ángulo **sólido** que subtiende **una** de las caras de un cubo mirado desde el centro del cubo.

Si dibujamos una esfera de radio unitario cuyo centro coincida con el centro del cubo podemos deducir inmediatamente el valor del ángulo sólido.

El razonamiento es el siguiente: La esfera completa y centrada subtiende las seis caras del cubo y por lo tanto le corresponde un ángulo sólido de  $4\pi$ .

A la fracción de la superficie de la esfera que subtiende una cara del cubo, le corresponde un ángulo sólido de  $\frac{4\pi}{6} = 2\pi/3$ . En otras palabras, los rayos de luz que nacen en el centro de la esfera y que atraviesan la cara del cubo, proyectan sobre la esfera una superficie igual a  $\frac{4\pi}{6}$ .

### NOTA

Al definir el ángulo sólido subtendido por una superficie, **SIEMPRE** debemos especificar la posición del centro de la esfera con respecto a la cual se midió.

### Ejemplo

Calcular el ángulo sólido que subtiende un cubo, medido desde un punto ubicado justo en el centro de una de sus caras (ver Figura [I.3]).

(Respuesta:  $2\pi$ ).




Figura I.3: Al dibujar la esfera con centro en el punto de simetría de las caras, vemos que el ángulo sólido subtendido (área de la esfera) es la mitad de la superficie total de la esfera.

### I.2.3. Funciones seno y coseno: definición geométrica.

El  $\triangle OBA$  es un triángulo **rectángulo**. En él definiremos las funciones seno y coseno.




Figura I.4: El valor de  $\text{sen } \alpha$  está dado por la proyección del vector  $OA$  sobre el eje vertical y el valor del coseno es la proyección sobre el eje horizontal. El radio de la circunferencia es la unidad

### Seno y Coseno de un ángulo

En un triángulo rectángulo  $\text{sen } \alpha$  es la razón entre el **cateto opuesto** al ángulo  $\alpha$  y la hipotenusa.

**Coseno** de  $\alpha$ , ( $\text{cos } \alpha$ ) es la razón entre el **cateto adyacente** al ángulo y la hipotenusa del triángulo rectángulo en la figura I.4.

Al igual que los casos anteriores es conveniente referir las medidas a una circunferencia de radio unitario. Como en este caso la hipotenusa es la unidad, el valor del coseno está dado directamente por la magnitud del cateto adyacente al ángulo y el seno por la magnitud del cateto opuesto. Las propiedades encontradas para este triángulo serán válidas también para la familia de triángulos semejantes a él.

### Definición

$$\begin{aligned} \text{sen } \alpha &\equiv \frac{|AB|}{|OA|} = |AB|, & |OA| &= 1, \\ \text{cos } \alpha &\equiv \frac{|OB|}{|OA|} = |OB|, & |OA| &= 1. \end{aligned} \tag{I.1}$$

A continuación se incluyen algunos valores de estas funciones que debemos *recordar*:

$$\begin{array}{ll}
 \operatorname{sen} 0^\circ = 0, & \cos 0^\circ = 1, \\
 \operatorname{sen} 90^\circ = 1, & \cos 90^\circ = 0, \\
 \operatorname{sen} 45^\circ = 1/\sqrt{2}, & \cos 45^\circ = 1/\sqrt{2}, \\
 \operatorname{sen} 30^\circ = 1/2, & \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2, \\
 \operatorname{sen} 60^\circ = \sqrt{3}/2, & \cos 60^\circ = 1/2,
 \end{array}$$

### Propiedades de estas funciones

1.- Como en un triángulo rectángulo se cumple que  $a^2 + b^2 = c^2$ , y en el triángulo de la Figura I.4,  $a = \operatorname{sen} \alpha$ ,  $b = \cos \alpha$  y  $c = 1$ , entonces

$$(\operatorname{sen} \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1 \quad (\text{I.2})$$

para cualquier ángulo  $\alpha$ .

(Por convención  $(\operatorname{sen} \alpha)^2 \equiv \operatorname{sen}^2 \alpha$ .)

Esta igualdad se puede comprobar con la lista de valores para el seno y el coseno que se incluyó más arriba.

2.- De la circunferencia de radio unitario se obtiene que,

$$\operatorname{sen} \alpha = |AB| \equiv |OC| \quad (\text{puesto que } CA \parallel OB),$$

$$\text{al mismo tiempo, } |OC| = \frac{|OC|}{|OA|} \equiv \cos(90 - \alpha),$$

de acuerdo a la definición de coseno. De aquí tenemos:

$$\cos(90 - \alpha) = \operatorname{sen} \alpha. \quad (\text{I.3})$$

Esta igualdad se puede verificar con los valores que aparecen en la lista de funciones seno y coseno incluídas anteriormente.

3.- Otra propiedad que escribimos a continuación, sin acompañar una demostración es

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha. \quad (\text{I.4})$$

### Ejercicio

Usando la misma figura demuestre:

$$\operatorname{sen}(90 - \alpha) = \cos \alpha, \quad \operatorname{sen}(180^\circ) = 0, \quad \cos(180^\circ) = -1,$$

$$\operatorname{sen}(270^\circ) = -1, \quad \cos(-30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{sen}(-30^\circ) = -1/2.$$

### Definición

La rotación de los punteros del reloj se define como SENTIDO NEGATIVO. Obviamente el SENTIDO POSITIVO es el opuesto y se indica en la Figura.



### Ejemplo

Desde un punto P de un lado de un triángulo equilátero de lado  $a$ , se trazan dos perpendiculares a los lados. Los valores  $m$  y  $n$  son datos (valores conocidos). Encontrar el valor del área del triángulo en función de  $m$  y  $n$ . (Ver Figura).

### Solución:


Defino  $x = AP$ ,  $y = PB$  con  $x + y = a$ .

$$x \cos 60^\circ = m$$

$$y \cos 60^\circ = n$$

$$m/x = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$n/y = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$



De las igualdades anteriores tenemos:  $x = 2m$ ,  $y = 2n$ , de modo que  $a = 2(m + n)$ .

El área de un triángulo es  $1/2 \times \text{base} \times \text{altura} = 1/2 \times a \times h = 1/2 \times a \times a\sqrt{3}/2$ , porque  $h = a \times \cos 30^\circ = a\sqrt{3}/2$ .

De esta forma, el área resulta ser

$$\text{Área} = \sqrt{3}(m+n)^2.$$

Se puede obtener  $x$  e  $y$  en función de  $m$  y  $n$  usando semejanza entre los triángulos con vértice en  $P$  y la altura del triángulo original trazada desde  $C$ . (Ejercicio).

### Suma y Resta de Funciones Trigonómicas

Repasemos algunas igualdades,

$\text{sen}(180 - \alpha) = \text{sen } \alpha$  (como se puede demostrar a partir de la figura).

$\text{cos}(180 - \alpha) = -\text{cos } \alpha$ .




Figura I.5: De la Figura se desprende que  $\text{sen}(180 - \alpha) = \text{sen } \alpha$ , y otras igualdades trigonométricas citadas anteriormente en el texto.

Del triángulo de la Figura I.6, después de un cálculo tedioso, se obtiene la igualdad siguiente:

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen } \alpha \cos \beta + \cos \alpha \text{sen } \beta. \quad (\text{I.5})$$

Usando el  $\triangle ABC$  de la Figura I.6, y comenzando por el segundo miembro de la igualdad anterior, podemos demostrar esta identidad trigonométrica.




Figura I.6: Triángulo  $\triangle ABC$  usado para encontrar geoméricamente el valor de  $\text{sen}(\alpha + \beta)$  en función de senos y cosenos de los ángulos  $\alpha$  y  $\beta$ .

$$\cos \alpha \text{sen} \beta + \cos \beta \text{sen} \alpha = \frac{1}{|AC| \bullet |BC|} [|AD| \bullet |CD| + |BD| \bullet |CD|]$$

pero, los dos productos que aparecen entre corchetes son formas equivalentes de calcular el área de este triángulo:

$$|AD| \cdot |CD| = 2 \times \text{área del } \triangle ADC,$$

$$|BD| \cdot |CD| = 2 \times \text{área del } \triangle BCD$$

Reemplazando este resultado en la expresión original

$$\cos \alpha \text{sen} \beta + \cos \beta \text{sen} \alpha = 2 \times (\text{área del } \triangle ABC) / [|AC| \bullet |BC|],$$

ahora recordando que el área del triángulo se puede escribir como

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} |AE| \bullet |BC|, \text{ obtenemos} \\ & = 2 \frac{1}{2} |AE| \bullet |BC| / |AC| \bullet |BC| = AE / AC \equiv \text{sen}(\alpha + \beta). \end{aligned}$$

Esta demostración constituye un buen ejercicio para practicar las definiciones de seno y coseno. El resultado obtenido es muy importante y será usado con bastante frecuencia a continuación.

Otra igualdad trigonométrica tan usada como la anterior es

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta. \quad (\text{I.6})$$

No intentaremos demostrar esta expresión usando geometría. Recurriremos esta vez a la definición  $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha$ , dada anteriormente. Es, sin duda, más abstracta pero mucho más elegante y útil; *todas las igualdades trigonométricas se pueden obtener manipulando esta expresión*. Su desventaja es sin duda, la poca familiaridad que, a este nivel de conocimientos, se tiene con ella.

### Ejercicio

Encontrar el valor de  $e^{i(\alpha+\beta)}$  y demostrar que contiene las igualdades descritas anteriormente

### Indicación

Primero, recordemos cómo se multiplican números complejos.

$$Z_1 = a + ib,$$

$$Z_2 = x + iy, \quad i^2 = -1$$

$$Z_1 \bullet Z_2 \equiv (a + ib) \bullet (x + iy) = (ax - by) + i(bx + ay)$$

Se multiplican como un par de binomios, separando la parte real de la imaginaria (aquella que contiene "i" como factor común).

Con los números reales sabemos que se cumple la siguiente igualdad

$$a^x \bullet a^y = a^{(x+y)}. \quad (\text{I.7})$$

Con los números complejos y en especial con  $e^{i\alpha}$  se opera de la misma forma.

$$e^{i\alpha} \bullet e^{i\beta} = e^{i\alpha+i\beta} = e^{i(\alpha+\beta)} \quad (\text{I.8})$$

En seguida, se debe reemplazar en la izquierda y derecha de la última expresión sus respectivas definiciones  $e^{i\alpha} = \cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha$ ,

$$e^{i\alpha+i\beta} \equiv \cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta),$$

$$e^{i(\alpha+\beta)} \equiv e^{i\alpha} \bullet e^{i\beta} = (\cos \alpha + i \operatorname{sen} \alpha) \bullet (\cos \beta + i \operatorname{sen} \beta),$$

efectuando el producto indicado en la última igualdad, siempre respetando las reglas de multiplicación de números complejos, se obtiene

$$\begin{aligned} \cos(\alpha + \beta) + i \operatorname{sen}(\alpha + \beta) &= \\ &= (\cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta) + i (\operatorname{sen} \alpha \cos \beta + \cos \alpha \operatorname{sen} \beta), \end{aligned}$$

igualando la parte real del lado izquierdo de la ecuación con la parte real de la derecha de la ecuación, obtenemos una de las identidades buscadas. La misma operación se repite para la parte imaginaria y aparece otro de los resultados obtenidos anteriormente en forma geométrica.  $\square$




Figura I.7: A la izquierda se muestra el vector  $e^{i\alpha}$ . En el disco de la derecha se grafica  $e^{i(\alpha+\beta)}$ . El sumar un ángulo al vector anterior, sin cambiar su módulo, es equivalente a rotarlo en el ángulo  $\beta$

## Ejercicio

Demostrar que

$$e^{i\alpha} \bullet e^{-i\alpha} = e^{i\alpha-i\alpha} = e^0 = 1$$

$$\Rightarrow \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

**Nota:** Use la definición de  $e^{i\alpha}$  y la siguiente propiedad de las funciones trigonométricas:  $\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha)$  y  $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ . Esta propiedad es válida para todo ángulo  $\alpha$ .  $\square$

Es importante recordar que en la definición de las series

$$\operatorname{sen} \alpha = \alpha - \frac{\alpha^3}{3!} + \frac{\alpha^5}{5!} - \frac{\alpha^7}{7!} \pm \dots$$

$$\operatorname{cos} \alpha = 1 - \frac{\alpha^2}{2!} + \frac{\alpha^4}{4!} - \frac{\alpha^6}{6!} \pm \dots$$

el ángulo, **siempre debe ser expresado en radianes.**

Estas series tienen las mismas propiedades deducidas anteriormente en forma geométrica. Por ejemplo, si desarrollamos la serie del seno y coseno conservando sólo potencias menores que  $\alpha^6$ , podemos comprobar que se cumple la igualdad  $\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$ . Veamos

$$(\operatorname{sen} \alpha)^2 = \alpha^2 - 2\frac{\alpha^4}{3!} + O(\alpha^6),$$

$$(\operatorname{cos} \alpha)^2 = 1 - \alpha^2 + \frac{\alpha^4}{2!2!} + 2\frac{\alpha^4}{4!} + O(\alpha^6),$$

$$(\operatorname{cos} \alpha)^2 = 1 - \alpha^2 + \frac{\alpha^4}{3},$$

$$\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1 + 0 + O(\alpha^6).$$

Note que en la serie resultante, cada una de las potencias de  $\alpha$  debe anularse en forma independiente, porque la igualdad anterior es válida para todo valor del ángulo  $\alpha$ .

El símbolo  $O(\alpha^6)$  indica que hemos ignorado las potencias iguales o superiores a  $\alpha^6$ .

### Ejercicio


Demostrar que los términos que contienen las potencias de  $\alpha^6$ , también se anulan en la expresión de  $\operatorname{sen}^2 \alpha + \operatorname{cos}^2 \alpha = 1$ .

### I.2.4. La Función tangente.

La **tangente** de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto al ángulo y el adyacente en un triángulo rectángulo.

$$\tan \alpha = \frac{AC}{OA} = \frac{BD}{OB} = \frac{\text{sen} \alpha}{\cos \alpha} \quad (\text{I.9})$$

La función tangente, a diferencia de las funciones seno y coseno, puede tomar cualquier valor entre  $+\infty$  y  $-\infty$ .



Algunos valores que aparecen frecuentemente se tabulan a continuación:

$$\begin{aligned} \tan(\pi/2) &= +\infty, \\ \tan 0 &= 0, \\ \tan(-\pi/2) &= -\infty, \\ \tan(\pi/4) = \tan 45^\circ &= 1, \\ \tan(\pi/3) = \tan 60^\circ &= \sqrt{3}, \\ \tan(\pi/6) = \tan 30^\circ &= 1/\sqrt{3}, \\ \tan(-\pi/3) = \tan -60^\circ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

#### Ejercicio

Demostrar que

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta}. \quad \square$$

Al conjunto de las funciones trigonométricas ya definidas le podemos sumar el inverso multiplicativo de cada una de ellas. Esto es análogo al caso de los números reales: por cada número real (o complejo) distinto de cero, existe un inverso ( $x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ )

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} \cdot x.$$

$$\cotan \alpha \cdot \tan \alpha = 1, \quad \cotan \alpha \equiv \text{cotangente de } \alpha = \frac{OA}{AC} = \frac{1}{BD} \quad (\text{I.10})$$

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} \alpha \bullet \operatorname{cosec} \alpha &= 1, & \operatorname{cosec} \alpha &= \frac{AC}{CB}, \\
 \cos \alpha \bullet \operatorname{sec} \alpha &= 1, & \operatorname{sec} \alpha &= \frac{AC}{AB}, \\
 \operatorname{cosec} \alpha &\equiv \text{cosecante de } \alpha, \\
 \operatorname{sec} \alpha &\equiv \text{secante de } \alpha.
 \end{aligned}
 \tag{I.11}$$




Figura I.8: Resumen de las definiciones geométricas de las funciones: cotangente, cosecante y secante. La circunferencia tiene radio unitario.

### IMPORTANTE

Las siguientes *aproximaciones* son usadas con mucha frecuencia en física.

Si  $\alpha$  es muy pequeño ( $\alpha \ll 1$ ), se cumple que:

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sen} \alpha &\simeq \alpha + O(\alpha^3) \\
 \cos \alpha &\simeq 1 - \frac{\alpha^2}{2} + O(\alpha^4) \\
 \tan \alpha = \operatorname{sen} \alpha / \cos \alpha &\simeq \alpha / (1 - \alpha^2) \simeq \alpha(1 + \alpha^2) \\
 &\simeq \alpha + O(\alpha^3)
 \end{aligned}
 \tag{I.12}$$

entonces, a primer orden en  $\alpha$ , (es decir: despreciando todas las potencias de  $\alpha$  superiores a 1), se cumple:

$$\tan \alpha \simeq \operatorname{sen} \alpha \simeq \alpha. \quad \square
 \tag{I.13}$$

El ángulo  $\alpha$  debe ser medido en radianes para que estas aproximaciones sean válidas.

### Ejercicio

Usando estos resultados, desarrolle  $\tan \alpha$  en serie de potencias en  $\alpha$ . Encuentre sólo los dos primeros términos de este desarrollo.

Respuesta:  $\tan \alpha \simeq \alpha + \alpha^3/3$ .

### I.2.5. Teorema del seno


Usando sólo geometría podemos encontrar una relación entre el seno de un ángulo interior de un triángulo y la longitud del lado que lo enfrenta. Esta relación es el teorema del seno.

$$h_1 = b \operatorname{sen} \alpha \quad h_1 = a \operatorname{sen} \beta$$

$$\Rightarrow \frac{a}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen} \beta}$$

$$h_2 = c \operatorname{sen} \beta \quad h_2 = b \operatorname{sen} \gamma$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\operatorname{sen} \beta} = \frac{c}{\operatorname{sen} \gamma}$$



De aquí se obtiene el teorema del seno:

$$\frac{a}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen} \beta} = \frac{c}{\operatorname{sen} \gamma}. \quad (\text{I.14})$$

### I.2.6. Teorema del coseno.

Usando el Teorema de Pitágoras en la misma Figura anterior, se deduce que:

$$h_2^2 = b^2 - x^2, \quad h_2^2 = c^2 - y^2,$$

$$b^2 - x^2 = c^2 - y^2, \quad y = a - x,$$

expresando y en función de x:  $b^2 = c^2 - a^2 + 2ax$ ,

pero:  $x = b \cos \gamma$ ,

introduciendo este término en la última igualdad, obtenemos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma. \quad (\text{I.15})$$

### Ejercicio

Demostrar que

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha,$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \quad (\text{I.16})$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

### Ejercicio

Descubra una regla nemotécnica que le permita recordar las fórmulas anteriores.

## I.3. SERIES

Suponemos conocidos los elementos básicos de Matemática y Geometría. En esta sección estudiaremos algunas series que usaremos más adelante y que probablemente no es una materia conocida para algunos de los alumnos.

### I.3.1. Sucesiones

(Ref.: Cálculo Infinitesimal y Geometría Analítica, G. Thomas, Cap. XVI).

Una *sucesión* es un conjunto de símbolos

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, \dots, a_n, \dots$$

que están en correspondencia biunívoca (es decir  $1 \leftrightarrow 1$ ) con la sucesión ordenada de los números naturales. Los símbolos  $a_1, a_2, \dots$  se denominan términos de la sucesión, de forma que el término *enésimo* es  $a_n$ , y se designa con la notación  $\{a_n\}$ .

### Ejemplo

El término genérico  $\{\frac{1}{n}\}$ , designa la sucesión

$$1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots \{1/n\} \dots$$

El término genérico  $\{\frac{1}{2^{n-1}}\}$ , designa la sucesión

$$1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots \{1/2^{n-1}\}, \dots \square$$

¿Qué sucede si  $n$  crece indefinidamente? ¿Cuál es el valor de  $a_n$  en dicho caso?

En este caso, si es posible asociar a la sucesión  $\{a_n\}$  un número  $L$ , tal que la diferencia  $|L - a_n|$  sea tan pequeña como se quiera, para todos los valores de  $n$  suficientemente grande, diremos que el *límite* de la sucesión  $\{a_n\}$  es  $L$ , y lo escribiremos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L. \quad (\text{I.17})$$

Mediante la frase:  $|L - a_n|$  es arbitrariamente pequeño para valores grandes de  $n$ , queremos decir que para cualquier número positivo  $\epsilon$ , corresponde un subíndice  $N$  tal que:

$$|L - a_n| < \epsilon, \quad \text{para todo } n > N. \quad (\text{I.18})$$

O sea, todos los términos que siguen al  $N$ -ésimo, están comprendidos entre  $(L - \epsilon)$  y  $(L + \epsilon)$ .

Si tal límite no existe, entonces diremos que la sucesión es *divergente*.

## I.3.2. Series

**Ejemplos:**

$$\sum_{n=1}^3 (2^n) \equiv 2^1 + 2^2 + 2^3 = 14,$$

$$\sum_{n=1}^3 (1) \equiv 1 + 1 + 1 = 3,$$

$$\sum_{k=1}^n (a^k) \equiv a^1 + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1} + a^n,$$

$$\sum_{k=4}^6 (a^k) \equiv a^4 + a^5 + a^6, \quad \text{donde } a \text{ es un número arbitrario.}$$

**Definición:**

El símbolo griego  $\sigma$  indica que el sumando  $[a^k]$  en el último ejemplo] toma cada uno de los valores que debe recorrer  $k$  partiendo desde el límite inferior hasta llegar al límite superior a través de los enteros. Como se indica, el sumando se suma tantas veces como el número de enteros que recorra  $k$ .

El límite superior en los dos primeros ejemplos es 3 y en el tercero no se deja explícito,  $n$  puede tomar cualquier valor entero.  $k$  lleva la contabilidad de los términos incluidos en la suma y el valor más alto que toma es  $n$  (va desde  $k = 1$  hasta  $k = n$ , con  $n$  un número entero).

Es fácil demostrar la siguiente propiedad de las sumatorias:

$$\sum_{k=1}^{k=n} C a_k = C \sum_{k=1}^{k=n} a_k, \tag{I.19}$$

donde  $C$  es una constante que no depende de  $k$ . En palabras, cada vez que tenemos un factor que se repite en cada uno de los términos de la sumatoria, lo podemos sacar como factor común en frente de la sumatoria.

Para demostrarlo debemos usar la siguiente propiedad de los números:  $C a_1 + C a_2 + C a_3 = C \{a_1 + a_2 + a_3\}$ . Esta es la sumatoria anterior con  $k = 3$ .




Figura I.9: (The College Mathematics Journal, Vol. 62, # 5, Dec. 89.)

Demuestre la siguiente igualdad entre sumatorias:

$$\left( \sum_{i=1}^{i=n} i \right)^2 = \sum_{i=1}^{i=n} (i)^3.$$

### Solución

A continuación se incluye una demostración ingeniosa que hace uso del método gráfico para demostrar la igualdad.

Se escribe el mismo arreglo de números uno al lado de otro, como se indica en la Figura anterior. (No es natural, por supuesto, que a uno se le ocurra espontáneamente este tipo de demostración, es necesario mucho trabajo y un poco de ingenio).

La idea consiste en sumar los números de los arreglos agrupados en forma diferente, de manera que reflejen a cada una de las sumatorias propuestas. Como los números en ambos arreglos son iguales, el valor de la suma debe ser el mismo; de esta forma demostramos la igualdad entre ambas sumas.

En esta Figuras se suman, en ambos casos, los números de acuerdo a la caja que los contiene (rectangular o formando un ángulo recto). El valor de la suma de cada una de las cajas se indica al pie de la misma Figura.

En el caso del arreglo ubicado a mano izquierda, se ha sacado –usando la regla de factorización recién descrita– un factor común en cada una de las sumatorias individuales, que corresponde al número 2, 3, 4... $n$ , de acuerdo a la posición del rectángulo horizontal. En seguida uno puede darse cuenta que es posible sacar la sumatoria de  $i$  como factor común:

$$\left( \sum_{i=1}^{i=n} i \right) + 2 \left( \sum_{i=1}^{i=n} i \right) + 3 \left( \sum_{i=1}^{i=n} i \right) + \dots + n \left( \sum_{i=1}^{i=n} i \right) = \left\{ \sum_{i=1}^{i=n} (i) \right\} [1 + 2 + 3 + \dots + n] = \left[ \sum_{i=1}^{i=n} i \right]^2$$

Dejamos como ejercicio comprobar que los términos al pie de la Figura de la derecha corresponden, efectivamente, a la suma de los números encerrados dentro de cada uno de los cajas en forma de ángulo recto.

El mismo resultado puede ser obtenido usando geometría. Para ello debemos pensar que  $\left[ \sum_{i=1}^{i=n} i \right]^2$ , corresponde al *área de un terreno cuadrado* que tiene  $\sum_{i=1}^{i=n} i$  metros (por dar una unidad de longitud) por lado. A continuación se dibuja el terreno a escala (la longitud 5, por ejemplo, tiene cinco unidades de largo) y se calcula el área en forma diferente. El número indicado dentro del cuadrado (o rectángulo), corresponde al valor del área de

dicha figura; pero en lugar de sumar las áreas en forma arbitraria, las sumamos añadiendo franjas en forma de ángulo recto, es decir aquellas encerradas entre dos líneas continuas sucesivas que tienen la forma señalada. Nuevamente, con este método se verifica la igualdad propuesta.  $\square$

1	2	3	4	5
2	4	6	8	10
3	6	9	12	15
4	8	12	16	20
5	10	15	20	25

Las series descritas anteriormente son finitas, pero el límite superior puede ser un número tan grande como uno quiera. En este caso el valor de la serie (es decir, el valor que toma la suma de todos los términos) debe ser un número **finito** para que sea de alguna utilidad.

En muchos de los casos de interés en física la serie (o la suma) no termina nunca, es decir el límite superior es infinito ( $\infty$ ). En este caso, si la serie está bien definida (es decir, su suma es finita), ocurre que al escribirla explícitamente, cada uno de los términos que van agregándose – a partir de un cierto valor de  $k$  –, van tomando rápidamente valores (absolutos) más y más pequeños de manera que la serie tiende a un límite finito. Es decir, se acerca tanto como uno quiera (dependiendo del número de términos que se sumen) a un cierto valor finito, que se denomina el límite de la serie.

Hagamos contacto con nuestra definición de sucesión, para definir formalmente las series.

Si  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$  es una *sucesión* cualquiera de números o funciones, entonces mediante el símbolo

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

representaremos una sucesión deducida a partir de la primera y que llamaremos *serie*. (Sólo se diferencia de la definición utilizada en los primeros ejemplos en el número de elementos de la suma. Era finito en el primer caso y ahora es más general, puede ser infinito.)

Definimos  $S_n$  como la sucesión de sumas parciales de la serie como sigue

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n. \end{aligned}$$

El término  $n$ -ésimo de la sucesión  $S_n$  es la suma de los  $n$  primeros términos de la serie  $\{a_n\}$ .

Si esta sucesión posee un límite cuando  $n$  crece indefinidamente –de acuerdo a la definición dada anteriormente [I.17]–, entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S, \quad (\text{I.20})$$

$S$  es el valor de la secuencia  $S_n$  cuando  $n \rightarrow \infty$ . También podemos decir que la serie  $\{S_n\}$  converge a  $S$ .

Si por el contrario la serie  $\{S_n\}$  diverge, es decir, cada uno de las sumas parciales aumenta su valor continuamente a medida que  $n$  crece, entonces definimos la serie  $\{S_n\}$  como una serie divergente.

En física, a este nivel, sólo nos interesan las series convergentes, puesto que son las únicas a las cuales les podemos asignar un significado concreto (un número).

A continuación estudiaremos algunos ejemplos de series, tanto finitas como infinitas.

El concepto de serie infinita con su respectivo límite asociado, no es trivial y requiere bastante maduración para lograr entender su significado. Hemos querido introducirla al comienzo del curso y trabajar con algunas de ellas, porque más tarde las necesitaremos. Proporcionan, además, una posibilidad de utilizar el computador para convencerse de algunos resultados cuyas demostraciones analíticas van más allá de este curso.

A continuación estudiaremos una de las series más usadas en física. Su interés radica en su uso en las aproximaciones en la forma que indicaremos aquí.

La serie es

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots \quad (\text{I.21})$$

Esta serie está definida si la suma correspondiente tiene un valor finito. En este caso, si  $|x| < 1$ .  $|x|$  indica el valor absoluto de  $x$ .




Figura I.10: Comparación entre la función  $1/(1-x)$  (gráficada con +) y la aproximación polinomial, que incluye hasta potencias de orden 10 (línea continua). En la aproximación, se corta la serie infinita, manteniendo sólo los primeros términos.

### Nota

Rigurosamente se debe escribir:

$$S_n \equiv \sum_{k=0}^{k=n} x^k \equiv \sum_{k=0}^n x^k$$

$$S_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=0}^n x^k)$$

$S_n$  constituye una *sucesión* de números identificadas con  $n$ . El límite de esta sucesión para  $n \rightarrow \infty$  (es decir para un  $n$  mayor que cualquier  $n$  que Ud. se pueda imaginar) se obtiene al verificar que a medida que  $n$  aumenta la suma se aproxima a un valor fijo que no depende de  $n$ . Este es el valor de  $S_\infty$ . Debe ser un valor finito, de otra manera, como ya se señaló, el resultado no tiene ningún significado matemático. Verifiquemos que para  $|x| < 1$ , la serie anterior, con todos sus términos incluidos, se puede escribir en forma analítica:

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = 1/(1-x). \quad (\text{I.22})$$

Hay muchas formas de obtener esta identidad. Podemos comprobar este resultado



un cuadrado de lado unitario y dividir uno de los lados de tal forma que uno de los segmentos tenga una longitud  $r$ .

Si  $r$  es muy pequeño con respecto a 1, es decir  $r \ll 1$  entonces

$$\frac{1}{1-r} \simeq (1+r), \quad (\text{I.23})$$

porque al multiplicar un número pequeño por sí mismo, se hace aún más pequeño. Comprobemos esto numéricamente: si  $r = 10^{-3} = ,001$ , entonces  $r^2 = 10^{-3} \times 10^{-3} = 10^{-6} = ,000001$  y podemos ver que es realmente despreciable con respecto al primer término.

Esta última es una de las aproximaciones más frecuentes en el desarrollo de los problemas físicos.

### Ejemplo

Dado un número real, arbitrario  $q$ , y un número entero  $N$ , se pide encontrar el valor de la siguiente suma:

$$S = \sum_{n=0}^N q^n = q^0 + q^1 + q^2 + \dots + q^N$$

A partir de la expresión encontrada aquí recuperar el resultado obtenido para la serie anterior.

Podemos encontrar el valor de  $S$  multiplicando ambos lados de la sumatoria por  $q$ ,

$$q \bullet S = S + q^{N+1} - 1,$$

despejando  $S$  de esta ecuación, tenemos

$$S = (1 - q^{N+1}) / (1 - q) = 1 + q^1 + q^2 + \dots + q^N. \quad (\text{I.24})$$

Hemos encontrado el valor de  $S$  sin necesidad de sumar cada uno de los términos de la serie. Este resultado es válido para todos los valores de  $q \neq 1$ . Supongamos que  $|q| < 1$  y hagamos crecer el valor de  $N$  indefinidamente, es decir, tomemos el valor límite de  $N \rightarrow \infty$ . En otras palabras, damos a  $N$  un valor muy grande, mayor que cualquier otro que uno pueda imaginar. En este caso

$$\lim_{N \rightarrow \infty} q^{N+1} = 0.$$

Este resultado se puede aceptar si uno medita acerca de lo que sucede si tomamos indefinidamente el producto de un número, menor que la unidad por sí mismo. Por ejemplo, no importa lo pequeño que sea el número (positivo) que Ud. pueda imaginar (llamémosle  $\epsilon$ , para ser específico), uno siempre puede encontrar un valor de  $N$  suficientemente grande, que haga  $q^{N+1} < \epsilon$ . (Verifique esta afirmación con una calculadora.)

Así

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots = \frac{1}{1 - q}, \quad (\text{I.25})$$

coincidiendo con lo demostrado anteriormente, usando sólo geometría.

### Ejemplo

La fracción decimal periódica  $0,317317317\dots$ , representa un número *racional*.

a) Escriba este número como una suma infinita de términos.

b) Siendo un número racional, es posible escribirlo de la forma  $p/q$ . Usando el resultado de la parte a), encuentre el valor de  $p$  y  $q$ .

a) Primero notamos que este número, por ser una una fracción decimal periódica, se puede escribir de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} 0,317317317\dots &= 0,317 + 0,000317 + 0,000000317\dots \\ \text{o de otra forma} \\ 0,317317317\dots &= 0,317 + \frac{0,317}{10^3} + \frac{0,317}{10^6} \dots \\ 0,317317317\dots &= 0,317 \left\{ 1 + \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^6} + \dots \right\} \\ 0,317317317\dots &= 0,317 \left\{ \frac{1}{1 - 10^{-3}} \right\}. \end{aligned}$$

En la última línea, usamos el resultado obtenido en [I.25]. Para poder expresarla como la razón entre dos enteros debemos escribirla de la siguiente forma

$$0,317317317\dots = \frac{317}{10^3} \left\{ \frac{1}{1 - 10^{-3}} \right\}$$

$$0,317317317\dots = \left\{ \frac{317}{10^3 - 1} \right\} = 317/999. \square$$

### Ejemplo

La serie que se incluye a continuación es divergente, a pesar que a simple vista no lo parece.

$$\begin{aligned} S &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

Usando un computador o una calculadora, encuentre el número mínimo de términos de la serie  $\sum 1/n$  que debe sumar, para que su valor sea mayor que 3. (Respuesta: 11)  $\square$

### Ejemplo

Encuentre el valor de la siguiente suma para  $n = 14$ .

$$S_n = 1 + 11 + 111 + 1111 + \dots + \overbrace{111111}^{n\text{-unos}}.$$

**Indicación:** Haga la suma de los tres primeros términos:  $S_3 = 1 + 11 + 111 = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 10 + 1 \cdot 100$ . En el caso general entonces será  $S_n = n \cdot 1 + (n - 1) \cdot 10 + \dots \square$ .

### Convergencia de una serie

*(Esta sección se puede omitir. Se incluyen al final algunos problemas de convergencia que suponen conocida la materia de esta sección.)*

¿Cómo sabemos que una suma infinita converge? (Es decir, que la suma de los infinitos términos que la componen, da como resultado un número finito).

Este es un problema difícil, y aquí sólo daremos una **receta** que será de utilidad en muchas ocasiones, pero no estudiaremos más a fondo el tema porque nos interesan principalmente aquellas series que tienen un límite.

El criterio de convergencia que usaremos es el siguiente: Tome el término  $a_{n+1}$  y  $a_n$  de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} + \dots,$$

ahora, para valores grandes de  $n$ , calcule la razón:

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

Si no consideramos los términos proporcionales a  $1/n^2$ , o más pequeños, y la fracción  $a_{n+1}/a_n$  adopta la siguiente expresión

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left(1 - \frac{s}{n}\right), \quad (\text{I.26})$$

entonces afirmamos que **la serie converge en valor absoluto si  $s > 1$** . (Converge absolutamente, puesto que tomamos el valor absoluto de  $(a_{n+1}/a_n)$ .)

La frase "no consideramos los términos proporcionales a  $1/n^2$  y más pequeños", indica que en el resultado uno ignora (no escribe) todos los términos que son más pequeños o iguales en valor a  $1/n^2$ .

### Ejemplo

Estudiemos la siguiente serie, que resulta ser divergente:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots,$$

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{n+1},$$

$$\begin{aligned} a_{n+1}/a_n &= n/(n+1) = (n+1-1)/(n+1), \\ &= 1 - 1/(n+1) \end{aligned}$$

Si  $n$  es un número muy grande entonces  $n \sim (n+1)$ .

$$a_{n+1}/a_n \sim (1 - 1/n)$$

De acuerdo al criterio mostrado,  $s = 1$  y para que la serie converja  $s$  debe ser **mayor** que la unidad, por lo tanto la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} 1/n$$

**no** converge. Esto indica que al sumar un número suficientemente grande de términos de la serie podemos obtener como resultado un número tan grande como uno pueda imaginar.

### Ejercicio

Calcule  $1/110,847$  y  $1/110,846$ . Si la calculadora es capaz de distinguir entre ellos, inténtelo con un denominador mayor, hasta encontrar el límite en el cual no puede distinguir entre números consecutivos.

$$\begin{aligned} 1/(n+1) &\sim 1/n \\ \frac{1}{(n+1)} &= \frac{1}{[n(1+1/n)]} = \frac{1}{n} \bullet \frac{1}{[1+1/n]} \\ &\simeq \frac{1}{n} \bullet [1 - \frac{1}{n}] \simeq 1/n + O(1/n^2) \end{aligned}$$

En la última línea hemos usado la aproximación demostrada anteriormente. La expresión  $O(1/n^2)$  indica en palabras que  $1/(n+1)$  es igual a  $1/n$  con un error del orden de  $1/n^2$ .

## I.4. LAS SERIES MAS USADAS.

### I.4.1. El binomio y el número e.

Una de las series que se presenta frecuentemente, es el desarrollo de de un binomio. La potencia enésima de un binomio es:

$$\begin{aligned} (1+x)^n &= 1 + nx + n(n-1)\frac{x^2}{2!} + n(n-1)(n-2)\frac{x^3}{3!} + \dots \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\infty} \frac{n!}{(n-\alpha)! \alpha!} x^\alpha \end{aligned} \tag{I.27}$$

La expresión que aparece en esta última línea es una forma compacta para representar la fórmula del binomio y contiene la expresión  $n!$  *n factorial* que será definida a continuación. Conviene desarrollar esta suma para los casos más conocidos como una forma de familiarizarse con su significado.

- Esta serie tiene sólo  $n + 1$  términos si  $n$  es un entero. En este caso la suma termina cuando  $\alpha = n$ . Si  $n$  no es un entero, la suma prosigue hasta infinito.
- Corresponde al desarrollo usual del cuadrado de un binomio si  $n = 2$ , al cubo de un binomio si  $n = 3$  ...
- Aquí sólo consideraremos el caso  $n > 0$ .
- $3!$ , se lee: tres factorial y es una denominación para el siguiente producto:

$$\begin{aligned} 3! &\equiv 3 \cdot 2 \cdot 1, \\ 1! &\equiv 1, \\ 0! &\equiv 1 \text{ (por definición)}. \end{aligned}$$

En general

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1. \tag{I.28}$$

$n!$  es un número que crece rápidamente. Compruébelo calculando  $10!$  en un computador.

Probablemente la serie más célebre es la siguiente:

$$e^x \equiv 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad (\text{I.29})$$

Donde la letra **e** define, por convención, al número irracional  $e = 2,71828\dots$ . El valor de **e** se obtiene de la serie anterior si ponemos  $x = 1$ :

$$e^1 \equiv e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots = 2,71828\dots \quad (\text{I.30})$$

Esta serie obedece las mismas propiedades que las potencias en una base cualquiera,  $a^x$  y precisamente por esa razón se define de esa forma. Por ejemplo:

$$a^m \bullet a^n = a^{m+n}, \quad \text{también} \quad e^0 = 1.$$




Figura I.12: Gráfico de la función  $y = e^x$ . La función exponencial es positiva para todos los valores de  $x$ , y toma el valor  $y = 1$ , para  $x = 0$ .

### Ejercicio

Calcule los dos decimales siguientes en la expresión de  $e = 2,7182\dots$ . Grafique la función  $y = e^x$

### Nota

Calcular los dos decimales siguientes quiere decir que al aumentar el número de términos de la serie incluidos en el cálculo, el valor de los seis primeros decimales no se altera.

- $y = e^x$  es una función positiva a lo largo de todo el eje  $x$ .
- También se denomina exponencial de  $x$ .
- $f(x) \equiv$  función de  $x$ . A un valor determinado de  $x$ ,  $f(x)$  le asocia un número real, si la función es real. Es equivalente a una tabla de valores de dos columnas, o a la información contenida en un gráfico.

### Ejemplo

Dados los números reales  $a_1, a_2, \dots, a_n$  todos ellos positivos, y dada la suma  $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ , pruebe que

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \leq 1 + \frac{S_n}{1!} + \frac{S_n^2}{2!} + \dots + \frac{S_n^n}{n!}. \square$$

Comparando la serie a la derecha de la desigualdad con la serie definida como  $e^x$ , vemos que son idénticas salvo que debemos reemplazar  $x$  por  $S_n$ . Esto es correcto, puesto que  $S_n$  es un número real tal como lo es  $x$ . Entonces

$$(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n) \leq e^{S_n},$$

a continuación escribimos explícitamente  $S_n$ :  $e^{S_n} = e^{a_1 + a_2 + \dots + a_n}$  y usando la siguiente propiedad del número  $e$ :  $e^{x+y} = e^x e^y$ , la expresión anterior se transforma en

$$e^{S_n} = e^{(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}) + a_n} = e^{(a_1 + \dots + a_{n-1})} e^{a_n} = \dots = e^{a_1} e^{a_2} \dots e^{a_n}.$$

Ahora procedemos a deshacer el camino; recordando la definición de  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots$  y que todos los  $a_i$  son positivos para  $i = 1, 2, \dots, n$ , entonces  $e^{a_i} \geq (1 + a_i)$  puesto que le hemos restado solamente números positivos al desarrollo en serie (como  $a_i^2/2!$  por ejemplo, que, entre muchos otros, falta en la serie). Reemplazando este resultado en  $e^{S_n} = e^{a_1} e^{a_2} \dots e^{a_n}$ , se obtiene el resultado pedido.  $\square$

## I.4.2. Números complejos.

Hay otra serie que nosotros usaremos más adelante para encontrar algunas relaciones trigonométricas. Antes de mostrarla necesitamos recordar las propiedades básicas de los números complejos.

Por **definición**  $i$  es el número cuyo cuadrado es  $-1$ . Se denomina  $i$  (por imaginario), y cumple con la condición  $i^2 = -1$ . En general un número complejo es aquel que tiene dos componentes, una real y otra imaginaria que se caracteriza por estar multiplicada por  $i$ . Se escribe como  $z = a + ib$ , donde  $a$  y  $b$  son números reales. Para multiplicar estos números se opera **igual** que con los reales. Por ejemplo:

$$\begin{array}{l} z_1 * z_2 \\ z_1 = a + i * b \end{array} \quad \text{donde} \quad \text{y} \quad \begin{array}{l} z_2 = c + i * d, \end{array}$$

con  $a, b, c$  y  $d$  reales. En este caso se opera como en una multiplicación de dos binomios, pero teniendo presente las propiedades del número  $i$  que se resumen a continuación:

$$\begin{array}{l} i = i \\ i^2 = -1 \\ i^3 = -i \\ i^4 = +1 \\ i^5 = i \\ \vdots \\ \dots \end{array} \quad (\text{I.31})$$

El resultado de la multiplicación es

$$\begin{aligned} z_1 * z_2 &= (a + i * b)(c + i * d) \\ &= ac + i * ad + i * bc + i * b * i * d \\ &= (ac - bd) + i * (ad + bc). \end{aligned} \quad (\text{I.32})$$

Lo expuesto es lo mínimo que necesitamos saber para operar con estos números.

Otro número irracional es  $\pi = 3, 141592\dots$ . Estos números,  $e$  y  $\pi$ , se pueden combinar en forma sorprendente. Nos referimos al siguiente resultado que se obtiene extendiendo la definición inicial que dimos de  $e^x$ . Aquí formalmente reemplazamos  $x$  por un número imaginario puro  $i\pi$  y obtenemos:

$$\begin{aligned}
 e^{i\pi} &= -1 \\
 e^{i\pi} &= 1 + \frac{(i\pi)}{1!} + \frac{(i\pi)^2}{2!} + \frac{(i\pi)^3}{3!} + \frac{(i\pi)^4}{4!} + \dots \\
 e^{i\pi} &= 1 + i\pi - \frac{\pi^2}{2!} - i\frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^4}{4!} + i\frac{\pi^5}{5!} + \dots \\
 &= \left(1 - \frac{\pi^2}{2!} + \frac{\pi^4}{4!} - \frac{\pi^6}{6!} \pm \dots\right) + \\
 &\quad i\left(\pi - \frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^5}{5!} \pm \dots\right)
 \end{aligned} \tag{I.33}$$

Lo que hicimos fue reemplazar  $x$  en los términos de la serie definida por el "sobrenombre"  $e^x$  por  $i\pi$  y desarrollar cada uno de los términos usando las propiedades de  $i$  enumeradas arriba. El valor obtenido es  $-1$ . Este resultado podemos comprobarlo en forma numérica para convencernos que es correcto. Esta es una de las ventajas del computador. Una tarea muy tediosa como sumar, por ejemplo, 70 términos de la serie anterior, se puede hacer rápidamente usando el mismo programa que el utilizado en la serie  $1/(1-x)$ .

## Ejercicio

Sumar un cierto número de términos de cada una de las series desarrolladas arriba y comprobar que –dada una cierta precisión, por ejemplo una parte en  $10^6$ –, se cumple efectivamente que  $e^{i\pi} = -1$ . □

## NOTA

Primero debe decidir acerca del número de decimales con los que se propone verificar dicha igualdad, por ejemplo: tres decimales, es decir 3,142. Después, procede a sumar los términos de la serie hasta que las cifras significativas que uno se ha fijado –tres en este caso– no se alteren al sumar los términos siguientes de la serie. □

Otra serie famosa, se obtiene al introducir un número complejo puro (es decir que tiene sólo una componente imaginaria) como exponente en  $e$ . Este número lo escribimos como  $i \cdot x$ , donde  $x$  es un número real arbitrario. La serie queda ahora :

$$\begin{aligned}
 e^{ix} &= 1 + \frac{(ix)}{1!} + \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^3}{3!} + \frac{(ix)^4}{4!} + \dots \\
 e^{ix} &= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - i\frac{(x)^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + i\frac{x^5}{5!} + \dots \\
 &= (1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \pm \dots) + \\
 &\quad i(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \pm \dots)
 \end{aligned}
 \tag{I.34}$$

$$e^{ix} \equiv \cos x + i \operatorname{sen} x, \tag{I.35}$$

En esta expresión,  $\cos x$  y  $\operatorname{sen} x$  constituyen un **apodo** para cada una (la parte real y la parte imaginaria) de las series infinitas que se obtuvieron. La idea de asociar un nombre con una serie es una forma de resaltar las propiedades de la serie. Si una serie no tiene propiedades especiales, entonces no recibe un nombre.

Cada una de las series anteriores tiene propiedades espectaculares y por esta razón reciben un nombre que las distingue entre cualquier otra. Las propiedades de estas últimas dos series se pueden obtener geoméricamente. Son, de hecho, las funciones **seno** y **coseno** que uno define en Trigonometría utilizando un triángulo rectángulo. Este es el tema de la siguiente sección.

La definición de cada una de estas series a partir de la separación en parte real e imaginaria es:

$$\cos x \equiv 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \pm \dots \tag{I.36}$$

$$\operatorname{sen} x \equiv x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \pm \dots \tag{I.37}$$

Esta serie es la que debería evaluar internamente una calculadora para obtener el valor del seno de un ángulo. Sin embargo, para mejorar su rapidez, *las calculadoras evalúan esta serie mediante una aproximación*, la aproximación de Padè, que es un cociente de polinomios *finitos* que aproximan esta función (y otras) con la precisión que uno desee.

El cálculo numérico es, en cierto sentido, un arte.

### Ejercicio

Encuentre, numéricamente, el valor de  $\operatorname{sen} \alpha$  para  $\alpha = 0,05$  radianes, de acuerdo a la serie definida con este nombre en la sección anterior. ¿Cuál es el valor de  $\alpha$  en grados? ¿Cuál es el error cometido al aproximar  $\operatorname{sen} \alpha \approx \alpha$ ? (Sume tres términos de la serie y compare la diferencia).□

## I.5. AREA ENCERRADA POR UNA CURVA

Más adelante es preciso evaluar el área encerrada bajo una curva y allí haremos uso de algunas de las sumas introducidas aquí.

Esta operación de evaluar el área bajo una curva, es lo que en cálculo se denomina *integrar una función*.

Cabe notar que aun en los casos más simples se realiza este tipo de cálculo –evaluar el área bajo una curva–, pero sin necesidad de recurrir a las sumatorias (o a la integral, si uno tiene conocimientos de cálculo infinitesimal). Por ejemplo, en el movimiento de una partícula con aceleración uniforme, es necesario calcular el área encerrada bajo la curva velocidad vs. tiempo, si desea conocer el camino recorrido por esta partícula. Aquí la *curva* es una recta y el valor del área encerrada corresponde al área de un trapecoide, cuya fórmula es conocida.

Para una partícula que soporta una aceleración variable, la curva es más complicada y, necesariamente, debemos recurrir a un método numérico para calcular, primero su velocidad y, posteriormente la distancia recorrida.

### I.5.1. Area encerrada por la curva $y = x^2$ .

La función  $y = x^2$  aparecerá en varios problemas más adelante y por esta razón la estudiaremos en detalle.

Para calcular el área encerrada por una curva sumaremos el área de cada uno de los rectángulos que aparecen en la Figura I.13 acotados (superior o inferiormente) por la curva. Este es el procedimiento más elemental, existen otros métodos más sofisticados que contienen errores más pequeños. Consideraremos una de estas otras aproximaciones posteriormente.

Calculemos una cota *inferior* para esta área; sumemos los rectángulos achurados, que se ubican *debajo* de la curva:




Figura I.13: El área bajo la curva se ha descompuesto en una suma de rectángulos. Una familia de rectángulos dará como resultado un valor mayor para el área buscada, y la otra familia de rectángulos, un valor menor.

$$\text{Area}_{INF} = \sum_{n=1}^{100} (n-1)^2 \cdot \Delta \quad (\text{I.38})$$

Designamos la base del rectángulo que se muestra en la Figura I.13 como  $\Delta$ . El factor  $(n-1)^2$  representa el valor mínimo de  $y = x^2$  en el intervalo  $n$ -ésimo. En otras palabras, trazamos un rectángulo que toque a la curva  $y = x^2$  en el punto más bajo de cada uno de los intervalos.

En seguida desarrollamos  $(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1$  y usamos las siguientes propiedades de las sumatorias (válidas si las sumatorias son finitas).

$$\sum_{n=1}^{100} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{100} a_n + \sum_{n=1}^{100} b_n, \quad (\text{I.39})$$

$$\sum_{n=1}^{100} \lambda \cdot a_n = \lambda \sum_{n=1}^{100} a_n, \quad \lambda = \text{constante.} \quad (\text{I.40})$$

La sumatoria se transforma entonces en:

$$\text{Area}_{INF} = \sum_{n=1}^{100} (n-1)^2 \cdot \Delta = \left[ \sum_{n=1}^{100} n^2 \cdot \Delta - 2 \sum_{n=1}^{100} n \cdot \Delta + \sum_{n=1}^{100} 1 \cdot \Delta \right].$$

Para simplificar los cálculos, haremos  $\Delta = 1$ , de esta forma este término no aparece en la sumatoria. En general, para funciones más complicadas que la actual, el valor de  $\Delta$  se hace depender de  $n$ , con el objeto de minimizar el error introducido.

En algunos de los cálculos posteriores –en otros capítulos–, esta longitud,  $\Delta$ , será incluida en la suma, con el objeto de lograr un resultado exacto.

Volviendo a nuestra sumatoria, observamos que después de esta simplificación, la expresión queda

$$\text{Area}_{INF} = \left[ \sum_{n=1}^{100} n^2 - 2 \sum_{n=1}^{100} n + \sum_{n=1}^{100} 1 \right].$$

En la Figura se aprecia que el área denominada con  $INF$  es MENOR que la que el área encerrada bajo la curva  $y = x^2$ , que es la que debemos calcular.

Ahora si tomamos el rectángulo cuya altura corresponde al valor máximo de la función en el intervalo, entonces obtenemos

$$\text{Area}_{SUP} = \sum_{n=1}^{100} n^2. \quad (\text{I.41})$$

Nuevamente hemos tomado la longitud de la base del rectángulo,  $\Delta$ , igual a la unidad. También, en la Figura se aprecia que el  $\text{Area}_{SUP}$  es MAYOR que el área que deseamos estimar.

Hemos obtenido una cota superior e inferior para el valor del área encerrada por la curva  $y = x^2$ . No es difícil aceptar que un valor más cercano al valor exacto asignado al área encerrada bajo esta curva, se obtendrá promediando estas dos cotas.

Se desprende de aquí que para evaluar numéricamente esta área necesitamos, conocer el valor de las sumatorias que han aparecido hasta aquí:  $\sum_{n=1}^N n$  y  $\sum_{n=1}^N n^2$ .

### I.5.2. Valor de la sumatoria $\sum_{n=1}^N n$

A pesar que el resultado de esta sumatoria es el mismo si  $N$  es par o impar, analizaremos ambos casos en forma independiente.

Consideremos primero el caso de  $N$  par.

$$\sum_{n=1}^N n = 1 + 2 + \overbrace{3 + 4 + \dots + (N-3) + (N-2)}^{(N+1)} + (N-1) + N$$

Una de las formas de obtener el valor de esta sumatoria consiste en reagrupar los términos en la forma señalada: aquellos unidos por el extremo de cada una de las llaves indicadas en la fórmula, y posteriormente sumarlos de a pares. El valor que toma cada uno de estos pares es  $(N + 1)$ . Ahora si  $N$  es par el número de llaves que debemos considerar es  $N/2$  puesto que la suma tiene  $N$  términos, y el valor de la suma es  $N/2$  veces  $(N + 1)$ :

$$\sum_{n=1}^N n = (N + 1) \frac{N}{2}. \quad (\text{I.42})$$

**N impar.**

Si  $N$  es impar, la suma de cada par de términos tiene el mismo valor que antes  $(N + 1)$ , **excepto** que ahora al agruparlos permanece uno (el del centro), sin compañero. El valor de este término, es  $(N + 1)/2$ .

### Ejercicio

Compruebe esta afirmación para las sumatorias donde  $N$  toma valores pequeños e impares, como  $N = 5$  ó  $N = 7$ .

La expresión que toma la sumatoria es

$$\sum_{n=1}^N n = 1 + 2 + \dots + \frac{(N+1)}{2} + \dots + (N-1) + N$$

Sumamos entonces teniendo en cuenta que el valor del término central es  $(N + 1)/2$ , y que debe ser sumado en forma aparte. El valor de la sumatoria se obtiene sumando  $(N - 1)/2$  veces  $(N + 1)$  y añadiendo el término central  $(N + 1)/2$ . Recuerde que  $(N - 1)$  es un número par, y que la suma del primero y el último de este par es  $(N + 1)$ .

El resultado final es

$$\begin{aligned}
 \sum_{n=1}^N n &= (N+1) \cdot (N-1)/2 + (N+1)/2 \\
 &= (N^2 - 1)/2 + (N+1)/2 \\
 &= N(N+1)/2
 \end{aligned}$$

Vemos que la expresión es la misma, sea  $N$  **par o impar**, de modo que:

$$\sum_{n=1}^N n = N(N+1)/2 \quad (\text{I.43})$$

El método expuesto se debe a Gauss.

### I.5.3. Valor de la sumatoria $\sum_{n=1}^N n^2$ .

Para evaluar la cota inferior o superior para el área encerrada bajo la curva, necesitamos conocer el valor de otra sumatoria, aquella que contiene  $n^2$ . Usaremos dos métodos diferentes para evaluar la suma. El procedimiento indicado a continuación es complejo. Lo estudiaremos como una forma de familiarizarnos con la manipulación de las sumatorias.

Incluiremos otro método, más simple, como ejercicio al final de este capítulo.




Figura I.14: La Figura muestra los puntos dentro del cuadrado con línea cortada que permite evaluar una suma cualquiera de números impares. Usaremos este esquema para encontrar el valor de  $\sum n^2$ .

A partir de la Figura, sumando los puntos ubicados dentro del cuadrado con línea cortada, se puede verificar la siguiente igualdad:

$$\begin{array}{rcl}
 1 & & = 1 \\
 1 + 3 & & = 2^2 \\
 1 + 3 + 5 & & = 3^2 \\
 \dots & & \vdots \\
 1 + 3 + 5 + \dots + (2N - 1) & = & N^2
 \end{array}$$

Los valores ubicados a la derecha del signo igual son precisamente los números que queremos sumar. Sumando los números de la izquierda por columnas, obtenemos:

$$N + 3 \cdot (N - 1) + 5 \cdot (N - 2) + \dots + (2N - 1) \cdot 1 = \sum_{n=1}^N n^2$$

Para obtener este resultado recordemos que hay  $N$  filas y, repetimos, que se han sumado columna por columna. En ese mismo orden está escrito el resultado en la ecuación anterior. También podemos *verificar* que la suma que aparece a la izquierda del signo igual se puede escribir como

$$\begin{aligned}
 \overbrace{(1)} \cdot \underbrace{[N]} + \overbrace{(3)} \cdot \underbrace{[N - 1]} + \dots + \overbrace{(2N - 3)} \cdot \underbrace{[2]} + \overbrace{(2N - 1)} \cdot \underbrace{[1]} &= \\
 \sum_{n=1}^N \overbrace{(2n - 1)} \underbrace{[N - (n - 1)]} &
 \end{aligned}$$

Las llaves *sobre* los números a la izquierda del signo igual, indican una familia de términos representada por la expresión genérica  $(2n - 1)$ . Este factor se ubica, con la misma identificación, a la derecha del signo igual. Análogamente, los términos con una llave *bajo* el número, son generados por el término señalado a la derecha de la ecuación con una llave similar.

### Ejercicio

Verifique que  $(2n - 1)$  es un número impar para cualquier valor de  $n$  y, que en este caso, toma cada uno de los valores de los números que caracterizan a cada columna, exactamente en el mismo orden en que van apareciendo.

Verifique, dando distintos valores de  $n$ , que el término entre paréntesis cuadrado reproduce el otro factor de la suma. □

Recordando que esta sumatoria se originó al considerar la sumatoria de  $n^2$ , tenemos

$$\sum_{n=1}^N (2n-1)[N-(n-1)] = \sum_{n=1}^N n^2$$

El resto del cálculo se reduce a separar en un miembro de la ecuación la sumatoria de  $n^2$  y en el otro el resto de los términos.

Desarrollando el miembro de la izquierda, de acuerdo a las reglas establecidas, vale decir: las constantes salen fuera de la sumatoria y la sumatoria de una suma (o resta) es lo mismo que la suma (o resta) de la sumatoria de sus respectivos términos, tenemos

$$N \sum_{n=1}^N (2n-1) - \sum_{n=1}^N (2n-1)(n-1) = \sum_{n=1}^N n^2.$$

Aplicando, nuevamente, las propiedades conocidas de las sumatorias,

$$2N \sum_{n=1}^N n - N \sum_{n=1}^N 1 - \sum_{n=1}^N (2n^2 - 3n + 1) = \sum_{n=1}^N n^2$$

$$2N \sum_{n=1}^N n - N \sum_{n=1}^N 1 - 2 \sum_{n=1}^N n^2 + 3 \sum_{n=1}^N n - \sum_{n=1}^N 1 = \sum_{n=1}^N n^2$$

Ordenando las sumatorias que tienen los mismos sumandos

$$(2N+3) \sum_{n=1}^N n - (N+1) \sum_{n=1}^N 1 = 3 \sum_{n=1}^N n^2,$$

y reemplazando el valor obtenido para  $\sum_{n=1}^N n$ , [I.43], y recordando que  $\sum_{n=1}^N 1 = N$ , tenemos:

$$2N^2(N+1)/2 - (N+1)N + 3N(N+1)/2 = 3 \sum_{n=1}^N n^2,$$

y finalmente, haciendo un poco de álgebra obtenemos:

$$\sum_{n=1}^N n^2 = N[(2N+1)(N+1)]/6. \quad (\text{I.44})$$

Esta fórmula es válida para cualquier valor de N.

### I.5.4. Valor obtenido para el área bajo la curva $y = x^2$ .

Con los resultados obtenidos anteriormente estamos capacitados para evaluar las sumatorias que aparecieron en la estimación del área bajo la curva  $y = x^2$ .

Volvamos entonces a las ecuaciones [I.38], [I.41] que correspondían al área evaluada por defecto y por exceso respectivamente.

Uno puede *intuir* que un valor cercano al valor exacto de la superficie bajo la curva entre  $x = 0$  y  $x = 100$  se puede obtener promediando los valores de la cota superior e inferior encontrados para el área. Para este cálculo tomamos  $N = 100$  en las ecuaciones anteriores y evaluamos. ( En realidad esto no es lo más cercano al valor verdadero que uno puede obtener pero sí lo más directo ). Veamos su valor,

$$\begin{aligned} \text{Area} &= \frac{1}{2}[\text{Area}_{(SUP)} + \text{Area}_{(INF)}] \\ &= \frac{1}{2}[2 \sum_{n=1}^N n^2 - 2 \sum_{n=1}^N n + \sum_{n=1}^N 1] \\ &= N[(2N + 1)(N + 1)/6 - N(N + 1)/2 + N/2] \\ &= N(N + 1)[(2N + 1)/6 - 1/2] + N/2 \\ &= [N^3/3 + N/6] \end{aligned}$$

Si  $N = 100$

$$\simeq \frac{1}{3}10^6 + \frac{100}{6}.$$

El valor exacto de esta sumatoria es  $10^6/3$ . El error relativo que hemos cometido es del orden de un 0,005 %, como se muestra a continuación.

$$\frac{[\frac{1}{6}10^2]}{[\frac{1}{3}10^6]} \simeq 0,5 \times 10^{-4} = 0,005 \% \quad \text{de error.}$$

### Ejercicio

Si definimos  $\Delta$  como el largo de la base del rectángulo, entonces usando un valor de  $\Delta$ , constante pero más pequeño, obtenga resultados aún más exactos.

Note que ahora debe incluir  $\Delta$  en la ecuación inicial para el cálculo del área, pero que éste, por ser constante sale fuera de la sumatoria.

También debe recordar que,  $\Delta$  más pequeño es lo mismo que dividir el área bajo la curva en rectángulos más esbeltos y que necesariamente se debe cumplir que  $N \cdot \Delta = L$ , donde  $L$  es el largo de la base.  $\square$

### I.5.5. Método general para evaluar sumatorias del tipo $\sum_{n=1}^N n^k$ .

Aquí propondremos un método más simple y más general que el anterior para evaluar las sumatorias del tipo indicado en el encabezamiento de esta sección.

Vamos a reobtener el valor de la sumatoria

$$\sum_{n=1}^N n = 1 + 2 + 3 + \dots + N.$$

El método alternativo propuesto para evaluarla, consiste en calcular la siguiente combinación de sumatorias,

$$\sum_{n=1}^N (n+1)^2 - \sum_{n=1}^N n^2.$$

A pesar que inicialmente esta combinación no parece estar relacionada con la sumatoria que nos interesa, podemos ver que al desarrollar el binomio de la primera sumatoria suceden dos cosas que son de relevancia en nuestro caso, primero

$$\sum_{n=1}^N (n+1)^2 - \sum_{n=1}^N n^2 = \sum_{n=1}^N (n^2 + 2n + 1) - \sum_{n=1}^N n^2 = \sum_{n=1}^N (2n + 1). \quad (\text{I.45})$$

Donde hemos usado la asociatividad de la sumatoria (la misma propiedad de los números reales) [I.39], y con ello hemos cancelado las sumatorias que contenían  $n^2$ .

En segundo lugar, la resta de sumatorias que aparece a la izquierda de la última ecuación puede ser evaluada fácilmente si escribimos cada uno de sus términos en columnas separadas como se indica a continuación:

$$\begin{array}{rcl} 2^2 & - & 1^2 & \text{primer término de la sumatoria,} \\ 3^2 & - & 2^2 & \text{segundo término de la sumatoria,} \\ 4^2 & - & 3^2 & \text{tercer término de la sumatoria,} \\ & & \vdots & \vdots \\ (N+1)^2 & - & N^2 & \text{N-ésimo término de la sumatoria.} \\ \hline (N+1)^2 & - & 1 & \end{array}$$

Es fácil ver que los términos de la suma se van anulando entre ellos, permaneciendo sólo el primero y el último, cuya diferencia es el resultado de la suma. El valor de la suma es:  $N(N + 2)$ .

Por otra parte el término de la derecha de la ecuación [I.45] es:

$$2\left(\sum_{n=1}^N n\right) + \sum_{n=1}^N 1 = 2\left(\sum_{n=1}^N n\right) + N.$$

De aquí se puede despejar  $\sum_{n=1}^{n=N} n$  que es la sumatoria cuyo resultado buscamos:

$$\sum_{n=1}^N n = N(N + 1)/2 \quad (\text{I.46})$$

### Ejercicio

Usando este método, reobtenga el valor de la siguiente sumatoria:

$$\sum_{n=1}^N n^2 = N(2N + 1)(N + 1)/6.$$

Indicación: use la ecuación [I.45], pero incluyendo potencias cúbicas en lugar de las cuadráticas que allí aparecen. □

*Con este método se puede calcular la sumatoria de una potencia arbitraria de  $n$ . Para ello se debe conocer el valor de la sumatoria de una potencia más baja que la buscada y tomar la diferencia entre las sumatorias de una potencia inmediatamente superior, en la forma ya señalada.*

### I.5.6. Regla del trapecio.

A continuación incluimos la fórmula usada para calcular numéricamente el área bajo una curva  $y = f(x)$  usando trapecios (en lugar de rectángulos) como unidades elementales. De cualquiera de las Figuras de esta Sección, se desprende que la idea es acomodar un trapecio bajo la curva, apoyando uno de sus catetos en el eje  $x$  y el cateto opuesto aproxima la curva mediante una recta.




Figura I.15: Regla de Trapecio. Tomando un conjunto de puntos de la curva, se calcula el área como la suma del área de los trapecios construidos uniendo los puntos mediante rectas.

Si queremos calcular el valor del área bajo la curva entre los puntos  $x = a$  y  $x = b$ , dividimos dicho segmento en  $(N - 1)$  segmentos mediante los puntos  $x_n$  con  $0 \leq n \leq N$ . El valor de la función en cada uno de sus puntos se designa como  $f_n \equiv f(x_n)$ , es decir  $f_0 \equiv f(x_0) = f(a)$ ,  $f_1 \equiv f(x_1)$ ...  $f_N \equiv f(x_N) = f(b)$ , donde hemos identificado  $x_0$  con  $a$  y  $x_n$  con  $b$ .

Recordemos que el área de un trapecio es la semisuma de sus bases multiplicada por la altura. La fórmula para el área de un trapecio cualquiera dentro del tramo de interés es:


$$\text{Área del trapecio} = \frac{1}{2} [f_{n-1} + f_n] (x_n - x_{n-1}).$$

En este caso, el trapecio está puesto en forma vertical: la base del trapecio es cada una de las verticales señaladas como  $f_0, f_1, f_2, \dots, f_N$ , cuyo valor es el valor que toma la función  $f(x)$  para  $x = 0, x = 1, x = 2, \dots, x = N$  respectivamente (ver Figura).

Si sumamos el área de cada uno de los trapecios de la Figura, suponiendo que todos los trazos son iguales:  $[x_n - x_{n-1}] \equiv \Delta$ , para simplificar el álgebra, obtenemos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} \sum_a^b f(x)\Delta &\simeq \Delta[f_0 + f_1]/2 + \\ &\Delta[f_1 + f_2]/2 + \Delta[f_2 + f_3]/2 + \dots \\ &+ \Delta[f_{N-2} + f_{N-1}]/2 + \Delta[f_{N-1} + f_N]/2. \\ &= \Delta \left\{ 1/2 \cdot f_0 + \left[ \sum_{i=1}^{N-1} f_i \right] + 1/2 \cdot f_N \right\}. \end{aligned} \quad (\text{I.47})$$

La suma  $\left\{ \sum_a^b f(x) \Delta \right\}$  indica el valor del área encerrada entre  $x = a$  y  $x = b$  por la función  $f(x)$ .



### Regla $\frac{1}{3}$ de Simpson

En el método anterior reemplazamos cada elemento de área por un trapecio. Si la función no tiene grandes variaciones en un intervalo finito (es una función suave) el método anterior constituye una buena aproximación.

Ahora, si la curva varía muy rápidamente, se puede mejorar la exactitud del valor obtenido, si en lugar de aproximar la curva por una recta (como en el caso anterior) ajustamos una parábola ( $y(x) = ax^2 + bx + c$ ) que pase por estos tres puntos de la curva —en cada tramo—, y calculamos el valor exacto del área bajo dicha curva.

Si repetimos esta operación con todos los grupos de tres puntos para cada tramo en que se dividió el segmento  $[x_a, x_b]$  y sumamos, obtenemos un valor con menos error en el cálculo numérico del área bajo una curva.

Este método es más sofisticado de lo que corresponde al nivel adecuado a este libro.

## I.6. EJERCICIOS

En el enunciado de los problemas de Trigonometría que se plantean a continuación, nos referimos a los lados y ángulos que se indican en el triángulo rectángulo de la Figura.

- 1.- Un árbol ha sido quebrado por el viento. La parte inferior del tronco, permanece vertical y tiene una altura de 5 m. La parte derribada se apoya con uno de sus extremos en el tronco y con el otro en el piso, dibujando un ángulo de  $35^\circ$  con el piso. Calcular la altura que tenía este árbol antes de partirse en dos.




Figura I.16:

- 2.- Para calcular el ancho de un río, se mide una distancia,  $AB$  (ver Figura), a lo largo de su orilla, tomándose el punto  $A$  directamente opuesto a un árbol  $C$ , ubicado en la otra ribera. Si el ángulo  $\angle(ABC)$  es de  $55^\circ$  y la distancia  $AB$  de 10 m, ¿cuál es el ancho del río?
- 3.- El mástil de un gran navío tiene una altura de 30 m sobre el nivel del mar. Lejos de allí, un pescador en su bote, ve el mástil subtendido por un ángulo de  $5^\circ$ . Si el ángulo está en un plano vertical: ¿a qué distancia se encuentra el bote?  
(Desprecie la altura del bote y del pescador que está sentado en él.)
- 4.- Al observar dos torres desde el *punto medio* de la distancia que las separa, los ángulos de elevación de sus extremos superiores son  $30^\circ$  y  $60^\circ$  respectivamente. Demostrar que la altura de una de las torres alcanza el triple del valor de la altura de la otra.
- 5.- Al aproximarse una patrulla de reconocimiento a un fuerte (ver Figura) situado en una llanura encuentra que, desde un cierto lugar, el fuerte se ve bajo un ángulo de  $10^\circ$ , y desde otro punto, 200 m más cerca del fuerte, se ve bajo un ángulo de  $15^\circ$ . ¿Cuál es la altura del fuerte y cuál es su distancia al segundo lugar de observación?

- 6.- En un hexágono regular de lado  $a$ , se pide:
- Calcular los radios de los círculos inscrito y circunscrito en función de  $a$ .
  - La diferencia entre las áreas del hexágono y el círculo inscrito.
  - La diferencia entre las áreas del hexágono y el círculo circunscrito.
- 7.- Con el fin de medir la altura,  $h$ , de un objeto se ha medido la distancia entre dos puntos, A y B, a lo largo de una recta que pasa por su base en un plano horizontal y resultó ser  $\ell$  metros. Los ángulos de elevación de la punta del objeto desde A y B resultaron ser  $\alpha$  y  $\beta$  respectivamente, siendo A el punto más cercano a la base (ver Figura siguiente). Demostrar que la altura está dada por la fórmula:

$$h = \frac{\ell}{\cot \beta - \cot \alpha}, \quad \text{si A y B están del mismo lado, y por:}$$

$$h = \frac{\ell}{\cot \beta + \cot \alpha}, \quad \text{si A y B están en lados opuestos de la base del objeto.}$$




Figura I.17:

- 8.- A partir de la serie:

$$(1+x)^n = \sum_{\alpha=0}^n \frac{n!}{(n-\alpha)!} \frac{x^\alpha}{\alpha!}$$

compruebe que para  $h \ll 1$ , es posible aproximar  $(1+h)^n$  como:

$$(1+h)^n \approx 1 + nh + O(h^2).$$

Para verificar la exactitud de esta aproximación, elija tres valores de  $h$ , por ejemplo: 0,01, 0,1 y 0,5, con ellos calcule el valor de  $(1 + h)^8$  de dos formas: utilizando la expresión exacta y a través de la aproximación mencionada. Compárelos y estime el porcentaje de error cometido, en cada uno de los casos, al truncar la serie.

9.- a) Verifique numéricamente la igualdad siguiente:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

b) Estime el valor del ángulo  $\alpha$  si:

$$\text{sen } \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

10.- Calcule el valor de las siguientes series:

a)  $1 + 1/2! + 1/3! + \dots, 1/n! + \dots$

b)  $1/2! - 1/3! + 1/4! - 1/5! + \dots$

c)  $1 - 1/2! + 1/3! - 1/4! + \dots$

**Respuestas:** a)  $(e - 1)$ , b)  $e^{-1}$ , c)  $(1 - e^{-1})$ .

Compruebe estos resultados numéricamente.

11.- Una forma de estudiar la convergencia de una serie es comparándola con otras, cuya convergencia es bien conocida.

a) Sea:  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ , una serie *convergente*, cuyo término  $k$ -ésimo es  $a_k$ .

Si existe otra serie:

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad \text{tal que, } |b_k| < |a_k| \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

entonces,  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  converge.

b) Sea  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ , una serie divergente y sea

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k \quad \text{otra serie, tal que} \quad b_k > a_k > 0, \forall k \in N,$$

entonces  $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$  diverge.

Usando estos resultados –que no necesita demostrar–, estudie la convergencia de:

$$\begin{array}{ll} i) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} & ii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{k+1}{k} \right), \\ iii) \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+1)!} & iv) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^\alpha}{k}, \quad \alpha > 0 \end{array}$$

**Indicación:**

i) Recuerde que  $1/[k \cdot (k+1)] = 1/k - 1/(k+1)$ .

ii) Compare  $(k+1)/k$  con 1.

iii) Compare con la serie correspondiente al número  $e$ .

12.– Es común utilizar la siguiente aproximación  $\sin \alpha \approx \alpha$  (para  $\alpha$  pequeño), cuando el ángulo  $\alpha$  está expresado en radianes.

a) A partir de la definición de radianes como medida angular, justifique esta aproximación.

b) Usando la expresión asociada a la serie  $\sin \alpha$ , demuestre que la aproximación es correcta.

13.– Repita el análisis del problema anterior, con la aproximación:

$\cos \alpha \approx 1$  (para  $\alpha$  pequeño).

14.– Una persona ubicada en el punto P de la Figura, observa dos montes con ángulos de elevación  $\alpha$  y  $\beta$  respectivamente.

Si el de la izquierda tiene una altura  $h$  y la separación entre ambos es D, calcule la altura del monte opuesto.




Figura I.18:

15.– Sean  $\alpha$  y  $\delta$  dos ángulos medidos en radianes.

i) Usando la expresión para la suma de ángulos, calcule:

$$\frac{[\text{sen}(\alpha + \delta) - \text{sen } \alpha]}{\delta},$$

ii) Haga tender a cero el valor de  $\delta$ , es decir, suponga que  $\delta \ll 1$  y calcule el valor de la expresión anterior, utilizando las aproximaciones relevantes.




Figura I.19: El gráfico de la izquierda corresponde a la serie truncada en el octavo término. Si se incluyen los primeros 41, se obtiene el gráfico de la derecha.

16.– Graficar la función:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} [\text{sen } x + (\text{sen } 3x)/3 + (\text{sen } 5x)/5 + \dots]$$

Compruebe que al aumentar el número de términos de la serie, ésta se aproxima rápidamente a la función:

$$f(x) = +1 \quad 0 < x < \pi$$

$$f(x) = -1 \quad \pi < x < 2\pi$$

Compruebe que para  $x = \pi$  se produce una discontinuidad de la función y en el caso que  $n \rightarrow \infty$ , este salto es del orden de un 18% de la altura de la función.

¿Puede ver esto en el gráfico del computador? (Nota: sume un número grande de términos de la serie).

17.– Encontrar el desarrollo en serie de  $\cos 3\alpha$ , en potencias de  $\alpha$ .

Desprecie las potencias de orden  $\alpha^4$ , o mayores.

18.– a) Demostrar que para ángulos pequeños, es válida la aproximación:

$$\text{sen}(2\alpha) \approx 2\text{sen } \alpha$$

b) Encuentre el valor máximo que pueden alcanzar los ángulos, si se tolera un error de a lo más 0,001 en la aproximación. (Use una calculadora).

c) Qué rango de valores de  $\beta > 0$ , mantienen la convergencia de las siguientes series:

$$i) \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{\beta}\right)^k, \quad ii) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{\beta^k}.$$

d) ¿Cuál es el valor de las series anteriores suponiendo que convergen?





Figura I.20:

19.– Use el triángulo de la Figura para encontrar la expresión de  $\cos(\alpha + \beta)$  en función de  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$ ,  $\text{sen } \alpha$  y  $\text{sen } \beta$ .

20.– En esta Figura se puede apreciar la diferencia entre un día *sideral* y uno *solar*.

Para hacer la explicación más simple, supongamos que es posible observar las estrellas durante el día. En realidad las estrellas están allí y de hecho los radioastrónomos las observan durante el día.

Para un observador en el Ecuador, el día solar es el intervalo que transcurre entre dos pasos consecutivos del Sol por el cenit (posición del Sol justo sobre nuestras cabezas). El día sideral es el tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de una *estrella lejana* por el cenit.



La diferencia que existe entre ambas definiciones se debe al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol como se indica en la Figura que se acompaña.


Este desplazamiento no cambia la posición de la estrella lejana –precisamente por estar tan lejana–, pero la posición del Sol en el cenit ocurre antes que la Tierra alcance a dar una vuelta completa alrededor de su propio eje.

Determinar el valor del ángulo  $\alpha$  definido en la Figura. Calcule la diferencia, expresada en segundos, entre el día sideral y el día solar.

21.– Considere una escalera apoyada en una muralla.

Demostrar que el punto medio de esta escalera, de largo  $L$  que resbala apoyándose en el muro, describe una circunferencia.


La ecuación de una circunferencia de radio  $R$  es:  $x^2 + y^2 = R^2$ .



22.– Se pide calcular el volumen del cono que se muestra en la Figura haciendo uso de las herramientas matemáticas introducidas en el complemento matemático del apéndice.

Para ello se sugiere trabajar de la siguiente forma:

a) Descomponga el cono en una suma de troncos de cono de altura constante  $\Delta$  y cuyo volumen está dado por la fórmula siguiente:




$$V_{\text{Tronco de Cono}} = \pi \cdot \left[ \frac{r_n + r_{n+1}}{2} \right]^2 \cdot \Delta.$$

Sume cada uno de estos volúmenes hasta completar el cono. Use las propiedades de la sumatoria y los resultados obtenidos anteriormente para:

$$\sum_{n=1}^{n=N} n^2 = \frac{N(2N+1)(N+1)}{6},$$

$$\sum_{n=1}^{n=N} n = \frac{N(N+1)}{2},$$

$$r_n = n \cdot \Delta \cdot \tan \theta, \quad \Delta = \text{Cte.}, \quad \tan \theta = \frac{a}{L} = \text{Cte.}$$



b) Para obtener el valor exacto del volumen de un cono, tome los siguientes límites en los resultados anteriores:

$$\Delta \longrightarrow 0, \quad N \longrightarrow \infty,$$

de manera que el producto permanezca constante.

$$\lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \Delta \rightarrow 0}} N \cdot \Delta = L.$$

23.- Una camionada de arena seca se descarga formando un cono cuya base es una circunferencia de 4 metros de diámetro. Si la pendiente de la arena seca es de  $\theta = 32^\circ$  y su densidad es  $\rho = 1,7 \text{ g/cm}^3$ , calcule la masa de la arena.

- 24.- Encuentre el ángulo entre dos diagonales de un cubo.
- 25.- Un tetraedro regular es la figura geométrica que se obtiene al formar una pirámide con cuatro triángulos equiláteros idénticos. Encuentre el ángulo entre dos de sus caras.
- 26.- Un tambor de 50 cm de radio y 1.5 m de largo se encuentra en posición horizontal apoyado sobre su manto y lleno con parafina hasta una altura  $h = 60$  cm. ¿Cuántos litros de parafina hay en el tambor?
- 27.- ¿Para qué latitud, el paralelo terrestre tiene  $1/3$  de la longitud del Ecuador?
- 28.- Al incidir un rayo de luz sobre una superficie que separa dos medios diferentes, por ejemplo, al pasar del aire al vidrio o viceversa, ésta sufre un cambio de dirección (ver Figura). Este fenómeno se conoce con el nombre de refracción de la luz. La ecuación que describe este fenómeno es la Ley de Snell:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_{\text{aire}}}{v_{\text{vidrio}}}$$

donde  $v_{\text{aire}}$  y  $v_{\text{vidrio}}$ , corresponden a la velocidad de la luz en el aire y en el vidrio respectivamente. (Para el vidrio común se acepta el valor  $v_{\text{aire}}/v_{\text{vidrio}} \simeq 1,5$ ).




Figura I.21: .

Supongamos que un haz de luz incide sobre un vidrio de caras paralelas y de 2 cm de espesor, con un ángulo de incidencia  $\alpha = 40^\circ$ . Determine el espesor  $d$  del vidrio

para el cual el rayo de luz emergente se encontrará paralelamente desplazado respecto al incidente. (Ver Figura).

- 29.– Considere ahora un rayo de luz incidiendo sobre un prisma en la forma como se muestra en la Figura. Encuentre el ángulo  $\beta$  para  $\alpha = 20^\circ, 40^\circ, 50^\circ$  y  $70^\circ$ .

¿Para qué valor del ángulo incidente  $\alpha$ , el rayo de luz se propaga paralelamente a la cara interior del lado opuesto al de incidencia del prisma?


Para valores de  $\alpha$  mayores, el haz de luz se refleja especularmente en la superficie interior del prisma. Este fenómeno se conoce con el nombre de *reflexión total*.

- 30.– Desde un punto  $D$ , una persona puede observar una estatua con su pedestal en forma completa.

Conoce su altura y la del pedestal, que son 6 y 4 m, respectivamente.

El ángulo de elevación de la cabeza de la estatua con respecto al piso es el doble del ángulo que subtiende el pedestal.

A partir de estos datos, calcule a qué distancia se encuentra este observador.



- 31.– Usando el método de las sumatorias, calcule el valor del área encerrada entre la línea  $y = x$  y la parábola  $y = x^2$ , entre el intervalo  $[0,1]$  del eje  $x$ .

**Respuesta:**  $1/6$ .

- 32.– **Estimaciones del tamaño de la Tierra.**

Los antiguos reconocieron la esfericidad de la Tierra a través de diversas observaciones:

- En los eclipses de Luna la sombra de la Tierra sobre la superficie lunar es redonda.
- La elevación de una estrella sobre el horizonte varía con la latitud.
- Los barcos se pierden rápidamente de vista desapareciendo bajo el horizonte al alejarse.

Uno de los primeros valores para el perímetro del globo terráqueo fue obtenido por Eratóstenes ( $\sim 330$  A. de C.).

Eratóstenes sabía que al mediodía del 22 de Junio el Sol caía verticalmente en Siena (actualmente Asuán): la luz solar que incidía sobre un profundo pozo se reflejaba en el fondo hacia arriba. (Ver Figura). El mismo día, a la misma hora, se midió en Alejandría la sombra de un alto obelisco. Eratóstenes encontró que los rayos del Sol formaban un ángulo de  $7,5^\circ$  con la vertical.




Figura I.22: Ejercicio # 32. El valor obtenido por Eratóstenes no resultó ser el correcto debido a la imprecisión en la medida de las distancias..

Sabiendo que Alejandría se encuentra a algo más de 800 Km. al Norte de Siena, estime el valor del perímetro y radio terrestres.

### 33.- Estimación del alcance visual sobre el horizonte.

Suponga que un observador se encuentra a una altura  $h$  sobre el suelo en un terreno sin accidentes . ¿A qué distancia  $\ell$ , se halla el límite del horizonte?

(Use  $R = 6,400$  km). Calcule  $\ell$  para:

$h_1 = 2$  m, ( $\sim$  estatura de una persona),

$h_2 = 20$  m, ( $\sim$  vigía de un barco),

$h_3 = 300$  m, ( $\sim$  altura del cerro San Cristóbal).

(Ver Figura)

### 34.- Masa de la Tierra.

La mayoría de los líquidos y sólidos constituyentes de nuestro planeta tienen densidades que fluctúan entre 1 y 10 kg/lt. A partir de estos datos y usando  $R = 6,400$  km para el radio de la Tierra, *estime* un valor para su masa.





Figura I.3: Ejercicio # 52



Ejercicio # 54

Figura I.23: Ejercicio 33

Ejercicio # 35.

### 35.- Relación entre el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra.

Se intercala una moneda de un diámetro de 2 cm. entre el ojo y la Luna, ocultándola a la vista. La moneda se aleja gradualmente, encontrándose que el borde de la Luna empieza a ser visible cuando la moneda está a unos dos metros de la pupila.

Use estos datos para encontrar una relación entre el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra.

### 36.- Tamaño de la Luna y distancia a la Tierra.

El tamaño de la Luna fue comparado con el de la Tierra por Aristarco (270 A. de C.), durante un eclipse lunar. (Esto ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol). Aristarco midió el tiempo que tardaba la Luna en cruzar la sombra de la Tierra, y encontró que el diámetro de la sombra terrestre era dos veces y media el diámetro de la Luna.

Sin embargo, la sombra de los planetas no es un cilindro, sino un cono. Durante una eclipse solar (cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra), es sólo un poco más que el vértice del cono de sombra de la Luna lo que alcanza a la Tierra.

Aristarco dedujo esto observando que durante el eclipse, la Luna cubre apenas el disco solar. Argumentó que en un eclipse de Luna, la sombra de la Tierra se reduce en la misma razón que en el caso de la Luna.

Con estos datos, deduzca que  $d = \frac{2}{7}D$ , donde  $d$  es el diámetro lunar y  $D$ , el diámetro terrestre. Usando este resultado, el valor del radio terrestre y la relación entre el diámetro de la Luna y su distancia a la Tierra, estime:

- a) el diámetro lunar,  
b) la distancia Tierra–Luna.




Figura I.4: Ejercicio # 55

Ejercicio # 56

Figura I.24: Figura # 36

Figura # 37

### 37.– Distancia Tierra–Sol.

La distancia de la Tierra al Sol es difícil de estimar. Aristarco notó que cuando hay media Luna (es decir, se ve iluminada exactamente la mitad del disco lunar), los rayos del sol deben caer sobre la Luna perpendicularmente con respecto a la línea de visión del observador. En ese momento es posible medir el ángulo  $\alpha$  con que el Sol es visto desde la Tierra. Su valor es muy cercano al de un ángulo recto:  $90^\circ - \alpha \simeq 1^\circ$ .

(Aristarco, erróneamente, lo estimó en:  $90^\circ - \alpha \simeq 3^\circ$ ).

Use este resultado y la distancia Tierra–Luna, para estimar la distancia Tierra–Sol.

Estime, además, la rapidez (módulo de la velocidad) con que la tierra orbita alrededor del Sol.

### 38.– Nuevo método experimental para estimar la distancia Tierra–Luna.

Supongamos dos observadores A y B que están ubicados sobre el mismo meridiano terrestre y dispuestos de manera tal, que los rayos de luz provenientes de la Luna forman, tanto para A como B, un ángulo  $X$  con la vertical local, como se señala en la Figura.




Figura I.25: .

Para calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, debemos conocer el valor del ángulo  $Z$ . Una forma de obtenerlo es midiendo la distancia entre A y B sobre la superficie terrestre.

En la antigüedad, la determinación de esta distancia resultaba difícil, prefiriéndose el método siguiente: cada observador medía el ángulo que formaban los rayos provenientes de una estrella elegida previamente por ambos, y la vertical en el respectivo punto. Designando estos ángulos como  $u$  para A y  $v$  para B, se puede demostrar que  $Z = u + v$ .

Obtenga esta relación y justifique la suposición que los rayos que inciden en A son paralelos con los que inciden en B.

Ahora, suponiendo conocidos:  $R$ ,  $X$  y  $Z$ , calcule, en función de estas cantidades, la distancia Tierra-Luna medida desde el centro de la Tierra. Suponga que la Luna es un objeto puntual.

¿Por qué ambos observadores deben ubicarse en un meridiano en lugar de un paralelo, por ejemplo? Haga un diagrama para justificar su respuesta.

- 39.– Consiga una hoja de papel muy larga y con un grosor de  $0,1 \text{ mm}$  ( $10^{-4} \text{ m}$ ). Comience a doblarla por su mitad, de manera que en cada doblez el grosor aumenta al doble.

- ¿Cuántos **dobletes** son necesarios, para que el grosor final que adquiere, alcance a cubrir la distancia Tierra–Luna (aproximadamente 380.000 Km)?
- Antes de hacer el cálculo escoja alguna de las alternativas propuestas en la Tabla.
- a) 42 veces  
b) 1320 veces  
c) 483200 veces  
d) 639421 veces  
e)  $2,4 \cdot 10^8$  veces.

Ahora calcule y concluya cuánto puede confiar en su intuición.

40.– Estudie la siguiente situación: alrededor del Ecuador terrestre se construye un anillo metálico que calza en forma exacta, sin huelgo. A continuación se corta el anillo metálico en un punto y se le agrega un pedazo de anillo de 1 metro de longitud. Si al agregarle el nuevo pedazo, el anillo queda suspendido equidistante de la superficie terrestre a una altura  $h$ :

- a) Estime, sin calcular: ¿A qué altura queda el anillo?  
b) Haga el cálculo numérico y compare con su estimación.

41.– a) ¿Con qué rapidez puede Ud. lanzar una piedra?  
b) ¿Qué velocidad cree Ud. que alcanza una bala a la salida del cañón.  
En ambos casos, justifique cuantitativamente su estimación.

42.– a) Calcule *numéricamente* el valor de la siguiente serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{(k+1)!} = ?$$

**Indicación:**

Calcule esta suma con tres cifras significativas. Descarte los términos de la serie más pequeños que  $10^{-4}$  y al sumarlos aproxime la última cifra de modo que mantenga el mismo número de cifras significativas del comienzo.

Si sabe el mínimo de BASIC u otro lenguaje de programación... olvídense de estas instrucciones y haga que la máquina calcule.

- b) Recordando que  $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} x^k/k!$

Calcule *el valor exacto* de la serie propuesta en la parte a).

Se propone el siguiente método:

- 1) Escriba la serie correspondiente al número  $e = e^1$ .
- 2) A la serie propuesta en la primera parte, súme la serie

$$\sum_{k=0}^{\infty} 1/(k+1)! \quad \text{término a término.}$$

- 3) Relacione esta nueva serie con la del número  $e$ .

43.- Demuestre la siguiente igualdad trigonométrica:

$$\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{sen}(\alpha - \beta/2)} = \left( \cos \beta/2 + \frac{\operatorname{sen} \beta \cos^2(\alpha - \beta/2)}{\cos(\beta/2) \operatorname{sen}(2\alpha - \beta)} \right).$$

44.- En este ejercicio definiremos la *división entre números complejos*. Del texto, ya conocemos la multiplicación entre estos números. Por otro lado, sabemos que la división es la operación inversa de la multiplicación. Comencemos entonces por el inverso de un número complejo.

#### a) Inverso de un complejo

Dado un número complejo  $z = a + ib$ , el inverso, al que llamaremos  $z^{-1}$ , será aquel número (complejo) tal que:

$$z \bullet z^{-1} = z^{-1} \bullet z = 1. \quad \text{Esta operación es abeliana.}$$

¿Encuentre una expresión para  $z^{-1}$ , que cumpla la condición anterior y tenga la forma  $z^{-1} = c + id$ ?  $c$  y  $d$  son números reales y dependen sólo de los valores de  $a$  y  $b$ .

Compruébela para  $z = 1 + i \cdot 5$

#### b) División

Para dividir complejos sólo tenemos que multiplicar por el inverso del complejo con respecto al cual nos interesa dividir.

$$\text{Así: } \frac{z_1}{z_2} = z_1 \bullet z_2^{-1}$$

Dado  $z_1 = a + i \cdot b$  y  $z_2 = c + i \cdot d$ , demuestre que

$$\frac{z_1}{z_2} = (ac + bd)/(c^2 + d^2) + i \cdot (-ad + bc)/(c^2 + d^2)$$

45.- La Figura muestra un péndulo bifilar. Este péndulo puede oscilar girando en torno a un eje horizontal que pasa por los puntos de apoyo, o girar en torno a un eje *vertical* que pasa por el punto medio de la barra.

Suponga que la barra se gira en  $90^\circ$  con respecto a este eje vertical: calcule cuánto se elevó la barra verticalmente.



Figura I.26: .