IN3701 – Optimización
Auxiliar 4
16 de Abril de 2009

Problema 1

Dado el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \text{(p) max } & 2X_2 - X_1 \\ \text{s.a. } & 5X_2 - 3X_1 \leq 15 \\ & 4X_2 - X_1 \leq 20 \\ & 4X_2 + 7X_1 \leq 84 \\ & X_1, X_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Resuelva utilizando Simplex Matricial comenzando en el origen. Indique en el gráfico lo que está sucediendo en cada iteración (Interpretando variables básicas y no básicas).

Problema 2

Sea, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa, $S \in \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo y x^* un elemento de S . Suponga que x^* es un óptimo local para el problema de minimización $f(x)$ en S ; ie, Existe un $\varepsilon > 0$ tal que $f(x^*) \leq f(x) \forall x \in S$ que cumple $\|x - x^*\| \leq \varepsilon$. Pruebe que x^* es un óptimo global; esto es, $f(x^*) \leq f(x) \forall x \in S$.

Problema 3

Considere el problema de minimización $c^t x$ en el poliedro P , pruebe lo siguiente:

- Una solución factible x es óptima ssi $c^t d \geq 0$, para toda dirección factible d en x .
- Una solución factible x es la única solución óptima ssi $c^t d > 0$ para toda dirección factible $d \neq 0$ en x .

Problema 4

Sea x una solución básica factible asociada con alguna matriz B , pruebe que:

- Si el costo reducido de todas las variables no básicas es positivo, entonces x es la única solución óptima.
- Si x es la única solución y es no degenerada, entonces el costo reducido de todas las variables no básicas es positivo.

Pauta Auxiliar 4
16 de Abril de 2009

Problema 1

Primero se lleva al problema a la forma estándar:

$$\begin{aligned}
 (P^*) \quad & \min \quad -2X_2 + X_1 \\
 \text{s.a.} \quad & 5X_2 - 3X_1 + X_3 = 15 \\
 & 4X_2 - X_1 + X_4 = 20 \\
 & 4X_2 + 7X_1 + X_5 = 4 \\
 & X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \geq 0
 \end{aligned}$$

Comenzamos del origen, por lo que las variables no básicas son X_1 y X_2 . Las variables básicas son X_3 , X_4 y X_5 . Con lo anterior se tiene que:

$$\begin{aligned}
 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 R = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -1 & 4 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} & \Rightarrow \bar{R} = B^{-1} \cdot R = \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -1 & 4 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \\
 b = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 84 \end{pmatrix} & \Rightarrow \bar{b} = B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 84 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Vemos si el punto de partida es óptimo analizando los costos reducidos:

$$\begin{aligned}
 \bar{c}_R = c_R - c_B \cdot \bar{R} &= (1 \quad -2) - (0 \quad 0 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} -3 & 5 \\ -1 & 4 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} \\
 &\Rightarrow \bar{c}_R = (1 \quad -2)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ No estamos en el óptimo pues existen costos reducidos menores que cero.

Criterio de entrada a la base: Entra aquel con menores costos reducidos $\Rightarrow$ entra X_2 .

Criterio de salida de la base: $\min_{a_{is} \geq 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{a_{is}} \right\} = \min \left\{ \frac{15}{5} \quad \frac{20}{4} \quad \frac{84}{4} \right\} \Rightarrow$ sale X_3 .

Esto implica que las nuevas variables no básicas son X_1 y X_3 . Las variables básicas son X_2 , X_4 y X_5 . Con lo anterior se tiene que:

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ -4/5 & 1 & 0 \\ -4/5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 0 \\ 7 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{R} = B^{-1} \cdot R = \begin{pmatrix} -3/5 & 1/5 \\ 7/5 & -4/5 \\ 47/5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 84 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{b} = B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 81 \end{pmatrix}$$

Vemos si el punto es óptimo analizando los costos reducidos:

$$\bar{c}_R = c_R - c_B \cdot \bar{R} = (1 \ 0) - (-2 \ 0 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} -3/5 & 1/5 \\ 7/5 & -4/5 \\ 47/5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \bar{c}_R = (-1/5 \ 2/5)$$

$\Rightarrow$ No estamos en el óptimo pues existen costos reducidos menores que cero.

Criterio de entrada a la base: Entra aquel con menores costos reducidos $\Rightarrow$ entra X_1 .

Criterio de salida de la base: $\min_{a_{is} \geq 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{a_{is}} \right\} = \min \left\{ \frac{40}{7} \quad \frac{405}{47} \right\} \Rightarrow$ sale X_4 .

Esto implica que las nuevas variables no básicas son X_4 y X_3 . Las variables básicas son X_2 , X_1 y X_5 . Con lo anterior se tiene que:

$$B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 3/7 & 0 \\ -4/7 & 5/7 & 0 \\ 32/7 & -47/7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{R} = B^{-1} \cdot R = \begin{pmatrix} 3/7 & -1/7 \\ 5/7 & -4/7 \\ -47/7 & 32/7 \end{pmatrix}$$

$$b = \begin{pmatrix} 15 \\ 20 \\ 84 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{b} = B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 45/7 \\ 40/7 \\ 128/7 \end{pmatrix}$$

Vemos si el punto es óptimo analizando los costos reducidos:

$$\bar{c}_R = c_R - c_B \cdot \bar{R} = (0 \ 0) - (-2 \ 1 \ 0) \cdot \begin{pmatrix} 3/7 & -1/7 \\ 5/7 & -4/7 \\ -47/7 & 32/7 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \bar{c}_R = (1/7 \ 2/7)$$

$\Rightarrow$ Estamos en el óptimo.

Este es: $X_1 = 40/7$, $X_2 = 45/7$ y el valor de la función objetivo es $z = 50/7$

Lo importante a indicar gráficamente es que comienzan en el punto (0,0), se mueven al (0,3) y luego terminan en el (40/7,45/7). Estos valores los determinan las variables básicas y no básicas. Cuando una variable artificial sale de la base, quiere decir que se hace cero, y por tanto la restricción asociada a esa variable básica es activa y nos encontramos en el punto donde lo es.

Problema 2

$\forall b \in S, \exists a$ tal que $\|a - x^*\| \leq \varepsilon$

y $\exists \lambda$ tq $a = \lambda x^* + (1 - \lambda) b$

$\rightarrow S$ convexo

$f(x^*) \leq f(a)$

$\rightarrow x^*$ es óptimo local

$f(a) \leq \lambda f(x^*) + (1 - \lambda)f(b)$

$\rightarrow f$ es convexo

$\rightarrow f(x^*) \leq \lambda f(x^*) + (1 - \lambda)f(b)$

$\rightarrow f(x^*)(1 - \lambda) \leq (1 - \lambda)f(b)$

$\rightarrow f(x^*) \leq f(b)$

$\rightarrow x^*$ es óptimo global

Problemas 3 y 4 propuestos, se resolverán en la próxima auxiliar.