


Semana 3

Emilio Vilches & Felipe Serrano

Errores y sugerencias a evilches@dim.uchile.cl

P1. Dado el punto P de coordenadas (a, b) y la recta L de ecuación $y = mx$, determinar la ecuación de la recta que pasa por P y tal que el trazo que queda determinado por la intersección de ella con los ejes, queda dividido por L .

Solución



Sea λ la pendiente de L' , como $(a, b) \in L'$, se tiene que

$$(y - b) = \lambda(x - a)$$

Calculemos ahora las coordenadas de Q y de R .

(i)

$$x = 0 \quad y = b - \lambda a \quad Q = (0, b - \lambda a)$$

(ii)

$$y = 0 \quad x = a - \frac{b}{\lambda} \quad R = (a - \frac{b}{\lambda}, 0)$$

Ahora si L dimidia a QR , necesariamente S será el punto medio de QR . entonces

$$\frac{Q+R}{2} = S$$

luego

$$S = \frac{1}{2} \left(a - \frac{b}{\lambda}, b - \lambda a \right)$$

además $S \in L$, entonces si $S = (x_S, y_S)$ se tiene que $y_S = mx_S$, es decir:

$$b - \lambda a = m \left(a - \frac{b}{\lambda} \right)$$

la cual es una ecuación cuadrática en λ cuyas soluciones son, $\lambda_1 = -m$ y $\lambda_2 = \frac{b}{a}$ así finalmente


$$L': (y - b) = -m(x - a).$$

ó

$$L': (y - b) = \frac{b}{a}(x - a).$$

- P2.** Un triángulo ABC isósceles ($AC = BC$) y rectángulo en C , varía de tal manera que su vértice A permanece fijo en el origen del sistema de coordenadas y su vértice B se mueve sobre la recta de ecuación $x = a$. Determinar la ecuación del lugar geométrico que recorre el punto C y reconocer la figura que describe.

Solución



Consideremos los puntos $A = (0, 0)$, $B = (a, y_b)$, $C = (x_c, y_c)$. Como el triángulo es isósceles se tiene que $AC = BC$, luego

$$(x_c - 0)^2 + (y_c - 0)^2 = (x_c - a)^2 + (y_c - y_b)^2. \quad (1)$$

Por otro lado $AC \perp BC$, entonces si m_{AC} y m_{BC} son las pendientes de las rectas que pasan por AC y BC respectivamente, debe tenerse que

$$m_{AC} \cdot m_{BC} = -1.$$

y

$$m_{AC} = \frac{y_c - 0}{x_c - 0} = \frac{y_c}{x_c}$$

$$m_{BC} = \frac{y_c - y_b}{x_c - a}$$

por lo tanto

$$\frac{y_c(y_c - y_b)}{x_c(x_c - a)} = -1 \quad (2)$$

elevando (2) al cuadrado y reemplazando en (1) se obtiene

$$x_c^2 + y_c^2 = (x_c - a)^2 + \frac{x_c^2}{y_c^2}(x_c - a)^2$$

$$y_c^2 = (x_c - a)^2$$

y así


$$y_c = (x_c - a)$$

$$y_c = -(x_c - a)$$

es decir el lugar geométrico que recorre el punto C , son dos rectas perpendiculares.

- P3.** Dados el punto $P = (a, b)$ y la recta $L : y = mx$, se trazan PH perpendicular a OX y PK perpendicular a L . Si D es el punto medio de OP y M es el punto medio de HK Probar que DM es perpendicular a HK y $DK = DH$.

Solución



Sea $K = (x_0, my_0)$, por hipótesis tenemos que:

$$P = (a, b) \quad D = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) \quad M = \left(\frac{a+x_0}{2}, \frac{mx_0}{2}\right)$$

Probemos que $DM \perp HK$:

$$m_{PK} = \frac{mx_0 - b}{x_0 - a}$$

como $PK \perp L$ se tiene que

$$\frac{m \cdot (mx_0 - b)}{x_0 - a} = -1 \quad (3)$$

por otro lado

$$m_{HK} = \frac{mx_0}{x_0 - a}$$

y

$$m_{PM} = \frac{\frac{mx_0}{2} - \frac{b}{2}}{\frac{a+x_0}{2} - \frac{a}{2}} = \frac{mx_0 - a}{x_0}$$

entonces

$$\begin{aligned} m_{HK} \cdot m_{DM} &= \frac{mx_0 - b}{x_0} \cdot \frac{mx_0}{x_0 - a} \\ &= \frac{m(mx_0 - b)}{x_0} \\ &= -1 \end{aligned} \quad \text{por (3)}$$

por lo tanto $HK \perp DM$.

Probemos ahora que $DM = DH$:

$$\begin{aligned} d_{DH}^2 &= \left(\frac{a}{2} - a\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - 0\right)^2 \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} d_{DK}^2 &= \left(\frac{a}{2} - x_0\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - mx_0\right)^2 \\ &= \frac{a^2}{4} - ax_0 + x_0^2 + \frac{b^2}{4} - bmx_0 + m^2x_0^2 \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + x_0^2 - ax_0 - bmx_0 + m^2x_0^2 \end{aligned}$$


pero por (3) $m(mx_0 - b) = -x_0 + a$, entonces

$$\begin{aligned} d_{DK}^2 &= \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + x_0(x_0 - a) + x_0m(mx_0 - b) \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + x_0 \underbrace{(m(mx_0 - b) + x_0 - a)}_{=0} \\ &= \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} \\ &= d_{DH}^2 \end{aligned}$$

por lo tanto $DK = DH$.

P4. Dos rectas variables L_1 y L_2 que pasan, respectivamente por dos puntos fijos A y B se cortan perpendicularmente en el punto P . Determinar el lugar geométrico de P .

Solución



Sean $A = (a, b)$, $B = (c, d)$, luego

$$L_1 : y - b = m_1(x - a)$$

$$L_2 : y - d = m_2(x - c)$$

(i) si $x = a$, entonces $P = (a, b)$.

(ii) si $x = c$, entonces $P = (c, d)$.

(iii) si $x \neq a$ y $x \neq c$;

$$m_1 = \frac{y - b}{x - a}$$

$$m_2 = \frac{y - d}{x - c}$$

como $L_1 \perp L_2$ se cumple que $m_1 \cdot m_2 = -1$, es decir

$$\frac{(y - b)(y - d)}{(x - a)(x - c)} = -1 \quad (4)$$

desarrollando esta ecuación se obtiene

$$(y - \frac{(b+d)}{2})^2 + (x - \frac{(a+c)}{2})^2 = \frac{(b-d)^2}{4} + \frac{(a-c)^2}{4}.$$

que corresponde a una circunferencia de centro

$$C = (\frac{b+d}{2}, \frac{a+c}{2})$$

y radio

$$r = \sqrt{\frac{(b-d)^2}{4} + \frac{(a-c)^2}{4}}$$

Observación: Notar que C es el punto medio entre A y B , y $r = d_{AB}$.