Capítulo 1: Fundamentos: Lógica y Demostraciones

Clase 3: Relaciones, Funciones, y Notación Asintótica

Matemática Discreta - CC3101
Profesor: Pablo Barceló

Sean A y B conjuntos. Una **relación** entre A y B es un subconjunto de $A \times B$.

O en otros términos, es un conjunto R de pares (a, b) tal que $a \in A$ y $b \in B$.

Ejemplo: Sea C el conjunto de ciudades de Chile, y D el conjunto de regiones de Chile.

Entonces, la relación **está_en** contiene todos los pares $(c, d) \in C \times D$ tal que la ciudad c está en la región d .

Relación sobre un conjunto

Si A es un conjunto, entonces **una relación en A** es una relación entre A y A .

Ejemplo: Las siguiente son relaciones en $\mathbb{N}$

$$\{(a, b) \mid a \leq b\}, \quad \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$$

Ejercicio: ¿Cuántas relaciones existen en un conjunto con n elementos?

Propiedades de las relaciones

Una relación R en un conjunto A es:

- ▶ **refleja:** $(a, a) \in R$, para todo $a \in A$;
- ▶ **simétrica:** $(a, b) \in R$ implica $(b, a) \in R$, para todo $a, b \in A$;
- ▶ **antisimétrica:** $(a, b) \in R$ y $(b, a) \in R$ implica $a = b$, para todo $a, b \in A$;
- ▶ **transitiva:** $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$ implica $(a, c) \in R$, para todo $a, b, c \in A$.

Ejercicio: Expresé estas propiedades en lógica de predicados.

Ejercicio: Estudie algunas relaciones en $\mathbb{N}$ con respecto a cuáles de estas propiedades satisfacen.

Típicas operaciones en relaciones:

- ▶ **unión:** $R \cup R'$;
- ▶ **intersección:** $R \cap R'$;
- ▶ **diferencia:** $R - R'$;
- ▶ **inverso:** R^{-1} ;
- ▶ **composición:** $R \circ R' = \{(a, c) \mid (a, b) \in R, (b, c) \in R'\}$.

Sea R relación en A . Definimos R^n , $n \geq 1$, como sigue:

$$R^1 = R \quad \text{y} \quad R^{n+1} = R^n \circ R$$

Ejercicio: Demuestre que la relación R en A es transitiva si y sólo si $R^n \subseteq R$, para cualquier $n \geq 1$.

Ejercicio: Demuestre que R es simétrica si y sólo si $R = R^{-1}$.

Ejercicio: Sea R simétrica. Demuestre que R^n es simétrica, para todo $n \geq 1$.

Ejercicios

Ejercicio: Demuestre que la relación R en A es transitiva si y sólo si $R^n \subseteq R$, para cualquier $n \geq 1$.

Ejercicio: Demuestre que R es simétrica si y sólo si $R = R^{-1}$.

Ejercicio: Sea R simétrica. Demuestre que R^n es simétrica, para todo $n \geq 1$.

Pregunta: ¿En qué área de la computación las relaciones son de particular importancia?

La **clausura transitiva** R^* de R es la menor relación R' que contiene a R y tal que R' es transitiva.

Equivalentemente podríamos definir las clausuras **refleja** y **simétrica** de R .

Ejemplo: La clausura transitiva de la relación de sucesor en los números naturales es la relación de orden.

La clausura refleja de la relación $<$ en los números naturales es la relación $\leq$.

Clausura transitiva

Intuitivamente, $(a, b) \in R^*$ si y sólo si existen elementos $a_1, \dots, a_n \in A$, tal que

$$(a, a_1), (a_1, a_2), \dots, (a_{n-1}, a_n), (a_n, b)$$

es una secuencia de pares en R .

Si representamos R como un grafo, entonces R^* contiene todos aquellos pares (a, b) tal que existe **camino** desde a hasta b en ese grafo.

Ejercicio: Demuestre que si A tiene n elementos, entonces $R^* = \bigcup_{1 \leq i \leq n} R^i$.

Relaciones de equivalencia

Una relación R en A es de **equivalencia** si es refleja, simétrica, y transitiva.

Ejemplo: Sea $p \geq 2$. Entonces la relación $\equiv_p$ de congruencia módulo p es una relación de equivalencia.

► Recuerde que $a \equiv_p b \Leftrightarrow p \text{ divide } (a - b)$.

Ejercicio: Sea R una relación simétrica y transitiva, tal que para cada $a \in A$ existe $b \in A$ tal que $(a, b) \in R$. Demuestre que R es de equivalencia.

Clases de equivalencia

Para $a \in A$, denotamos por $[a]_R$ a la **clase de equivalencia** de a con respecto a la relación de equivalencia R . Esta se define como $\{b \mid (a, b) \in R\}$.

Ejemplo: $[1]_{\equiv_p} = \{1, 1 + p, 1 + 2p, 1 + 3p, \dots\}$.

Ejercicio: Demuestre que los siguientes enunciados son equivalentes:

- ▶ $(a, b) \in R$;
- ▶ $[a]_R = [b]_R$;
- ▶ $[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$.

Ejercicio: Demuestre que $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$.

Ordenes parciales

Una relación R en A es un **orden parcial** si es reflexiva, antisimétrica, y transitiva.

Ejemplo: $\leq$ es un orden parcial en $\mathbb{N}$.

Ejercicio: Demuestre que la relación de divisibilidad es un orden parcial en $\mathbb{N} \setminus 0$.

Ejercicio: Demuestre que $\subseteq$ es un orden parcial en 2^S , para cualquier conjunto S .

Comúnmente denotamos los ordenes parciales como $(A, \preceq)$.

Ordenes totales

Un orden parcial $(A, \preceq)$ es, además, **total** si para cada $a, b \in A$ se tiene que $a \preceq b$ o $b \preceq a$.

Ejemplo: $(\mathbb{Z}, \leq)$ es un orden total.

Sea $(A, \preceq)$ un orden total. Decimos que $\preceq$ es un **buen orden** en A , si cada $A' \subseteq A$ tiene un menor elemento con respecto a $\preceq$.

Ejemplo: La relación $\leq$ en $(\mathbb{Z}, \leq)$ no es un buen orden.

Ejercicio: Demuestre que la relación $\preceq$ en $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$ definida por

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) \Leftrightarrow a_1 < b_1, \text{ o } a_1 = b_1 \text{ y } a_2 \leq b_2,$$

es un buen orden en $\mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+$.

Inducción

Demuestre el siguiente teorema:

Teorema (Inducción bien ordenada): Sea A un conjunto que tiene un buen orden $\preceq$. Entonces la propiedad P es cierta para todo elemento $a \in A$, si:

Inducción: Para todo $b \in A$, si P es cierto para todo $a \in A$ tal que $a \preceq b$ pero $a \neq b$, entonces P es cierto en b .

Este resultado justifica la utilización del método inductivo en los naturales.

Y además explica porque no podemos utilizar el mismo método en los enteros.

Una **función** entre A y B es una relación R entre A y B , tal que:

- ▶ Para todo $a \in A$ existe $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$;
- ▶ para todo $a \in A$, si $(a, b) \in R$ y $(a, b') \in R$, entonces $b = b'$;

Escribimos $f : A \rightarrow B$ para denotar a una función, y $f(a) = b$ para denotar que el par (a, b) está en la relación que representa a la función.

El **dominio** de f es A , y su **codominio** es B .

Si $f(a) = b$ decimos que b es la **imagen** de a , y a la **preimagen** de b .

El **rango** de f es el conjunto $\{b \in B \mid f(a) = b, \text{ para algún } a \in A\}$.

Funciones uno-a-uno y sobre

Una función $f : A \rightarrow B$ es:

- ▶ **Uno-a-uno o inyectiva:** si para todo $a, b \in A$, $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$;
- ▶ **Sobre o sobreyectiva:** si para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$;
- ▶ **Biyectiva:** si es uno-a-uno y sobre.

Ejemplo:

- ▶ La función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(n) = 2n$ es uno-a-uno, pero no es sobre.
- ▶ La función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(0) = 1$ y $f(n) = n - 1$, para todo $n > 0$, es sobre pero no uno-a-uno.

Funciones inversas

Sea $f : A \rightarrow B$ una función biyectiva. Entonces la función **inversa** $f^{-1} : B \rightarrow A$ se define como $f^{-1}(b) = a \leftrightarrow f(a) = b$.

Pregunta: ¿Por qué pedimos que f sea biyectiva?

Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow C$. La **composición** de g y f , denotada por $g \circ f$, es una función de A en C tal que $(g \circ f)(a) = g(f(a))$.

Nota: $f^{-1} \circ f$ es la función identidad, asumiendo que f es biyectiva.

Ejercicio: ¿Es cierto que si f y $f \circ g$ son uno-a-uno, entonces g es uno-a-uno?

Ejercicio: Lo mismo para funciones sobre.

Funciones importantes

La función **techo** asigna a cada número real x el valor $\lceil x \rceil$ del menor entero y tal que $x \leq y$.

La función **piso** asigna a cada número real x el valor $\lfloor x \rfloor$ del mayor entero y tal que $x \geq y$.

La función **factorial** asigna a cada número natural n el producto $n!$ de los primeros n enteros positivos (asumimos que $0! = 1$).

Ejercicio: Demuestre que para todo número real x y entero n ,
 $\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.

Ejercicio: Demuestre que para todo número real x ,
 $\lfloor 2x \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor$.

Ejercicio: Demuestre que para todo número real x ,
 $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$.

Crecimiento de funciones

Describimos el crecimiento de funciones utilizando la notación O .

Sean f y g definidas desde $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

Decimos que $f(x)$ es $O(g(x))$ si existen constantes c y k tal que

$$f(x) \leq c \cdot g(x), \quad \text{para todo } x > k.$$

Ejercicio: Demuestre que $f(x) = x^2 + 2x + 1$ es $O(x^2)$.

Ejercicio: En general, demuestre que todo polinomio de grado n con coeficientes reales es $O(x^n)$.

Ejercicio: Demuestre que no existe polinomio de grado $n > 1$ que sea $O(x^{n-1})$.

Ejercicio: Utilice la notación O para estimar el tamaño de $\sum_{i=1}^n i$ y de $n!$.

Crecimiento de funciones combinadas

Si tenemos un algoritmo que se compone de dos subprocedimientos, ¿cómo podemos estimar la complejidad de tal algoritmo?

Teorema

Si f_1 es $O(g_1(x))$ y f_2 es $O(g_2(x))$, entonces

- ▶ $f_1(x) + f_2(x)$ es $O(\max\{g_1(x), g_2(x)\})$.
- ▶ $f_1(x) \cdot f_2(x)$ es $O(g_1(x) \cdot g_2(x))$.

Ejercicio: Demuestre el teorema.

Ejercicio: Encuentre una (buena) estimación del crecimiento de la función $(x + 1) \log(x^2 + 1) + 3x^2$.

Decimos que $f(x)$ es $\Omega(g(x))$ si y sólo si $g(x)$ es $O(f(x))$.

Decimos que $f(x)$ es $\Theta(g(x))$ (o $f(x)$ es de orden $g(x)$), si y sólo si $f(x)$ es $O(g(x))$ y $g(x)$ es $O(f(x))$.

Ejercicio: Demuestre que $n \log n$ es $\Theta(\log n!)$.