

Clase Auxiliar FI2001 Mecánica

Profesor: Claudio Romero

Auxiliar: Francisco Sepúlveda & Sergio Godoy

22/Septiembre/2009

P1. Considere una partícula de masa m que se mueve en un campo de fuerza de atracción central $\vec{F} = -c\hat{r}$, donde c es una constante positiva (note que la magnitud de la fuerza es constante).

a) Demuestre que la partícula no puede escapar de este campo de atracción.

b) Si se verifica que la partícula se encuentra en una órbita circular de radio $r = r_o$, determine el período de pequeñas oscilaciones que experimenta la distancia entre la partícula y el centro de atracción cuando la partícula sufre una pequeña perturbación radial.

c) Suponga que la partícula se encuentra en la órbita circunferencial de la parte (b) y, como resultado de un impulso radial, en dirección opuesta al centro de atracción, la partícula queda en una órbita tal que su distancia máxima al centro de atracción es $2r_o$. Determine cuánto aumenta la energía mecánica total de la partícula como resultado de este impulso.

Respuestas:

(Jamás asumir que están exentas de errores.)

$$\mathbf{P1:} \text{ b) } T_{o.p.} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{3c}{mr_o}}}; \text{ c) } \Delta E = \frac{5}{8}cr_o$$