

III. TÉCNICAS DE MUESTREO

MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS (1)

Dos aspectos básicos de la inferencia estadística, no vistos aún:

- ▣ Proceso de selección de la muestra → Métodos de muestreo
- ▣ Tamaño adecuado en poblaciones finitas → Fiabilidad y coste

ETAPAS EN UN ESTUDIO DE MUESTREO:

1. Definir la información que se necesita → fundamental *versus* accesorio
2. Determinar correctamente la población objeto del estudio → listado
3. Método de muestreo a seguir y tamaño de la muestra:
 - 3.1 El método depende del problema y de los recursos disponibles
 - 3.2 El tamaño depende de la fiabilidad requerida y del costo
4. Diseño adecuado de la forma de obtener la información. Objetivo:
 - 4.2 Evitar falta de respuesta → forma encuesta, nº preguntas
 - 4.3 Respuestas honestas y precisas → cuestionario y entrevista
5. Uso de la muestra para hacer inferencia
6. Obtener conclusiones acerca de la población

MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS (2)

TIPOS DE ERRORES:

- ▣ Debidos al muestreo → incertidumbre (nivel significación, etc.)
- ▣ Ajenos al muestreo:
 1. Definición incorrecta de la población
 2. Respuestas falsas o imprecisas
 3. Falta de respuesta → posible sesgo
 4. Sesgo en la selección elementos muestrales
 5. Errores de manipulación, tabulación y cálculo

No hay un criterio general para evitarlos y/o analizarlos → minimizarlos

MUESTREO EN POBLACIONES FINITAS (3)

MÉTODOS DE MUESTREO:

- Muestreo aleatorio:
 - a) unidad muestral elemental:
 - a.1) muestreo aleatorio simple
 - a.2) muestreo aleatorio sistemático
 - a.3) muestreo aleatorio estratificado
 - b) unidad muestral grupo:
 - b.1) muestreo por áreas y conglomerados
 - b.2) muestreo por etapas
- Muestreo no aleatorio y semialeatorio (en general, no “científico”; no estudia precisión):
 - por cuotas
 - opinático o de intención

MÉTODOS DE MUESTREO (1)

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE:

- ▣ Sirve de base a los demás métodos
- ▣ Es el más sencillo desde el punto de vista teórico
- ▣ Todos los elementos muestrales se tratan como iguales y se identifican mediante un número (tarjeta, bola, números aleatorios, etc...)

Elemento muestral	Identificador
A	1
B	2
..	..

- ▣ La selección es sin reposición
- ▣ Todas las muestras posibles son igualmente probables
- ▣ Cuando N es muy grande su coste es muy alto

MÉTODOS DE MUESTREO (2)

MUESTREO ALEATORIO SISTEMÁTICO:

- Se necesita un listado ordenado de los elementos de la población
- El orden no debe ser un factor distorsionante de la aleatoriedad:
 - No distorsionante: listas de clase para notas (no sesgo)
 - Sí puede generar sesgo: producción mensual empresa
- Se selecciona al azar el primer elemento muestral (k) menor que $p=N/n$
- Elegido este, los demás se obtienen sumándole p al anterior: $k+p, k+2p, \dots$
- El método garantiza que aparezcan elementos de todas las clases, por lo que puede generar muestras más representativas que el muestreo aleatorio simple

MÉTODOS DE MUESTREO (3)

MUESTREO ESTRATIFICADO:

- En ocasiones es indispensable agrupar los elementos de la población en clases o estratos (homogeneidad de sus elementos; heterogeneidad entre estratos) → mejor información, reduce errores y costes.
- Dentro de cada estrato se aplicará un muestreo aleatorio simple o sistemático

MUESTREO POR CONGLOMERADOS:

- Conglomerado: es un grupo de elementos de la población (familias, hogares, casas, edificios, municipios, provincias, empresas, etc.)
- La unidad de muestreo es el conglomerado → a veces, áreas geográficas
- Se seleccionan aleatoriamente cierto número de conglomerados y se investigan, a continuación, todos los elementos pertenecientes a ellos
- Características: homogeneidad entre conglomerados; heterogeneidad dentro de cada conglomerado → representar las clases de la población
- Se reduce problema de listado, no es necesario saber tamaño población, entrevistas dentro del grupo (conglomerado) → menos costoso

MÉTODOS DE MUESTREO (4)

MUESTREO ALEATORIO POR ETAPAS:

- ▣ Generalización del muestreo por conglomerados
- ▣ Suele hacerse descendiendo de conglomerados más grandes a más pequeños:

Región → Comuna → Manzana → Edificio → Familia (listados)

- ▣ En cada etapa se aplica el muestreo aleatorio, sistemático o estratificado
- ▣ Objetivo: Reducir al mínimo el coste

INFERENCIA CON MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (1)

INFERENCIA SOBRE LA MEDIA (μ):

- Estimación por puntos: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
- Estimación por intervalos: $\mu \in (\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\bar{x}})$, por desconocerse $\sigma_{\bar{x}}^2$
 1. En poblaciones finitas: $\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right) \rightarrow$ factor de corrección
 2. Como σ^2 es desconocida se estima mediante su estimador insesgado que es $\hat{s}^2 \frac{N-1}{N}$ y, por tanto, $\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2 = \frac{\hat{s}^2}{n} \frac{N-n}{N}$
 3. Para utilizar la normal, n será suficientemente grande.
 4. Si n es pequeña y se supone normalidad $\rightarrow t$ de *Student*

INFERENCIA CON MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (2)

INFERENCIA SOBRE EL TOTAL ($N\mu$):

- Estimación por puntos: $N\bar{x}$
- Estimación por intervalos: $N\mu \in (N\bar{x} \pm z_{\alpha/2} N\hat{\sigma}_{\bar{x}})$

$$Var(N\bar{x}) = N^2 \sigma_{\bar{x}}^2 \rightarrow N^2 \hat{\sigma}_{\bar{x}}^2 = N^2 \frac{\hat{s}^2}{n} \frac{N-n}{N} = \frac{\hat{s}^2}{n} N(N-n)$$

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN (p):

- Estimación por puntos: $\hat{p} = \frac{x}{n}$, $x = n^\circ$ observaciones características en n
- Estimación por intervalos: $p \in (\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{p}})$

$$\hat{\sigma}_{\hat{p}}^2 = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1} \frac{N-n}{N}$$

TAMAÑO MUESTRAL CON MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (1)

Para la estimación de la MEDIA:

- Al dar $\bar{x}$ por μ , el error máximo permitido para un nivel de confianza del 100(1- α)% será: $\varepsilon = |z_{\alpha/2}| \sigma_{\bar{x}} \quad | <-----\varepsilon-----\mu-----\varepsilon-----> |$
- Fijado este error y el nivel de significación, se fija, también, la varianza máxima del estadístico muestral: $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\varepsilon}{|z_{\alpha/2}|} \rightarrow$ Recordemos: $\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$
- Despejando de esta última expresión (o del cuadrado de la primera):

$$n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)\sigma_{\bar{x}}^2 + \sigma^2} = \frac{Nz_{\alpha/2}^2\sigma^2}{(N-1)\varepsilon^2 + z_{\alpha/2}^2\sigma^2} \rightarrow \sigma \text{ por encuesta piloto o anterior}$$

TAMAÑO MUESTRAL CON MUESTREO ALEATORIO SIMPLE (2)

- Para la estimación del TOTAL (va a ser igual que para la media):

- Recordemos que $Var(N\bar{x}) = N^2\sigma_{\bar{x}}^2 \rightarrow N^2\sigma_{\bar{x}}^2 = N^2 \frac{\sigma^2}{n} \frac{N-n}{N-1}$.

Se llega al mismo resultado: $n = \frac{N\sigma^2}{(N-1)\sigma_x^2 + \sigma^2} = \frac{Nz_{\alpha/2}^2\sigma^2}{(N-1)\varepsilon^2 + z_{\alpha/2}^2\sigma^2}$

- Para la estimación de la PROPORCIÓN:

- En poblaciones finitas: $\sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{pq}{n} \frac{N-n}{N-1}$. Despejando, se obtiene:

$n = \frac{Npq}{(N-1)\sigma_{\hat{p}}^2 + pq} = \frac{Nz_{\alpha/2}^2 pq}{(N-1)\varepsilon^2 + z_{\alpha/2}^2 pq}$. Como p no se conoce, se estima o se

calcula el tamaño muestral máximo $\rightarrow n_{max} = \frac{0,25N}{(N-1)\sigma_{\hat{p}}^2 + 0,25}$, con $\sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{\varepsilon^2}{z_{\alpha/2}^2}$

INFERENCIA CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (1)

INFERENCIA SOBRE LA MEDIA:

- Población dividida en K estratos: $N_1 + N_2 + \dots + N_K = N$
- Tamaños muestrales de los estratos: $n_1 + n_2 + \dots + n_K = n$
- Medias poblacionales de los estratos: $\mu_1 \quad \mu_2 \quad \dots \quad \mu_K$
- Medias muestrales de los estratos: $\bar{x}_1 \quad \bar{x}_2 \quad \dots \quad \bar{x}_K$

Puesto que en cada estrato se hace un muestreo aleatorio simple:

- Estimadores insesgados de las medias poblacionales (μ_i): $\bar{x}_i$
- Estimadores insesgados de la variancia de $\bar{x}_i$: $\hat{\sigma}_{\bar{x}_i}^2 = \frac{\hat{s}_i^2}{n_i} \frac{N_i - n_i}{N_i}$
- Estimación por puntos de $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i \mu_i \rightarrow \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i \bar{x}_i$
- Estimación por intervalos: $\mu \in (\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\bar{x}})$, con $\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^K N_i^2 \hat{\sigma}_{\bar{x}_i}^2$

INFERENCIA CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (2)

INFERENCIA SOBRE EL TOTAL:

□ Estimación por puntos de $N\mu = \sum_{i=1}^K N_i \mu_i :$ $N\bar{x} = \sum_{i=1}^K N_i \bar{x}_i$

□ Estimación por intervalos: $N\mu \in (N\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{N\bar{x}})$

Con $N\bar{x} = \sum_{i=1}^K N_i \bar{x}_i$ y $\hat{\sigma}_{N\bar{x}}^2 = \sum_{i=1}^K N_i^2 \hat{\sigma}_{\bar{x}_i}^2$

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN:

□ Proporciones poblacionales de los estratos: $p_1 \ p_2 \ \dots \ p_k$

□ Proporciones muestrales de los estratos: $\hat{p}_1 \ \hat{p}_2 \ \dots \ \hat{p}_K$

□ Estimación por puntos de $p = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i p_i :$ $\hat{p} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i \hat{p}_i$

□ Estimación por intervalos: $p \in (\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sigma_{\hat{p}})$

Con $\hat{\sigma}_{\hat{p}}^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^K N_i^2 \hat{\sigma}_{\hat{p}_i}^2$ y $\hat{\sigma}_{\hat{p}_i}^2 = \frac{\hat{p}_i(1-\hat{p}_i)}{n_i-1} \frac{N_i-n_i}{N_i}$

INFERENCIA CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (3)

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA ENTRE ESTRATOS:

- No hay una respuesta única; depende de los objetivos de la encuesta
- Criterios de asignación (*afijación*):

1. Uniforme: todos igual; poco sentido real.

2. Proporcional: La proporción de elementos de la población en cada estrato se aplica a la muestra:

$$\frac{N_i}{N} = \frac{n_i}{n} \rightarrow n_i = \frac{N_i}{N} n$$

3. Óptima: Pondera el criterio anterior con las varianzas de los respectivos estratos, asignando más observaciones a los estratos con mayor variancia poblacional. Es el más deseable si el objetivo único es la precisión en la estimación:

$$\text{Media y Total: } n_i = \frac{N_i \sigma_i}{\sum_{i=1}^k N_i \sigma_i} n \quad ; \quad \text{Proporción: } n_i = \frac{N_i \sqrt{p_i q_i}}{\sum_{i=1}^k N_i \sqrt{p_i q_i}} n$$

(al ser σ desconocida, muestreo preliminar y n_{max})

TAMAÑO MUESTRAL CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (1)

MEDIA Y TOTAL:

▣ Asig. Proporcional ($n_i = \frac{N_i}{N} n$):

$$n = \frac{\sum_{i=1}^K N_i \sigma_i^2}{N \sigma_{\bar{x}}^2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i \sigma_i^2} ; \text{ con } \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\varepsilon^2}{z_{\alpha/2}^2}$$

▣ Asig. Óptima ($n_i = \frac{N_i \sigma_i}{\sum_{i=1}^K N_i \sigma_i} n$):

$$n = \frac{\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^K N_i \sigma_i \right)^2}{N \sigma_{\bar{x}}^2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i \sigma_i^2} ; \text{ con } \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{\varepsilon^2}{z_{\alpha/2}^2}$$

TAMAÑO MUESTRAL CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (2)

PROPORCIÓN:

▣ Asig. Proporcional ($n_i = \frac{N_i}{N} n$):

$$n = \frac{\sum_{i=1}^K N_i p_i q_i}{N \sigma_{\hat{p}}^2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i p_i q_i}; \text{ con } \sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{\varepsilon^2}{z_{\alpha/2}^2}$$

▣ Asig. Óptima ($n_i = \frac{N_i \sigma_i}{\sum_{i=1}^K N_i \sigma_i} n$):

$$n = \frac{\frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^K N_i \sqrt{p_i q_i} \right)^2}{N \sigma_{\hat{p}}^2 + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K N_i p_i q_i}; \text{ con } \sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{\varepsilon^2}{z_{\alpha/2}^2}$$

TAMAÑO MUESTRAL CON MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO (4)

Ejemplo: Muestreo Estratificado con Asignación Proporcional.

Suponga que los 5000 agricultores están divididos de la siguiente manera:

Valle costero = 2500

Valle depresión media = 1500

Valle andino = 1000

Una muestra de 50 agricultores, seleccionada desde los 3 estratos con asignación proporcional daría los siguientes tamaños de muestra:

Valle costero = 25

Valle depresión media = 15

Valle andino = 10

MUESTREO POR CONGLOMERADOS (1)

En algunos casos, el muestreo aleatorio simple puede resultar muy costoso (v.g. si se quiere muestrear una gran ciudad, una muestra aleatoria simple de tamaño n implicaría mandar a los encuestadores a n puntos distintos), o inaplicable si no se cuenta con el marco muestral.

En esta situación es más económico realizar el denominado muestreo por conglomerados.

A diferencia de la formación de estratos, en este caso se trata que los elementos dentro de un conglomerado sean heterogéneos, y los conglomerados homogéneos entre sí.

MUESTREO POR CONGLOMERADOS (2)

En un muestreo por conglomerados, se debe tener en cuenta los siguientes factores para el cálculo de los estimadores:

- El muestreo por conglomerados puede ser polietápico.
- Dentro de un conglomerado se pueden tomar todas las unidades (última etapa) o una muestra de ellas (penúltima etapa).
- El muestreo de conglomerados o sus sub-unidades (en cualquiera de sus etapas) puede efectuarse por muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático o muestreo estratificado.

Ejemplo: Muestreo por conglomerados en 3 etapas.

Si se desea obtener una muestra de 600 viviendas de una ciudad, el muestreo aleatorio simple implicaría enviar a los encuestadores a 600 lugares distintos de la ciudad. Un muestreo por conglomerados podría consistir en seleccionar aleatoriamente 20 zonas (conjuntos de manzanas) de la ciudad, luego seleccionar 10 manzanas de cada zona y por último seleccionar 3 viviendas de cada manzana. De hecho el muestreo aleatorio simple cubrirá mejor la ciudad que el muestreo por conglomerados, pero a un mayor costo.

INFERENCIA CON MUESTREO POR CONGLOMERADOS EN DOS ETAPAS (1)

INFERENCIA SOBRE LA MEDIA (μ):

N : número de conglomerados en la población.

n : número de conglomerados seleccionados en un M.A.S.

M_i : número de unidades en el conglomerado i .

m_i : número de unidades seleccionadas en un M.A.S. del conglomerado i .

$\bar{M} = \frac{M}{N}$: tamaño de conglomerado promedio para la población.

x_{ij} : j -ésima observación en la muestra del i -ésimo conglomerado.

$\bar{y}_i = \frac{1}{m_i} \sum_{j=1}^{m_i} y_{ij}$: media muestral del i -ésimo conglomerado

□ Estimación insesgada puntual: $\hat{\mu} = \left(\frac{N}{M} \right) \frac{\sum_{i=1}^n M_i \bar{y}_i}{n}$

INFERENCIA CON MUESTREO POR CONGLOMERADOS EN DOS ETAPAS (2)

□ Varianza estimada de $\hat{\mu}$:
$$\hat{V}(\hat{\mu}) = \left(\frac{N-n}{N} \right) \left(\frac{1}{n\bar{M}^2} \right) s_b^2 + \frac{1}{nN\bar{M}^2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \left(\frac{M_i - m_i}{M_i} \right) \left(\frac{s_i^2}{m_i} \right)$$

donde
$$s_b^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (M_i \bar{y}_i - \bar{M} \hat{\mu})^2}{n-1} \quad \text{y} \quad s_i^2 = \frac{\sum_{j=1}^{m_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{m_i - 1} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

INFERENCIA SOBRE EL TOTAL:

□ Estimación insesgada puntual:
$$\hat{\tau} = M\hat{\mu} = N \frac{\sum_{i=1}^n M_i \bar{y}_i}{n}$$

□ Varianza estimada de $\hat{\tau}$:
$$\hat{V}(\hat{\tau}) = M^2 \hat{V}(\hat{\mu}) = \left(\frac{N-n}{N} \right) \left(\frac{N^2}{n} \right) s_b^2 + \frac{N}{n} \sum_{i=1}^n M_i^2 \left(\frac{M_i - m_i}{M_i} \right) \left(\frac{s_i^2}{m_i} \right)$$

INFERENCIA CON MUESTREO POR CONGLOMERADOS EN DOS ETAPAS (3)

INFERENCIA SOBRE LA PROPORCIÓN:

□ Estimación puntual:
$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n M_i \hat{p}_i}{\sum_{i=1}^n M_i}$$

□ Varianza estimada de $\hat{p}$:
$$\hat{V}(\hat{p}) = \left(\frac{N-n}{N} \right) \left(\frac{1}{n\bar{M}^2} \right) s_r^2 + \frac{1}{nN\bar{M}^2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \left(\frac{M_i - m_i}{M_i} \right) \frac{\hat{p}_i(1 - \hat{p}_i)}{m_i}$$

donde
$$s_r^2 = \frac{\sum_{i=1}^n M_i^2 (\hat{p}_i - \hat{p})^2}{n-1}$$