CAPITULO 8

CLONAMIENTO

- CONSTRUCCION DE GENOTECAS**
- CLONAMIENTO DE GENES**
- CARACTERIZACION DE CLONES**

Bibliografía

Para esta parte

Recombinant DNA

Watson JD, Gilman M, Witkowski JA , Zoller MJ

3° Edición (2007)

2° Edición

GENOTECA

Conjunto o colección de vectores recombinantes:

TIPOS DE GENOTECAS

Según la naturaleza del DNA foráneo que portan los vectores

- **DNA genómico (cromosómico)**
El conjunto de recombinantes representa el genoma (cromosoma) completo de un individuo. Incluye DNA codificante y DNA no codificante
- **De cDNA**
El conjunto de recombinantes representa sólo los genes expresados por un tipo celular o tejido, en una determinada circunstancia.

Genotecas de expresión (de uso restringido)

Los vectores permiten expresar la información genética "foránea" que portan los recombinantes (Obtención de productos génicos)

Inserto bajo el control de un promotor "apropiado"

Genotecas de DNA genómico (cromosómico)

Insertos: fragmentos de DNA genómico (cromosómico)

Generación de fragmentos: Endonucleasas de restricción

Mecánica (cizalla)

Sonicación

Selección de fragmentos según tamaño (tamices moleculares)

Vectores para construir una genoteca:

Elección acorde al tamaño de los insertos

Ej. Vectores lambda (Insertos hasta 17 Kpb)
 Cosmidios (Insertos hasta 45 Kpb)

Número de recombinantes en una genoteca genómica:

Número de recombinantes necesarios para representar todo el genoma dependerá de:

tamaño del genoma en cuestión

longitud promedio de los insertos

Probabilidad de encontrar un determinado segmento de DNA (una secuencia particular) en una genoteca que consta de N recombinantes independientes :

$$N = \frac{[\ln(1-P)]}{[\ln(1-1/n)]}$$

n = tamaño del genoma / tamaño promedio de los insertos

La secuencia del cromosoma se podría “reconstruir” a partir de los insertos de todos los recombinantes de la genoteca

.....se requiere cierto grado de superposición para alinear los insertos

Genotecas de cDNA

Obtención de los insertos:

Aislar transcritos (RNA que tiene poli A)
Sintetizar cDNA (partidores: oligo dT₁₅₋₁₈ o hexámeros de secuencia aleatoria)

Requisitos:

Preservar la integridad de los RNAs

Síntesis de cDNA completa

Adecuada representación de transcritos poco abundantes

Vectores:

Frecuentemente, plasmidios o derivados del bacteriófago lambda (aceptan insertos hasta 10-17 Kpb)

Número de recombinantes: variable (impredecible)

Según número de genes transcripcionalmente activos en un determinado tipo celular, en una condición particular.

Construcción de genotecas "enriquecidas" en un cDNA particular

Genoteca enriquecida en los cDNAs que son poco abundantes en la célula

Construcción de genotecas "enriquecidas" en un cDNA particular

- Aislar polisomas (centrifugación diferencial)

- Extraer mRNA de fracción polisomal
- Síntesis de cDNA
- Construcción de genoteca "enriquecida"

CLON: conjunto de células (individuos), genéticamente iguales, derivados de un progenitor único

Clonamiento de genes desde una genoteca

Genoteca en bacteriófago lambda

Identificación del clon de interés en una genoteca

Identificación del clon de interés en una genoteca

Rastreo de una genoteca para identificar los clones de células que portan un DNA recombinante determinado

1.-Basado en secuencia nucleotídica de interés

(requiere conocimiento de la secuencia)

Automatización

Automated Transfection

Obtención de una sonda nucleotídica para rastreo de genotecas

- Información: la proteína codificada por el gen

.....-Met - Gln - Lys - Phe - Asn-... secuencia prot.

.....AUG CAG^A AAG^A UUC^U AAC^U...

AUG CAA AAA UUU AAU
 AUG CAG AAA UUU AAU
 AUG CAG AAG UUU AAU
 AUG CAA AAG UUU AAU
 AUG CAG AAG UUU AAU

Guessmers:
 oligonucleotidos
 que codifican el
 polipéptido

etc.

* AUG CAA AAA UUU AAU
 * AUG CAG AAA UUU AAU
 * AUG CAG AAG UUU AAU
 * AUG CAA AAG UUU AAU
 * AUG CAG AAG UUU AAU
 * n...

Síntesis química
 y
 marcación de los
 oligonucleótidos

sondas

* AUG CAA AAG UUU AAU
 ...TAC GTT TTC AAA TTA..
 ...ATG CAA AAG TTT AAT..

Uso de las sondas:

rastreo de genoteca de cDNA o de gDNA para identificar el o los recombinantes que portan insertos que codifican la proteína de interés

Situación excepcional: Uso de anticuerpos como sonda para el rastreo de genotecas de expresión

Clonamiento de genes mediante “chromosome walking” (caminata por el cromosoma)

Esta estrategia ha sido utilizada para identificar genes “responsables” de un fenotipo heredable (Ej. enfermedades hereditarias).

Se requiere de un marcador¹ que esté ligado² al fenotipo en cuestión

Marcador genético

Secuencia de DNA que tiene una localización conocida en el cromosoma

Debe ser fácilmente identificable y trazable.

Permiten trazar la herencia de las regiones cromosómicas en generaciones sucesivas y los eventos de recombinación genética.

Ligamiento genético

Asociación de un fenotipo y un cromosoma determinado

Segregación al azar de los cromosomas

...La herencia del gen responsable del fenotipo parecería fácilmente trazable de generación en generación...

Sin embargo,.... dada recombinación genética que ocurre en la meiosis.....

Múltiples
posibilidades de
recombinación

Etcétera, etcétera.....

recombinación

Identificación de marcadores genéticos (cercanos), que estén ligados al fenotipo de manera estadísticamente significativa

“Chromosome walking”

Identificación gen “responsable” de un fenotipo dado

Análisis de clones seleccionados

Indiv. con gen normal Indiv. con gen mutado

Estrategia de "Captura de Genes" ("gene trapping")

No está orientada a la búsqueda de un gen en particular

Basada en la integración al azar de un gen reportero y un marcador de selección en el genoma con en propósito de interrumpir un gen, alterar un fenotipo y conducir a su identificación

Expresión del reportero y del selector quedan bajo el control del promotor del gen "capturado" donde se incorporó la construcción

Consecuencias:

- Expresión del marcador de selección bajo el control del promotor endógeno
- Expresión del gen reportero bajo el control del promotor endógeno
- Supresión de la expresión del producto génico normal
- En algunos casos, alteración “detectable” del fenotipo

Posibilidades de la técnica:

- Identificar un gen responsable de un fenotipo
- Aislar el gen
- Estudiar el patrón de expresión tisular del gen
- Generación de mutante con el gen inactivo

Sondas para rastreo de genoteca: clonamiento del gen de interés

Clonación de un gen basándose en la función del producto génico

Expresión de función

Ensayo de la "función"

- Unión de ligando a receptor
- Transporte de moléculas o iones
- Actividad enzimática
- etc.

Clonación de un gen basándose en la expresión de la función

Rastreos sucesivos

<u>Ciclo de rastreo</u>	<u>N° clones</u>
1	20.000
2	2.000
3	200
4	20
5	2
6	1

Identificación de 1 clon que expresa la función de interés

Caracterización física del DNA clonado

- **Mapa de restricción**
- **Secuenciación**
 - Predicción de secuencias regulatorias
 - Identificación de marco de lectura abierto
 - Predicción de secuencia polipeptídica
 - Predicción de estructura secundaria
 - Análisis de homología (función probable)
- **Número de copias por genoma**

Caracterización funcional del DNA clonado

- **Análisis de regulación transcripcional**
Identificación de promotores y otras secuencias reguladoras
- **Análisis del transcrito codificado**
Transcripción (expresión génica)
- **Expresión funcional in vitro e in vivo**

Detección de los transcritos intracelulares complementarios al DNA clonado

¿Dónde se expresa en gen de interés?

Extracción del RNA de distintos tejidos

Detección de los transcritos intracelulares complementarios al DNA clonado

Northern blot

Cuantificación de transcrito mediante mapeo con nucleasa S1

Comparación del tamaño del DNA clonado y el transcrito respectivo

Extensión del cDNA clonado a partir del transcrito respectivo

Número de copias por genoma del gen de interés

DNA genómico fragmentado

Copias del gen clonado

0.5 1.0 2.0 5.0

$$dc/dt = -kC^2$$

C: conc. de DNA desnat. a tiempo t

$$C/Co = 1/kCot + 1$$

Co: conc. de DNA desnat. a tiempo 0

Cuando el 50% del DNA se ha renaturado

$$C/Co = 0.5$$

$$Cot_{0.5} = k^{-1}$$

• **Genomas simples**

- cada fragmento presente una vez por genoma

Genomas complejos

- fragmentos muy repetidos
- fragmentos poco repetidos
- fragmentos únicos

- **Número de copias de un gen clonado**

(cinética de hibridación)

- Marcar el clon
- Hibridar con DNA genómico fragmentado y desnaturado
- Determinar el valor de Cot

$$\text{Número de copias} = \frac{\text{Cot gen único}}{\text{Cot del clon}}$$

Tiempo renaturación muy largos
genomas complejos y grandes
genes con bajo número de copias