Auxiliar 3-Pauta

Profesores: Daniel Espinoza, Fernando Ordoñez

Auxiliar: Renaud Chicoisne

Pregunta 1 (5.1 SPBook)

Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x) = \mathbb{E}[F(x, w)] \\ \text{s.t:} \quad & \\ & x \in X := \{x \in X_0 : g_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, p\} \end{aligned}$$

Con:

- $X_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ cerrado , $X_0 \neq \emptyset$
- $g_i(x) := \mathbb{E}[G_i(x, \xi)]$, $i = 1, \dots, p$
- $G_i(x, \xi)$, $i = 1, \dots, p$ funciones random lower semi continuous
- $X_N := \{x \in X_0 : \hat{g}_{iN}(x) \leq 0, i = 1, \dots, p\}$
- $\hat{g}_{iN}(x) := \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N G_i(x, \xi^j)$

Si suponemos que:

- Las funciones de sample average g_{iN} convergen uniformemente a g_i en una vecindad de x .
- Las funciones g_i son continuas para $i = 1, \dots, p$.
- $\forall x_N \in X_N, \exists x : x_N$ converge a x casi seguramente.

Demuestre que $x \in X$.

Solución:

Primero $x_N \in X_N$, ie:

$$g_{iN}(x_N) \leq 0$$

Por lo tanto tenemos:

$$\begin{aligned}
g_i(x) &\leq g_i(x) - g_{iN}(x_N) \\
&\leq |g_i(x) - g_{iN}(x_N)| \\
&\leq |g_i(x) - g_i(x_N)| + |g_{iN}(x_N) - g_i(x_N)|
\end{aligned}$$

Y sabemos que g_{iN} converge uniformemente a g_i en una vecindad de x , por lo tanto existe un $\mu > 0$ pequeño tal que g_{iN} converge uniformemente a g_i en $\mathcal{B}(x, \mu)$. Además, sabemos que x_N converge casi seguramente a x , ie:

$$\begin{aligned}
&\forall \epsilon > 0, \exists P : \forall N \geq P, |x_N - x| \leq \epsilon \\
&\Rightarrow \exists P_\mu : \forall N \geq P_\mu, |x_N - x| \leq \mu \\
&\text{ie: } \exists P_\mu : \forall N \geq P_\mu, x_N \in \mathcal{B}(x, \mu)
\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$|g_{iN}(x_N) - g_i(x_N)| \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$$

Ademas:

$$|x_N - x| \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{c.s.} 0$$

Por continuidad de g_i se tiene entonces que:

$$|g_i(x_N) - g_i(x)| \xrightarrow[N \rightarrow +\infty]{c.s.} 0$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
g_i(x) &\leq 0 \\
\text{ie: } x &\in X
\end{aligned}$$

Pregunta 2

Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned}
&\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^\top x + \mathbb{E}[Q(x, \xi)] \\
&\text{s.t:} \\
&\quad Ax = b \\
&\quad x \geq 0
\end{aligned}$$

Con $Q(x, \xi)$ el valor óptimo del problema de segunda etapa:

$$\begin{aligned}
& \min_{y \in \mathbb{R}^m} q^\top y \\
& \text{s.t:} \\
& \quad Tx + Wy = h \\
& \quad y \geq 0
\end{aligned}$$

Sea un sampleo iid $\xi = (\xi^1, \dots, \xi^N)$.

1. Escriba la expresión de x^{j+1} durante una iteración del algoritmo de Stochastic Approximation.

Solución:

Tenemos:

$$x^{j+1} = \Pi_X (x^j - \gamma^j G(x_j, \xi^j))$$

Con:

- $X := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b\}$.
- Π el operador de proyección sobre X .
- $G(x, \xi) \in \partial (c^\top x + Q(x, \xi))$

Ya sabemos que si $\bar{\pi}$ es solución óptima del dual de segunda etapa:

$$-T^\top \bar{\pi} \in \partial Q(x, \xi)$$

Por lo tanto tenemos:

$$\begin{aligned}
& Q(x', \xi) - Q(x, \xi) \geq -T^\top \bar{\pi} (x' - x), \forall x' \in \mathbb{R}^n \\
& \text{ie: } [c^\top x' + Q(x', \xi)] - [c^\top x + Q(x, \xi)] \geq [c^\top - T^\top \bar{\pi}] (x' - x), \forall x' \in \mathbb{R}^n \\
& \text{ie: } (c^\top - T^\top \bar{\pi}) \in \partial (c^\top x + Q(x, \xi))
\end{aligned}$$

Por lo tanto tenemos:

$$x^{j+1} = \Pi_X (x^j - \gamma^j (c^\top - T^\top \bar{\pi}))$$

Además sabemos que:

$$\Pi_X(x) = \arg \min_{z \in X} \|z - x\|$$

Por lo tanto, el paso a cada iteración para encontrar el siguiente x_{j+1} es:

$$x^{j+1} = \arg \min_{z \in X} \|z - (x^j - \gamma^j (c^\top - T^j \bar{\pi}^j))\|$$

ie: x^{j+1} solución óptima de:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \|x - x^j + \gamma^j (c^\top - T^j{}^\top \bar{\pi}^j)\| \\ \text{s.t:} \quad & \\ & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Con γ^j el paso del algoritmo y $\bar{\pi}^j$ la solución óptima del dual de segunda etapa dado el sampleo ξ^j :

$$\begin{aligned} \max_{\pi} \quad & \pi^\top (h^j - T^j x^j) \\ \text{s.t:} \quad & \\ & W^j{}^\top \pi \leq q^j \end{aligned}$$

2. Suponiendo $\gamma^j = \frac{1}{4(j+1)}$ y considerando el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \min_{x,y} \quad & x - y_1 - 6y_2 + 10y_3 \\ \text{s.t:} \quad & \\ & T_1 x - 5y_1 - 2y_2 + 7y_3 = h_1 \\ & T_2 x + y_1 - 3y_2 + y_3 = h_2 \\ & x, y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

En donde $T = (T_1, T_2)$ y $h = (h_1, h_2)$ son inciertos y toman valores de acuerdo a los siguientes escenarios equiprobables: escenario 1: $T^1 = (1, 1)$ y $h^1 = (2, 1)$; escenario 2: $T^2 = (2, 1)$ y $h^2 = (-1, 0)$. La variable x se selecciona a-priori y las variables y_1, y_2 se ajustan a la incertidumbre.

Hagan las iteraciones del algoritmo de Stochastic Approximation que les es posible efectuar con los datos disponibles.

Solución:

Tenemos solamente dos escenarios, ie: dos sampleos disponibles, por lo tanto podremos hacer dos iteraciones. Se puede aplicar el resultado de la pregunta precedente:

El dual del problema de segunda etapa para $j = 1, 2$ es:

$$\begin{aligned} \max_{\pi} \quad & \pi^\top (h^j - T^j x^j) \\ \text{s.t:} \quad & \\ & W^\top \pi \leq q \end{aligned}$$

Con:

$$W = \begin{bmatrix} -5 & -2 & 7 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$q = \begin{bmatrix} -1 \\ -6 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Partemos con una solución de primera etapa factible, ie $x_0 = 0$.

Iteración 1

$T^1 = (1, 1)$ y $h^1 = (2, 1)$ por lo tanto el dual es:

$$\begin{aligned} \max_{\pi} \quad & 2\pi_1 + \pi_2 \\ \text{s.t:} \quad & -5\pi_1 + \pi_2 \leq -1 \\ & -2\pi_1 - 3\pi_2 \leq -1 \\ & 7\pi_1 + \pi_2 \leq 10 \end{aligned}$$

Cuya solución óptima es $\bar{\pi}^1 = (\frac{11}{12}, \frac{43}{12})$

De la pregunta anterior sabemos que:

$$x^1 = \arg \min_{x \in \mathbb{R}} \|x - x^0 + \gamma^0 (c^\top - T^{1\top} \bar{\pi}^1)\|$$

Con $c = (1)$. ie:

$$\begin{aligned} x^1 &= \arg \min_{x \in \mathbb{R}} |x - \frac{7}{8}| \\ \text{ie: } x^1 &= \frac{7}{8} \end{aligned}$$

Iteración 2

$T^2 = (2, 1)$ y $h^2 = (-1, 0)$ por lo tanto el dual es:

$$\begin{aligned}
 \max_{\pi} \quad & -\frac{11}{4}\pi_1 - \frac{7}{8}\pi_2 \\
 \text{s.t:} \quad & \\
 & -5\pi_1 + \pi_2 \leq -1 \\
 & -2\pi_1 - 3\pi_2 \leq -1 \\
 & 7\pi_1 + \pi_2 \leq 10
 \end{aligned}$$

Cuya solución óptima es $\bar{\pi}^2 = (\frac{4}{17}, \frac{3}{17})$

De la pregunta anterior sabemos que:

$$x^2 = \arg \min_{x \in \mathbb{R}} \|x - x^1 + \gamma^1 (c^\top - T^{2^\top} \bar{\pi}^2)\|$$

Entonces:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \arg \min_{x \in \mathbb{R}} |x - \frac{113}{136}| \\
 \text{ie: } x^2 &= \frac{113}{136}
 \end{aligned}$$