Auxiliar 3

Miercoles 5 de de Marzo, 2017

P1.¹ Definimos el conjunto $\mathcal{T}$ de los términos sobre el símbolo de función $f(\cdot, \cdot)$ y la variable x , por inducción como sigue:

- $x \in \mathcal{T}$
- si $t_1 \in \mathcal{T}$ y $t_2 \in \mathcal{T}$, entonces $f(t_1, t_2) \in \mathcal{T}$

Por ejemplo x , $f(x, x)$ y $f(x, f(x, x))$ están en $\mathcal{T}$.

1. Defina la operación $|\cdot| : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{N}$ que dado un elemento t en $\mathcal{T}$ entrega el largo de t en donde cada símbolo f , x , $($, $)$, y $,$ se consideran como de largo uno. Por ejemplo, $|f(x, f(x, x))| = 11$.
2. Defina por inducción la operación $\text{ani} : \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para $t \in \mathcal{T}$, $\text{ani}(t)$ es la máxima anidación de la función f en t . Por ejemplo, $\text{ani}(f(f(x, x), f(x, x))) = 2$ y $\text{ani}(f(f(f(x, x), x), x)) = 3$.
3. Encuentre una función $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que para todo $t \in \mathcal{T}$ se tiene que $|t| \leq h(\text{ani}(t))$ y demuestre por inducción que esta propiedad se cumple.

■ Solución:

1. Definimos la operación de forma inductiva:

Caso base: $|x| = 1$

Caso inductivo: $|f(t_1, t_2)| = 4 + |t_1| + |t_2|$ con $t_1, t_2 \in \mathcal{T}$

El +4 sale de $f(,)$ que son cuatro caracteres.

2. Nuevamente definimos inductivamente: Caso base: $\text{ani}(x) = 0$, $\text{ani}(f(x, x)) = 1$

Caso inductivo: $\text{ani}(f(t_1, t_2)) = 1 + \max(\text{ani}(t_1), \text{ani}(t_2))$, $t_1, t_2 \in \mathcal{T}$

En esta caso no era necesario tener 2 casos base pero ayudan a clarificar y no perjudican la demostración.

3. En esta caso podemos aprovecharnos de la forma en que definimos las partes anteriores para encontrar un h conveniente. Primero podemos explorar un poco el problema, por ejemplo si tomamos una formula con 1 anidación $f(x, x)$ y la anidamos una vez más, por ejemplo $f(f(x, x), f(x, x))$ la anidación subió en 1 mientras que el largo más que se duplicó. Esto nos hace intuir que cuando la anidación sube el largo de la fórmula puede duplicarse o más. Esto nos indica que para equiparar las funciones debemos usar algo del estilo de 3^n .

Probamos con $3^n + a$ con a por definir

Casos base:

$$|x| = 1 \leq h(\text{ani}(x)) = h(0) = a + 1$$

$$|f(x, x)| = 6 \leq h(\text{ani}(f(x, x))) = h(1) = 3 + a$$

Con esto vemos que a debe ser al menos 3, para asegurarnos consideremos $a = 4$

Caso inductivo: Sabemos que:

$$|t_1| \leq h(\text{ani}(t_1))$$

y lo mismo para t_2 y sabemos que $\text{ani}(t_1)$ y $\text{ani}(t_2)$ son iguales o mayores que 2 por los casos base.

Ahora vemos que pasa con $|f(t_1, t_2)|$

$$|f(t_1, t_2)| = 4 + |t_1| + |t_2|$$

Por que dijimos antes

¹Tarea 1, 2016/2

$$|f(t_1, t_2)| = 4 + |t_1| + |t_2| \leq 4 + h(ani(t_1)) + h(ani(t_2)) = 4 + 2 * a + 3^{ani(t_1)} + 3^{ani(t_2)}$$

Por la definición sabemos que $ani(f(t_1, t_2)) = 1 + \max(ani(t_1), ani(t_2))$, con esto

$$|f(t_1, t_2)| \leq 4 + 2 * a + 3^{ani(t_1)} + 3^{ani(t_2)} \leq 4 + 2 * a + 2 * 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))}$$

Así nos vamos acercando a $ani(f(t_1, t_2))$ que es lo que queremos. Ahora, $4 + a = 8$ (recuerda que $a = 4$). Esto quiere decir que $4 + a \leq 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))}$.

$$|f(t_1, t_2)| \leq 4 + 2 * 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))} \leq a + 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))} + 2 * 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))} = a + 3 * 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))}$$

Y esto convenientemente es:

$$|f(t_1, t_2)| \leq a + 3 * 3^{\max(ani(t_1), ani(t_2))} = a + 3^{1 + \max(ani(t_1), ani(t_2))} = a + 3^{f(t_1, t_2)} = h(f(t_1, t_2))$$

Es decir, nuestro $h = 4 + 3^n$ funciona.

P2. Recuerde que el dominio constructible de las expresiones aritméticas $\mathcal{E}_{\mathbb{N}}$ se define por:

- Si k es natural, entonces k es una expresión.
- Si E_1 y E_2 son expresiones, entonces $E_1 + E_2$ es una expresión.
- Si E_1 y E_2 son expresiones, entonces $E_1 * E_2$ es una expresión.
- Si E es una expresión, entonces (E) es una expresión.

a) Defina inductivamente en la construcción de $\mathcal{E}_{\mathbb{N}}$ el operador $\#_{op} : \mathcal{E}_{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}$ que cuenta la cantidad de operadores aritméticos (+ y *) de una expresión.

Solución:

Sea k natural, entonces k es una expresión, luego la cantidad de operadores de k es $\#_{op}(k) = 0$.

Hipótesis inductiva: E_1 tiene $\#_{op}(E_1)$ operaciones y E_2 con $\#_{op}(E_2)$ operaciones.

Veamos que $E_1 + E_2$ es una expresión y $\#_{op}(E_1 + E_2) = \#_{op}(E_1) + \#_{op}(E_2) + 1$ que es la cantidad de operadores por hipótesis y el nuevo operador entre las expresiones.

Análogamente $E_1 * E_2$ es una expresión y $\#_{op}(E_1 * E_2) = \#_{op}(E_1) + \#_{op}(E_2) + 1$ que es la cantidad de operadores por hipótesis y el nuevo operador entre las expresiones.

Finalmente $\#_{op}((E_1)) = \#_{op}(E_1)$ por lo que se suma a los operadores que contiene E_1 .

b) Defina inductivamente en la construcción de $\mathcal{E}_{\mathbb{N}}$ el operador $\#_{num} : \mathcal{E}_{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{N}$ que cuenta la cantidad de naturales que aparecen en una expresión.

Solución:

Sea k natural, entonces k es una expresión, luego la cantidad de naturales que aparecen en la expresión es uno, k . Luego $\#_{num}(k) = 1$.

Definamos por medio de inducción fuerte a E . Sea E formado por dos expresiones y un operador $E_1 + E_2$ por hipótesis inductiva esto es $\#_{num}(E_1) + \#_{num}(E_2)$ que es la cantidad de naturales que aparecen en cada expresión, y como el operador no cambia esta cantidad entonces la suma de naturales de ambas expresiones entrega el valor total de naturales $\#_{num}(E)$. Análogamente para $E_1 * E_2$ por hipótesis $\#_{num}(E_1) + \#_{num}(E_2)$ es el valor total de naturales en E . Por último, sea E expresión con $\#_{num}(E)$ naturales, entonces (E) posee la misma cantidad de naturales.

c) Demuestre por inducción en la construcción de $\mathcal{E}_{\mathbb{N}}$ que para toda expresión $E \in \mathcal{E}_{\mathbb{N}}$ se cumple:

$$\#_{op}(E) = \#_{num}(E) - 1$$

Solución:

Caso base: Sea k natural, entonces k es expresión, sigue que $\#_{op}(k) = 0$ y $\#_{num}(k) = 1$ por la definición anterior, luego se tiene que $\#_{op}(k) = \#_{num}(k) - 1$.

Caso inductivo: Sea E_1 y E_2 expresiones tales que $\#_{op}(E_1) = \#_{num}(E_1) - 1$ y $\#_{op}(E_2) = \#_{num}(E_2) - 1$ luego:

$$\begin{aligned} - \#_{op}(E_1 + E_2) &= \#_{op}(E_1) + \#_{op}(E_2) + 1 = \#_{num}(E_1) - 1 + \#_{num}(E_2) - 1 + 1 = \#_{num}(E_1) + \#_{num}(E_2) - 1 = \\ &= \#_{num}(E_1 + E_2) - 1 - \#_{op}(E_1 * E_2) = \#_{op}(E_1) + \#_{op}(E_2) + 1 = \#_{num}(E_1) - 1 + \#_{num}(E_2) - 1 + 1 = \\ &= \#_{num}(E_1) + \#_{num}(E_2) - 1 = \#_{num}(E_1 * E_2) - 1 - \#_{op}((E_1)) = \#_{op}(E_1) = \#_{num}(E_1) - 1 = \#_{num}((E_1)) - 1 \end{aligned}$$

P3. Un grafo G es una tupla (V, E) , donde V es un conjunto de nodos y $E \subseteq V \times V$ es un conjunto de arcos. Un grafo es no dirigido si cada vez que $(a, b) \in E$ se tiene que $(b, a) \in E$. Un grafo no dirigido $G = (V, E)$ es 3-coloreable si existe una asignación de colores para los nodos tal que nodos adyacentes reciben colores distintos. Formalmente, G es 3-coloreable si existe una función $f : V \rightarrow \{\text{blanco}, \text{azul}, \text{rojo}\}$ tal que para cada $(a, b) \in E$ se tiene que $f(a) \neq f(b)$. Demuestre que el problema de 3-coloración puede ser reducido al problema de satisfacibilidad. Vale decir, encuentre un algoritmo que dado un grafo G construye una oración proposicional $\Phi(G)$ tal que G es 3-coloreable si y sólo si $\Phi(G)$ es satisfacible. Estime el número de pasos que realiza su algoritmo cuando el grafo G tiene n nodos y m arcos.

■ Solución:

Tenemos que escribir fórmulas para varias condiciones distintas. Primero vale la pena definir ciertas relaciones, B, A, R son relaciones unarias que indican los colores de los nodos, por ejemplo $R(a) \iff f(a) = \text{rojo}$.

Comenzaremos con una formula que nos indique que a cada nodo le podemos asignar solamente un color:

$$\varphi_0 = \bigwedge_{a \in V} R(a) \vee B(a) \vee A(a)$$

Esta formula tiene el largo de 3 veces la cantidad de nodos, es decir $3 * |V|$. Luego debemos definir la fórmula que nos indica que a cada nodo se le asigna maximo un color:

$$\varphi_1 = \bigwedge_{a \in V} (B(a) \Rightarrow \neg A(a) \wedge \neg R(a)) \wedge (R(a) \Rightarrow \neg B(a) \wedge \neg A(a)) \wedge (A(a) \Rightarrow \neg B(a) \wedge \neg R(a))$$

Esta fórmula tiene 9 proposiciones por cada nodo, osea que estimaremos que tiene largo $c|V|$ con c una constante.

Sabemos que dos nodos estan conectados por una arista si $(a, b) \in E$, por lo tanto definiremos la relación R como:

$$aRb \iff (a, b) \in E$$

Ahora tenemos lo que necesitamos para decir que 2 nodos adyacentes tienen colores distintos.

$$\varphi_2 = \bigwedge_{a \in V} \bigwedge_{b \neq a} aRb \Rightarrow (R(a) \Rightarrow \neg R(b)) \wedge (A(a) \Rightarrow \neg A(b)) \wedge (B(a) \Rightarrow \neg B(b))$$

Esta formula dice exactamente eso, si dos nodos están conectados tienen colores distintos. Esta formula es cuadrática sobre el número de nodos (tiene la y-atorias anilladas) así que podemos estimar su tamaño por $C_1|V|^2$.

Con esto hemos construido 3 formulas que al anillarlas tienen largo aproximadamente $C_1|V|^2 + C_2|V|$ con $C_2 = c + 3$.

Ahora debemos convencernos de que esta fórmula es satisfacible si y solo si G es 3-coloreable.

Esta es la parte más compleja de la pregunta, aquí es donde hay que entender la lógica de forma más profunda. Nuestra formula Φ esta compuesta por relaciones unarias, estas relaciones unarias son nuestras variables proposicionales, ya que si tomamos una función $f : V \rightarrow colores$ va a asignarle valores de verdad a cada $R(a), A(a), B(a)$, es decir que con f y nuestras relaciones construimos nuestro σ .

$$\sigma(R(a)) = 1 \Leftrightarrow f(a) = rojo$$

Es decir que si encontramos una valuación encontramos una coloración y vice versa. Es decir que los problemas son equivalentes. Además la construcción de esta formula la podemos estimar por $C_1|V|^2 + C_2|V|$ es decir que la construcción de la fórmula no es especialmente lenta.