MA1101-1 Introducción al Álgebra**Profesor:** Leonardo Sánchez C.**Auxiliar:** Marcelo Navarro **Auxiliar 7 - Recuperativo**

11 de Mayo de 2017

P1. [Conjuntos] Sean A, B, W subconjuntos de un conjunto universo E . Demuestre que:

$$(A \cap W) \subseteq (B \cap W) \wedge (A \cap W^c) \subseteq (B \cap W^c) \implies A \subseteq B$$

P2. [Inducción] Encontrar el primer $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $2^n + 4^n < 5^n$. Luego, mediante inducción, compruebe que esto es válido para todo natural $n \geq n_0$.

P3. [funciones e inducción] Para esta pregunta necesitará la definición recursiva para composición de funciones:

Sea $f : A \rightarrow A$, una función (no necesariamente biyectiva) entonces:

$$f^0 = id_A \quad y \quad f^n = f^{n-1} \circ f \quad \forall n \geq 1, n \in \mathbb{N}$$

Sea $\mathcal{U}$ un conjunto universo y $A, B \subseteq \mathcal{U}$ Se define:

$$f : P(\mathcal{U}) \rightarrow P(\mathcal{U})$$

$$X \mapsto f(X) = A \cap (B \cup X)$$

a) Pruebe que $f^k = f$, $\forall k \geq 2$

b) Si $A \neq U$ o $B \neq \emptyset$, pruebe que f no es inyectiva ni epiyectiva.

c) Defina A y B para que f sea biyectiva y comente sobre el nuevo comportamiento de la función.

P4. [Relaciones]

a) Se define en $\mathbb{R}$ la relación Ω dada por: $x\Omega y \Leftrightarrow (y - x) \in \mathbb{N}$.
Demuestre que Ω es una relación de orden parcial.

b) Considere ahora la relación Φ definida en $\mathbb{R}$ como: $x\Phi y \Leftrightarrow (y - x) \in \mathbb{Z}$.
Demuestre que Φ es de equivalencia y determine $[p]_\Phi$ con $p \in \mathbb{Z}$

P5. [Relaciones y funciones] Sean X, Y conjuntos y $f : X \rightarrow Y$ una función.

- a) Sea $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia definida sobre Y . Se define en X la relación preimagen de $\mathcal{R}$ que notamos $f^{-1}(\mathcal{R})$ por:

$$x_1 f^{-1}(\mathcal{R}) x_2 \iff f(x_1) \mathcal{R} f(x_2)$$

- 1) Probar que $f^{-1}(\mathcal{R})$ es una relación de equivalencia en X
- 2) Probar que $[x]_{f^{-1}(\mathcal{R})} = f^{-1}([f(x)]_{\mathcal{R}})$ para cada $x \in X$

Indicación: Notar que hay que probar una igualdad de conjuntos y que $[f(x)]_{\mathcal{R}}$ es un subconjunto de Y .

- b) Suponga ahora que $\mathcal{R}'$ es una relación de equivalencia en X y que f es epiyectiva. Definimos en Y la relación imagen por:

$$y_1 f(\mathcal{R}') y_2 \iff \exists x_1, x_2 \in X, f(x_1) = y_1 \wedge f(x_2) = y_2 \wedge x_1 \mathcal{R}' x_2$$

- 1) Probar que si f es inyectiva entonces $f(\mathcal{R}')$ es de equivalencia y además pruebe que $\mathcal{R}' = f^{-1}(f(\mathcal{R}'))$, es decir, $\mathcal{R}'$ es igual a la relación preimagen de $f(\mathcal{R}')$
- 2) ¿Que ocurre si f no fuera inyectiva?

Propuesto: Defina f tal que no sea inyectiva y $f(\mathcal{R}')$ no sea de equivalencia