

Súper Guía: Números Complejos

P1. (C5-2102) Demuestra que para todo $z \in \mathbb{C}$ con $z \neq -1$ y $|z| = 1$, se tiene que

$$\frac{1+z}{1+\bar{z}} = z.$$

P2. (C6-2012) Encuentra la parte real e imaginaria de

$$(-1 + i\sqrt{3})^{3n} + (-1 - i\sqrt{3})^{3n}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

P3. (C6-2012) Sea $w \in \mathbb{C}$ una raíz cúbica de la unidad, con $w \neq 1$. Prueba que

$$(1+w)^3 + (1+w^2)^9 + (1+w^3)^6 = 62$$

P4. (C6-2008) Sea $f : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$ por $f(z_1, z_2) = |z_1 + z_2|$. Pruebe que, $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$,

$$f(z_1, z_2) \cdot f(\bar{z}_1, \bar{z}_2) \leq (|z_1| + |z_2|)^2.$$

P5. (C6-2008) Encuentra los valores de $n \in \mathbb{N}$ que resuelven la ecuación

$$\left(\frac{\sqrt{3}-i}{2}\right)^{2n} - \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{2n} = i\sqrt{3}.$$

P6. (C6-2009) Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| > 1$ con $Im(z) > 0$. Demuestra que

$$Im\left(z + \frac{1}{z}\right) > 0.$$

P7. (C6-2009) Si z_1 y z_2 son las soluciones de la ecuación $z^2 - 2z + 2 = 0$. Demuestra (sin usar inducción) que $(\forall n \in \mathbb{N})(\forall \phi \in \mathbb{R})$ con $\phi \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$,

$$\frac{(\cot(\phi) + z_1 - 1)^n - (\cot(\phi) + z_2 - 1)^n}{z_1 - z_2} = \text{sen}(n\phi) \text{cosec}^n(\phi)$$

P8. (C6-2010) Considera los complejos $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ y $w = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Encuentra el menor $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ tal que $z^n = w^n = 1$.

P9. (C6-2010) En el esquema de la figura, los puntos P, A, B y C están en una horizontal. Considera los complejos $z_A = OA, z_B = OB$ y $z_C = OC$ (O el origen).




Figura 1: Plano Complejo

- (a) Escribe los complejos z_A , z_B y z_C en forma cartesiana y en forma polar, y en este último caso, en función de los ángulos α , β y γ (sin calcularlos).
- (b) Usando álgebra de números complejos, prueba que α , β , y γ satisfacen la relación $\alpha + \beta + \gamma = \frac{\pi}{2}$

P10. (C6-2011) Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| = 1$ y $z^{2n} \neq -1$. Demuestra que

$$\frac{z^n}{1 + z^{2n}} \in \mathbb{R}$$

P11. (C6-2011) Sea a_1, a_2, b_1 y $b_2 \in \mathbb{N}$. Se define $s_1 = a_1^2 + b_1^2$ y $s_2 = a_2^2 + b_2^2$. Demuestra que existen $m, n \in \mathbb{Z}$ tales que

$$s_1 s_2 = m^2 + n^2$$

Indicación: Defina $z_1 = a_1 + ib_1$.

P12. (C6-2011) Escribe en forma cartesiana y polar el complejo

$$\frac{z_1(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i)}{z_2(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i)}$$

Donde $|z_1| = 3$, $|z_2| = 2$, $\arg(z_1) = \frac{\pi}{4}$ y $\arg(z_2) = \frac{\pi}{2}$

P13. (C6-2011) Sean z_0, \dots, z_{n-1} las n raíces n -ésimas de la unidad, ordenadas de manera usual (es decir, según argumento creciente). Demuestra que:

$$z_0 z_1 + z_1 z_2 + \dots + z_{n-2} z_{n-1} + z_{n-1} z_0 = 0$$

P14. (C7-2007) Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ complejos unitarios tales que:

$$z_1 + z_2 = -u, \quad u \in \mathbb{C}$$

$$z_1 \cdot z_2 = v, \quad v \in \mathbb{C}$$

- (a) Prueba que $|u| \leq 2$ y que $|v| = 1$.
- (b) Prueba que $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = -\frac{u}{v}$.
- (c) Prueba que $u = \bar{u} \cdot v$.
- (d) Si los ángulos de la forma polar de u y de v , son φ y θ respectivamente, es decir

$$u = |u|e^{i\varphi} \text{ y } v = |v|e^{i\theta}$$

utilice (c) para probar que $\theta = 2\varphi + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

P15. (C7-2007) Demuestra que las raíces de la ecuación de segundo grado $z^2 + z + 1 = 0$, son raíces cúbicas de la unidad, distintas de 1.

P16. (C7-2007) Sean $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, un complejo dado y $\{z_0, \dots, z_{n-1}\}$ las raíces n -ésimas de z (con $n \geq 2$). Calcula:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{z_k}$$

P17. Sean w_0, \dots, w_{n-1} las raíces n -ésimas de la unidad. Prueba que $\forall k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$,

$$\sum_{j=0}^{n-1} w_j^k = 0.$$

P18. Prueba que $\forall n \in \mathbb{N}$, $(1 - i)^n + (1 + i)^n \in \mathbb{R}$.

P19. Sea $z \in \mathbb{C}$ tal que $|z| \neq 1$ y considere $n \geq 1$. Prueba que

$$\frac{1}{1+z^n} + \frac{1}{1+\bar{z}^n}$$

es un número real.

P20. Expresa en la forma $a + bi$ las raíces cuartas del complejo $z_0 = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$ (es decir, resuelve $z^4 = z_0$).

P21. Sea $z \in \mathbb{C}$, entonces prueba que $|z + i| = |z - i| \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$.

P22. Muestre que el conjunto de todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $|\frac{z-2}{z-1}| = 2$, es una circunferencia en el plano complejo. Determina su radio y centro.

P23. Sean z_1, z_2, \dots, z_p complejos tales que $|z_i| = 1$, $\forall i \in \{1, 2, \dots, p\}$. Demuestra que si $\sum_{i=1}^p z_i = a \in \mathbb{R}$, entonces

$$\sum_{i=1}^p \frac{1}{z_i} = a.$$

P24. Demuestre que si z es raíz n -ésima de la unidad ($n \geq 2$) y n es divisor de m , entonces z es raíz m -ésima de la unidad.

(Hint: Recuerda que $n \in \mathbb{N}$ es divisor de $m \in \mathbb{N} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N}$ tal que $m = kn$).

P25. Sean $z_n = x_n + iy_n = (1 + i\sqrt{3})^{3n}$. Encuentra la forma polar de z_n y pruebe que la parte real de z_n , es decir, x_n , verifica $x_n + 8x_{n-1} = 0$.

P26. Sean $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ tales que $\sum_{k=1}^n \frac{z_k}{|z_k|} = 0$.

Sea $z \in \mathbb{C}$ arbitrario.

(a) Demuestra que $\sum_{k=1}^n \frac{\bar{z}_k}{|z_k|} (z_k - z) = \sum_{k=1}^n |z_k|$.

(b) Concluye que $\sum_{k=1}^n |z_k| \leq \sum_{k=1}^n |z_k - z|$.

P27. Sea $z \in \mathbb{C}$ un número complejo que satisface las propiedades: $|z| = 1$ y $|z + 1| = 1$. Prueba que z es raíz cúbica de la unidad.

P28. Prueba que el producto de la raíces n -ésimas de la unidad es igual a $(-1)^{n-1}$.

c: