MA1101-5 Introducción al Álgebra

Profesor: Mauricio Telias

Auxiliar: Arturo Merino

Auxiliar 15 : Complejos y Polinomios

29 de julio del 2017

Recordemos:

- Sea $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ dotado de las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned} z + w &= (z_1 + w_1, z_2 + w_2) \\ z \cdot w &= (z_1 w_1 - z_2 w_2, z_1 w_2 + w_1 z_2) \end{aligned}$$

- $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo.
- Sea $R = \{(z_1, 0) \in \mathbb{C} : z_1 \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{C}$, entonces $(R, +, \cdot) \cong (\mathbb{R}, +, \cdot)$.
- Usualmente anotaremos los $(a, b) \in \mathbb{C}$ como $a + bi$. Donde además $i^2 = -1$.
- Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Definimos la parte real y la parte imaginaria respectivamente como:

$$\operatorname{Re}(z) = a \quad \operatorname{Im}(z) = b$$

- Sean $z, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces:

- $\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)$.
- $\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2)$.
- $\operatorname{Re}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Re}(z)$.
- $\operatorname{Im}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Im}(z)$.
- $z_1 = z_2 \Leftrightarrow [\operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \wedge \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2)]$

- Sea $z = a + bi \in \mathbb{C}$. Definimos el conjugado de z como:

$$\bar{z} = a - bi$$

- Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces:

- $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ y $\overline{z - w} = \bar{z} - \bar{w}$.
- $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$. Si $w \neq 0$ $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$.
- Si $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\overline{\lambda z} = \lambda \bar{z}$.
- $\overline{\bar{z}} = z$.
- $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(\bar{z})$ y $\operatorname{Im}(z) = -\operatorname{Im}(\bar{z})$.
- $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ y $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z}$.

- Sea $z = a + bi$. Definimos el módulo como:

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Sean $z, w \in \mathbb{C}$. Entonces:

- $|z| = |\bar{z}|$ y $z = 0 \Leftrightarrow |z| = 0$.
- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ y $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
- $|zw| = |z||w|$ y $|z + w| \leq |z| + |w|$.
- Si $z \neq 0$, entonces $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.
- Si $w \neq 0$, entonces $\left|\frac{z}{w}\right| = \frac{|z|}{|w|}$.

- Sea $\theta \in \mathbb{R}$. Definimos $e^{i\theta}$ como:

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

- Sea $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, entonces:

- $|e^{i\theta}| = 1$.
- $\overline{e^{i\theta}} = (e^{i\theta})^{-1} = e^{-i\theta}$.
- $e^{i\theta} e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$.
- $(e^{i\theta})^n = e^{ni\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$

- $\arg(z)$ es el ángulo de z con el eje real. Se acostumbra a escoger un ángulo en el rango $(-\pi, \pi]$.

- Forma Polar:** $z = |z|e^{i \arg(z)}$.

- Si $e^{i\theta} = e^{i\varphi}$, entonces existe algún $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\theta = \varphi + 2k\pi$.

- Sea $z \in \mathbb{C}$ y $n \geq 2$. Diremos que z es una raíz n -ésima de la unidad si $z^n = 1$.

- Las raíces n -ésimas de la unidad son de la forma $e^{i \frac{2k\pi}{n}}$ con $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

- Sea $z, w \in \mathbb{C}$ y $n \geq 2$. Diremos que z es una raíz n -ésima de w si $w^n = 1$.

- Las raíces n -ésimas de $z = Re^{i\theta} \in \mathbb{C}$ son de la forma $\sqrt[n]{R} e^{i \frac{\theta + 2k\pi}{n}}$ con $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

- Sea $n \geq 2$. La suma de las n raíces n -ésimas de la unidad vale 0.

- Consideraremos a $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ como el cuerpo $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un polinomio es una función $p : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ de la forma:

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

donde $a_0, a_1, \dots, a_n$ son constantes en $\mathbb{K}$ a las que llamaremos coeficientes.

- Al conjunto de polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ se le denota $\mathbb{K}[x]$.
- Sean $p, q \in \mathbb{K}[x]$.

$p = q \iff$ Los coeficientes de p y q son iguales.

- Sea $p \in \mathbb{K}[x]$. Definimos $\text{gr}(p)$ (el grado) como el k más grande tal que $a_k \neq 0$. Si $p \equiv 0$, diremos que $\text{gr}(p) = -\infty$.
- Diremos que $p \in \mathbb{K}[x]$ es mónico si el coeficiente asociado a $x^{\text{gr}(p)}$ es 1.
- Sea $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ y $q(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$ definimos:

- $(p + q)(x) = \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k$
- $(pq)(x) = \sum_{k=0}^{2n} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$

Estas operaciones verifican:

- $\text{gr}(p + q) \leq \max\{\text{gr}(p), \text{gr}(q)\}$.
 - $\text{gr}(pq) = \text{gr}(p) + \text{gr}(q)$.
- $(\mathbb{K}[x], +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad, que no posee divisores del 0.
 - En $(\mathbb{K}[x], +, \cdot)$, los únicos elementos con inverso para $\cdot$ son los polinomios de grado 0.
 - Sean $p, d \in \mathbb{K}[x]$ con $d \neq 0$. Entonces existe un único par $q, r \in \mathbb{K}[x]$ tal que:
 - $p = qd + r$.
 - $\text{gr}(r) < \text{gr}(d)$.

A r lo llamaremos resto. Si $r \equiv 0$, diremos que d divide a p y lo denotaremos por $d|p$.

- Teorema del Resto:** Sea $p \in \mathbb{K}[x]$ y $c \in \mathbb{K}$. El resto de dividir p por el polinomio $(x - c)$ es $p(c)$.
- Diremos que $c \in \mathbb{K}$ es una raíz de $p \in \mathbb{K}[x]$ si $p(c) = 0$.
- Si $c_1, c_2, \dots, c_k$ son raíces distintas de p , entonces:

$$(x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_k) | p(x)$$

- Sea $n \geq 1$. Si $p \in \mathbb{K}[x]$ es tal que $\text{gr}(p) = n$, entonces p posee a lo más n raíces distintas.
- Sea $n \geq 1$ y $p, q \in \mathbb{K}[x]$ tales que $\text{gr}(p) \leq n$ y $\text{gr}(q) \leq n$. Si p y q coinciden en $n + 1$ puntos distintos, entonces son iguales.

- Teorema Fundamental del Álgebra:** Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $\text{gr}(p) = n \geq 1$. Entonces p posee al menos una raíz en $\mathbb{C}$.
- Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $\text{gr}(p) = n \geq 1$. Entonces existen $\alpha, c_1, \dots, c_m \in \mathbb{C}$ y $l_1, \dots, l_m \in \mathbb{N}$ tales que:

$$p(x) = \alpha(x - c_1)^{l_1} \dots (x - c_m)^{l_m}$$

- Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ con coeficientes en $\mathbb{R}$ y sea $z \in \mathbb{C}$ una raíz de p . Entonces $\bar{z}$ es una raíz de p .
- Sea $p \in \mathbb{R}[x]$, tal que $\text{gr}(p) = n \geq 1$. Entonces existen valores $\alpha, c_1, \dots, c_m, a_1, b_1, \dots, a_s, b_s \in \mathbb{R}$ tales que:

$$p \equiv \alpha(x - c_1) \dots (x - c_m)(x^2 + a_1 x + b_1) \dots (x^2 + a_s x + b_s)$$

- Teorema de la Raíz Racional:** Sea $p \in \mathbb{R}[x]$, con coeficientes en $\mathbb{Z}$. Si r y s son primos relativos tal que $\frac{r}{s}$ es una raíz de p , entonces:

$$r|a_0 \wedge s|a_n$$

- Sea $p \in \mathbb{R}[x]$ mónico con coeficientes en $\mathbb{Z}$. Entonces toda raíz racional de p es entera y divide a a_0 .

P1. [Casquete unitario]

Sea:

$$S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

- a) Demuestre que $(S, \cdot)$ es un subgrupo de $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$

b) Para $z \in S$ y $z \neq 1$ definimos:

$$w = \frac{1+z}{1-z}$$

Demuestre que w es un imaginario puro, es decir que $\Re(w) = 0$.

c) Sea $z \in S$ y $z \neq -1$. Demuestre que:

$$\frac{1+z}{1+\bar{z}} = z$$

d) Sea $z \in S$, y $z \neq -1$. Calcule:

$$\Im\left(\frac{z}{(1+z)^2}\right)$$

P2. [Forma Cartesiana]

a) Pruebe que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$(1+i)^n + (1-i)^n \in \mathbb{R}$$

b) Sean $M, N \in \mathbb{N}$ tal que existen $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ que verifican $M = a^2 + b^2$ y $N = c^2 + d^2$. Demuestre que existen $p, q \in \mathbb{N}$ tal que $MN = p^2 + q^2$. En otras palabras, piden probar que si dos enteros se pueden escribir como la suma de dos cuadrados, entonces su producto también.

Hint: Le puede ser útil trabajar la siguiente expresión $|(a+ib)(c+id)|^2$.

P3. [Fórmula de Machin]

A partir del producto $(1+i)(5-i)^4$ pruebe que $\pi = 16 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - 4 \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$.

P4. [Raíces]

a) Demuestre que las soluciones de la ecuación $x^2 + x + 1 = 0$ son raíces cúbicas de la unidad distintas de 1.

b) Encuentre los $z \in \mathbb{C}$ que verifican:

$$z^4 = \frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$$

c) Calcule $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

Hint: Utilice las raíces quintas de la unidad de manera adecuada.

P5. [Sumas con raíces de la unidad]

Sean $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ las raíces n -ésimas de la unidad ordenadas de manera usual (es decir, según argumento de manera creciente).

a) Demuestre que:

$$w_0w_1 + w_1w_2 + \dots + w_{n-2}w_{n-1} + w_{n-1}w_0 = 0$$

b) Pruebe que $\forall k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ se tiene que $\sum_{j=0}^{n-1} (w_j)^k = 0$.

c) Sea $z \in \mathbb{C}$ fijo. Calcule $\sum_{j=0}^{n-1} (z + w_j)^n$.

P6. [Más del casquete unitario]

Sean $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ complejos unitarios (es decir $|z_1| = |z_2| = 1$) tales que:

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= -u, & u &\in \mathbb{C} \\ z_1 z_2 &= v, & v &\in \mathbb{C} \end{aligned}$$

a) Pruebe que $|u| \leq 2$ y que $|v| = 1$.

b) Pruebe que $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = -\frac{u}{v}$.

c) Pruebe que $u = \bar{u}v$.

d) Si los ángulos de la forma polar de u y v , son φ y θ respectivamente. Utilice c) para demostrar que:

$$\theta = 2\varphi + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

P7. [Centroide]

El centroide G de un triángulo T es la intersección de sus medianas. Si el triángulo T tiene vértices $a, b, c \in \mathbb{C}$, un hecho conocido (no lo demuestre) es que:

$$G = \frac{1}{3}(a + b + c)$$

Suponga ahora que en los lados de T construimos tres triángulos similares de forma arbitraria. Esto logra construir un nuevo triángulo de vértices $p, q, r \in \mathbb{C}$ como indica la figura. Demuestre que el centroide de este nuevo triángulo coincide con el centroide del triángulo original.

Figura 1: La situación descrita en la P4.

P8. [Raíces cúbicas de la unidad]

a) Sean $w_1, w_2 \in \mathbb{C}$ tales que $|w_1| = |w_2| = 1$ y $w_1 + w_2 = -1$.

(i) Pruebe que $w_1 = \overline{w_2}$.

(ii) Muestre que $w_0 = 1, w_1$ y w_2 son las raíces cúbicas de la unidad.

b) Sean $z_0, z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tales que $|z_0| = |z_1| = |z_2| = 1$ y $z_0 + z_1 + z_2 = 0$. Demuestre que $\exists \theta \in \mathbb{R}$, tal que $z_k = w_k e^{i\theta}$, $k = 0, 1, 2$, donde w_k son los complejos de la parte anterior.

P9. [Raíces de la unidad]

Sean $w_0, w_1, \dots, w_{n-1}$ la raíces n -ésimas de la unidad ordenadas según argumento creciente.

a) Demuestre la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\sum_{k=1}^n \overline{w_j^k} w_l^k = \begin{cases} n & \text{si } j = l \\ 0 & \text{si } j \neq l \end{cases}$$

b) Sea w una raíz cúbica de la unidad con $w \neq 1$, demuestre que:

$$(1 + w)^3 + (1 + w^2)^3 + (1 + w^3)^3 = 62$$

P10. [División y cancelabilidad de Polinomios]

a) Considere $p, d \in \mathbb{R}[x]$

$$p(x) = 4x^4 - 2x^3 - 3$$

$$d(x) = 2x^2 - 3$$

Encuentre $q, r \in \mathbb{R}[x]$ tal que $p(x) = q(x)d(x) + r(x)$ con $\text{gr}(r) < \text{gr}(d)$.

- b) Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ tenemos que $(x - 1)|(x^n - 1)$.
- c) Sea $p(x) = x^5 + ax^2 + b$ y $q(x) = x^3 + cx + 1$. Determine los valores de $a, b, c \in \mathbb{C}$ para que $q|p$.
- d) Sean $p, q, r \in \mathbb{R}[x]$ tal que $p(q - r) = q(p - r)$ y $\text{gr}(r) \geq 0$. Demuestre que $p = q$.

P11. [Coeficientes]

- a) Encuentre el coeficiente que acompaña a x^{17} en el polinomio $(1 + x^5 + x^7)^{20}$.
- b) Encuentre el coeficiente que acompaña a x^{12} en el polinomio $(1 + x^2 + x^5 + x^7)^{25}$.
- c) Pruebe que:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$

Para esto compare los coeficientes de los polinomios $(1 + x)^{2n}$ y $(1 + x)^n(1 + x)^n$ de manera adecuada.

P12. [Composición]

- a) Sean $p, q \in \mathbb{C}[x]$ tales que $\text{gr}(p) = n$ y $\text{gr}(q) = m$. Demuestre que $p \circ q$ es un polinomio y calcule $\text{gr}(p \circ q)$.
- b) Encuentre todos los $p \in \mathbb{C}[x]$ tales que:

$$p(x^2) = (x^2 + 1)p(x) \quad p(p(x)) = p(x)$$

Hint: Puede ser útil encontrar $\text{gr}(p)$ antes que p .

P13. [La igualdad es por coordenadas]

- a) Sean $p, q \in \mathbb{R}[x]$ tales que:

$$\begin{aligned} p(x) &= (2 + f) + (e + f)x + (a - d)x^4 + (2a + c)x^5 + (a + b)x^7 \\ q(x) &= 3 + (f + 2)x + (a + b + c + d)x^3 + (b + c + 1)x^4 + bx^5 \end{aligned}$$

Determine los valores de $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ tales que $p = q$. Escriba el polinomio resultante.

- b) Sea $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{C}$ tal que:

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

Se define $q : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ por

$$q(x) = p(ix)$$

- (i) Demuestre que $q(x)$ es un polinomio y de explícitamente sus coeficientes en función de los coeficientes de p .
- (ii) Demuestre que:

$$p = q \iff \text{para cada } k \text{ que no es múltiplo de } 4, a_k = 0.$$

P14. [Varios]

- a) Sea p un polinomio con coeficientes reales tal que $p \neq 0$ tal que $i, 1, 2, 3$ son raíces de p . De el grado mínimo del polinomio y suponiendo que p es del grado mínimo y mónico encuentrelo.
- b) Factorice en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{C}$ el polinomio $p(x) = x^4 + 3x^3 - 12x^2 - 13x - 15$
- c) Sea $n_0, n_1, n_2 \in \mathbb{N}$, definamos:

$$p(x) = x^{3n_0} + x^{3n_1+1} + x^{3n_2+2}$$

Demuestre que $p(x)$ es divisible por $q(x) = x^2 + x + 1$.

P15. [Funciones de polinomios]

Sea $F : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$, definida para todo polinomio $p \in \mathbb{R}[x]$ de la forma $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ como $F(p) = \sum_{k=0}^n a_k$. Es decir, F es la función que a todo polinomio le asocia la suma de sus coeficientes.

- a) Estudie inyectividad y sobreyectividad de F .
- b) Sea $p \in \mathbb{R}[x]$ tal que $F(p) = 0$. Encuentre $x \in \mathbb{R}$ tal que $p(x) = 0$.

P16. [Encontrar un polinomio]

Sea $p(x) \in \mathbb{R}(x)$ un polinomio mónico con $\text{gr}(p) = 3$. Se sabe que $p(x)$ es divisible por $(x - 1)$ y que los restos de sus divisiones por $(x - 2)$, $(x - 3)$ y $(x - 4)$ son iguales. Determine $p(x)$, justificando sus pasos, y encuentre todas sus raíces.

P17. [Factorización y Morfismos]

- a) Sea $p(x) = x^5 - 5x^4 + 14x^3 - 14x^2 + 13x - 9$. Se sabe que una de las raíces de $p(x)$ es $x = i$. Calcule todas las raíces de p y factorícelo en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{C}$.
- b) Sea $a \in \mathbb{R}$. Se define $\varphi : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$\varphi(p(x)) = p(a)$$

- (i) Demuestre que φ es un morfismo epiyectivo entre los anillos $(\mathbb{R}[x], +, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.
- (ii) Pruebe que $\varphi^{-1}(\{0\}) = \{(x - a)q(x) : q(x) \in \mathbb{R}[x]\}$.

P18. [Correspondencia en Polinomios]

Sea $p \in \mathbb{C}[x]$.

- a) Demuestre que $p(x)$ es sobreyectivo, si y sólo si $\text{gr}(p) \geq 1$.
Hint : Puede ser útil el teorema fundamental del álgebra.
- b) El objetivo de esta parte es probar que $p(x)$ es inyectivo, si y sólo si $\text{gr}(p) = 1$.
 - (i) Demuestre que si $\text{gr}(p) = 1$, entonces $p(x)$ es inyectivo.
 - (ii) Demuestre que si $\text{gr}(p) < 1$, entonces $p(x)$ no es inyectivo.
 - (iii) Sea $n > 1$, $\lambda, a \in \mathbb{C}$. Definamos $q \in \mathbb{C}[x]$ como:

$$q(x) = \lambda(x - a)^n$$

Demuestre que $q(x)$ no es inyectivo.

- (iv) Concluya la dirección que falta.

P19. [Una productoria]

El objetivo de este problema es probar que para $m \geq 2$:

$$\prod_{k=1}^{m-1} \sin\left(\frac{k\pi}{m}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{m}\right) \sin\left(\frac{2\pi}{m}\right) \cdot \dots \cdot \sin\left(\frac{(m-2)\pi}{m}\right) \sin\left(\frac{(m-1)\pi}{m}\right) = \frac{m}{2^{m-1}}$$

Para esto se le propone lo siguiente:

- a) Pruebe que:

$$\prod_{k=1}^{m-1} (1 - w_k) = (1 - w_1)(1 - w_2) \dots (1 - w_{m-2})(1 - w_{m-1}) = m$$

Donde $w_1, \dots, w_{m-1}$ son las raíces m -ésimas de la unidad en el orden usual.

Hint: Considere el polinomio $p(z) = z^m - 1$.

- b) Use la parte anterior conjugando para demostrar que:

$$m^2 = 2^{m-1} \left(1 - \cos\left(\frac{2\pi}{m}\right)\right) \left(1 - \cos\left(\frac{4\pi}{m}\right)\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{2(m-2)\pi}{m}\right)\right) \left(1 - \cos\left(\frac{2(m-1)\pi}{m}\right)\right)$$

- c) Concluya.