MA1002-6 Cálculo Diferencial e Integral**Profesor:** Leonardo Sánchez C.**Auxiliar:** Marcelo Navarro **Auxiliar 5: Aplicaciones de derivadas II**

07 de Septiembre de 2017

P1. Analizar completamente la función $f(x) = (1+x)e^{\frac{1}{x}}$ incluyendo:

- Dominio, paridad, signos y ceros
- Determine límites laterales en $x = 0$ y continuidad ¿Es reparable?
- Determine asíntotas
- Estudie crecimiento y concavidad
- Dibuje el gráfico indicando puntos importantes

P2. [1998 - P3-b) - C4] Estudiar el crecimiento de la función definida en $(0, \infty)$ por $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, determinar el valor máximo alcanzado por la sucesión $\sqrt[n]{n}$ **P3.** Encuentre la ecuación de la recta tangente al lugar geométrico $x^2 + 2y^2 = 4$, tal que ella forme con los ejes coordenados un triángulo rectángulo de menor área posible. Calcule el área mínima (considere $x, y > 0$)**P4.**

- Desarrolle mediante un polinomio de Taylor con resto, en torno a $x_0 = 0$, la función $\sinh(x)$
- Calcule $\sinh(1)$ con términos no nulos del desarrollo anterior y estime una cota del error (puede usar $2,5 < e < 3$)

P5. Sea una función de clase C^n definida en un intervalo que contiene al punto x_0 que satisface:

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{[n-1]}(x_0) = 0, \quad f^{[n]}(x_0) \neq 0$$

Sea g la función $g(x) = x - \frac{f'(x)}{f''(x)}$

- Defina $g(x)$ en x_0 para que sea continua en ese punto.
- Calcule $g'(x_0)$
Hint: Use Taylor

Propuestos**P6.** Estudiar completamente la función $f(x) = \frac{x}{\ln(x^2)}$ **P7.** Encuentre un desarrollo limitado para $\varphi(x) = \sin(x) + \cos(x)$ en torno a $\bar{x} = 0$, cuyo error máximo de aproximación en el intervalo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ sea inferior a 10^{-3} **P8. [2001 - C4]** A partir del desarrollo de Taylor en torno a 0 de $(x+a)^n$, con $n \geq 1$ un entero, demuestre la fórmula del binomio de Newton $(x+a)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} a^{n-k} x^k$

- **[Convexidad]** Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ se dice convexa si las rectas secantes al gráfico de la función quedan por encima del gráfico, vale decir. $\forall x, y \in [a, b], x < y$ se tiene que

$$f(z) \leq f(x) + \left[\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right] (z - x), \quad \forall z \in (x, y)$$

o equivalentemente

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$$

- Una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Entonces f es convexa en $[a, b]$ si y sólo si f' es creciente en (a, b) . En el caso de que f' sea diferenciable, notamos que f sera convexa si $f'' \geq 0$.
- **[Concavidad]** f se dirá cóncava si $-f$ es convexa. Por lo tanto, en el caso de que f sea diferenciable se estudiará si f' es decreciente
- **[Derivadas de Orden Superior]**
Se define recursivamente (o inductivamente) las derivadas de orden superior por:

$$f^{[k]}(x) := (f^{[k-1]})'(x) \quad \text{y} \quad f^{[0]} = f(x)$$

Notar que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ admite una derivada de orden k en todo punto de (a, b) , entonces $f^{[k-1]}, f^{[k-2]}, \dots, f'', f', f$ existen y son continuas en (a, b)

- **[Clases C^k]** Diremos que $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $C^k(a, b)$ si es k -veces derivable en todo (a, b) y la función $f^{[k]} : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ es continua. Es decir, en la practica $f \in C^k(a, b) \iff f$ es k -veces derivable y la derivada k -esima es continua.

Si lo anterior es cierto para todo $k \in \mathbb{N}$ diremos que f es de clase C^∞

- **[Desarrollo limitado]** Diremos que $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ posee un desarrollo limitado, que no es más que una aproximación polinomial, de orden k en torno al punto $\bar{x} \in (a, b)$ si existen constantes $a_0, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ tales que

$$f(x) = a_0 + a_1(x - \bar{x}) + \dots + a_k(x - \bar{x})^k + o((x - \bar{x})^k)$$

Donde $o(\cdot)$ es un error de aproximación y es tal que

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{o(u^k)}{u^k} = 0.$$

Usando el cambio de variables $h = x - \bar{x}$, el desarrollo limitado queda

$$f(\bar{x} + h) = a_0 + a_1h + a_2h^2 + \dots + a_kh^k + o(h^k)$$

- Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ k -veces derivable en $\bar{x} \in (a, b)$, y sea

$$T_f^k(h) := f(\bar{x}) + f'(\bar{x})h + \frac{f''(\bar{x})}{2}h^2 + \dots + \frac{f^{[k]}(\bar{x})}{k!}h^k$$

Su desarrollo de Taylor de orden k en torno a $\bar{x}$. Entonces

$$f(x) = T_f^k(h) + o((x - \bar{x})^k)$$

$$\text{con} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h^k)}{h^k} = 0$$

- **[Punto critico]** Diremos que x_* es punto critico de una función diferenciable f si se cumple que $f'(x_*) = 0$.
- Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, k -veces derivable en $\bar{x} \in (a, b)$, con $f'(\bar{x}) = \dots = f^{[k-1]}(\bar{x}) = 0$ y $f^{[k]} \neq 0, k \geq 2$. Entonces hay 3 casos posibles:

1. Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) > 0$, entonces $\bar{x}$ es un minimo local
2. Si k es par y $f^{[k]}(\bar{x}) < 0$, entonces $\bar{x}$ es un maximo local
3. Si k es impar, $\bar{x}$ es un punto de inflexión, es decir, es un punto en donde la función cambia su concavidad

- Sea $x_0 \in (a, b)$ y $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una función de C^2 . Si $f'(x_0) = 0$, existen 3 posibilidades:

1. $f''(x_0) > 0$, entonces x_0 es mínimo local.
2. $f''(x_0) < 0$, entonces x_0 es máximo local.
3. $f'''(x_0) \neq 0$ se puede concluir que x_0 es un punto de inflexión.)

- **[Asíntotas]** 3 tipos (estudiar independiente hacia $+\infty$ o $-\infty$)

1. Horizontal: $y = c$, calcular $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = c$.
2. Vertical: $x = a$, encontrar a tal que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \rightarrow \pm\infty$. Por lo general son las indeterminaciones.
3. Oblicuas: $y = mx + n$, donde $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - mx$

- **[Error $o(\cdot)$ en Desarrollo de Taylor]**

Sea $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $(k+1)$ -veces derivable en todo punto del intervalo (a, b) . Sea $T_f^k(\cdot)$ el polinomio de taylor de orden k en $\bar{x} \in (a, b)$. Entonces, para todo $x > \bar{x}$ (respectivamente $x < \bar{x}$) existe $\xi \in (\bar{x}, x)$ (respectivamente $\xi \in (x, \bar{x})$) tal que:

$$f(x) = T_f^k(x - \bar{x}) + \frac{f^{[k+1]}(\xi)}{(k+1)!}(x - \bar{x})^{k+1}$$

Es decir, se encontró una expresión para el error $o(\cdot)$