MA1101-5 Introducción al Álgebra

Profesor: Pablo Dartnell

Auxiliar: Juan Pedro Ross

Fecha: 4 de Mayo del 2018

Pauta auxiliar 7: Sumatorias

P1. Calcule: $\sum_{i=1}^n \sqrt[75]{k+2} - \sqrt[75]{k}$

R: Queremos utilizar una suma telescópica pero para ello tiene que haber dos términos consecutivos y no es el caso, acá están a distancia dos... Bueno agregamos lo que falta!

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sqrt[75]{k+2} - \sqrt[75]{k} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt[75]{k+2} - \sqrt[75]{k+1} + \sqrt[75]{k+1} - \sqrt[75]{k} \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt[75]{k+2} - \sqrt[75]{k+1} + \sum_{i=1}^n \sqrt[75]{k+1} - \sqrt[75]{k} \\ &= \sqrt[75]{n+2} - \sqrt[75]{1+1} + \sqrt[75]{n+1} - \sqrt[75]{1} = \sqrt[75]{n+2} + \sqrt[75]{n+1} - \sqrt[75]{2} - 1 \end{aligned}$$

P2. Definimos, para $n \geq 1, r \neq 1$ $S_n = \sum_{k=1}^n kr^k$.

a) Demuestre, sin usar inducción, que $S_n = r(S_n - nr^n) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1}$.

R: Démosle para adelante

$$\begin{aligned} r(S_n - nr^n) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} &= r\left(\sum_{k=1}^n kr^k - nr^n\right) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} = r\left(\sum_{k=1}^{n-1} kr^k + nr^n - nr^n\right) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} \\ &= r\left(\sum_{k=1}^{n-1} kr^k\right) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} = \sum_{k=1}^{n-1} kr^{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} kr^{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} kr^{k+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)r^{k+1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)r^{k+1} \\ &= \sum_{k=1}^n kr^k = S_n \end{aligned}$$

Donde el 5to igual se justifica pues el término 0 de esa suma vale 0, así que es lo mismo que esté a que no esté, y el penúltimo igual fue un cambio de indicies (si los límites suben, los de adentro bajan y viceversa).

b) Demuestre, sin usar inducción que $S_n = \frac{r - (n+1)r^{n+1} + nr^{n+2}}{(1-r)^2}$.

R: De la parte anterior sabemos que

$$S_n = r(S_n - nr^n) + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} \Leftrightarrow S_n(1-r) = -nr^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} \Leftrightarrow S_n = \frac{-nr^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1}}{1-r}$$

Veamos que el valor de la derecha es lo pedido

$$\begin{aligned} -nr^{n+1} + \sum_{k=0}^{n-1} r^{k+1} &= -nr^{n+1} + r \sum_{k=0}^{n-1} r^k = -nr^{n+1} + r \frac{1-r^n}{1-r} = \frac{-(1-r)nr^{n+1} + r - r^{n+1}}{1-r} \\ &= \frac{-nr^{n+1} + nr^{n+2} + r - r^{n+1}}{1-r} = \frac{r - (n+1)r^{n+1} + nr^{n+2}}{1-r} \\ \therefore S_n &= \frac{r - (n+1)r^{n+1} + nr^{n+2}}{(1-r)^2} \end{aligned}$$

P3. El objetivo de esta pregunta es calcular la suma

$$\frac{1}{2} + (1+2)\frac{2}{3} + (1+2+3)\frac{3}{4} + (1+2+3+4)\frac{4}{5} + \dots + (1+2+3+\dots+n)\frac{n}{n+1}$$

Para ello se recomienda seguir los siguiente pasos:

I) Escriba en forma de sumatoria la suma $\frac{1}{2}c_1 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{3}{4}c_3 + \dots + \frac{n}{n+1}c_n$.

R: Es bastante claro el patrón, por lo que $\frac{1}{2}c_1 + \frac{2}{3}c_2 + \frac{3}{4}c_3 + \dots + \frac{n}{n+1}c_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1}c_k$

II) Determine el valor de c_k para el problema en específico.

R: Veamos $C_1 = 1, C_2 = 1+2, C_3 = 1+2+3, \dots, C_k = 1+2+3+\dots+k = \sum_{j=1}^k j = \frac{k(k+1)}{2}$, donde esto es por ser una suma conocida.

III) Calcule la sumatoria que le quedó.

R: Reemplazando lo obtenido en la parte anterior en la primera se tiene que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1}c_k &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \sum_{j=1}^k j \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{k+1} \frac{k(k+1)}{2} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12} \end{aligned}$$

Donde el último igual es por ser una suma conocida.

P4. En $\mathbb{R}^n$ se define la relación $(x_1, x_2, \dots, x_n) \mathcal{S} (y_1, y_2, \dots, y_n) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$.

a) Demuestre que $\mathcal{S}$ es una relación de equivalencia.

- Refleja: $(x_1, \dots, x_n) \mathcal{S} (x_1, \dots, x_n)$ pues $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i$.
- Simétrica: Suponemos que $(x_1, \dots, x_n) \mathcal{S} (y_1, \dots, y_n)$ es decir $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$, luego es claro que $\sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n x_i$ y por lo tanto $(y_1, \dots, y_n) \mathcal{S} (x_1, \dots, x_n)$.
- Transitiva: Suponemos que $(x_1, \dots, x_n) \mathcal{S} (y_1, \dots, y_n)$ y $(y_1, \dots, y_n) \mathcal{S} (z_1, \dots, z_n)$ es decir $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i$ y $\sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n z_i$, luego directamente se tiene que $\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n z_i$ y por lo tanto $(x_1, \dots, x_n) \mathcal{S} (z_1, \dots, z_n)$.

Como la relación es refleja, simétrica y transitiva, es de equivalencia.

b) Demuestre que $[(2, 3, 4, \dots, n+1)]_{\mathcal{S}} = \left\{ (x_1, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n(n+3)}{3} \right\}$

R: $[(2, 3, 4, \dots, n+1)]_{\mathcal{S}}$ es el conjunto de todos los elementos que se relaciona con $(2, 3, 4, \dots, n+1)$

para relacionarme con el debo sumar lo mismo que él, es decir debe ocurrir que $\sum_{i=1}^n x_i =$

$\sum_{i=2}^{n+1} i$, que es casi una suma conocida con el detalle de que parte de 2, arreglemos eso $\sum_{i=2}^{n+1} i =$

$$\sum_{i=1}^{n+1} i - 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - 1 = \frac{n^2 + 3n + 2 - 2}{2} = \frac{n^2 + 3n}{2} = \frac{n(n+3)}{2}$$

c) Se define la función

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}^n / \mathcal{S} \\ x &\longmapsto f(x) = [(x, 0, \dots, 0)]_{\mathcal{S}} \end{aligned}$$

¿Es biyectiva esta función?

R: Veamos primero que es sobreyectiva, sea $[y] \in \mathbb{R}^n / \mathcal{S}$, es decir y es de la forma $(y_1, y_2, \dots, y_n)$

y su clase de equivalencia se caracteriza como todos los $x \in \mathbb{R}^n$ tales que su suma es

la misma que la de y , un elemento simple que cumple eso es el vector que tiene en su

primera coordenada el valor de la suma y el resto son puros ceros, dicho de otra forma:

$[(y_1, \dots, y_n)] = [(\sum_{i=1}^n y_i, 0, 0, \dots, 0)]$, pues sabemos que las clases de equivalencia son invariantes

bajo representante. Luego se tendrá que tomando $x = \sum_{i=1}^n y_i$ se tiene que $f(x) = [y]$ y

por lo tanto es sobreyectiva.

Además es inyectiva pues si tomo $x_1 \neq x_2$ se tendrá que $[(x_1, 0, 0, 0, \dots, 0)] \neq [(x_2, 0, 0, 0, \dots, 0)]$

ya que en la primera viven los elementos que suman x_1 y en la segunda los que suman x_2 y

no puede pasar esas dos cosas al mismo tiempo. Como la función es inyectiva y sobreyectiva

es biyectiva.

P5. Calcule

$$\sum_{k=0}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor (-1)^k$$

R: Notemos que tanto esa parte entera como el $(-1)^k$ se comporta distinto según si el k es par o impar, así resulta natural separar la suma en dos

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor (-1)^k &= \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor (-1)^k + \sum_{k=0: k \text{ impar}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor (-1)^k \\ &= \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor - \sum_{k=0: k \text{ impar}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor \end{aligned}$$

Notemos que en la segunda suma al tomar un k impar, así $k+1$ es par y luego al dividirlo en

2 da entero, por lo que la parte entera no hace nada. En cambio para k par, $\frac{k+1}{2} = \frac{k}{2} + \frac{1}{2}$ y

como k es par su mitad es entera, por lo que al sumarle 0.5 y calcular su parte entera vuelve a

lo mismo, así las sumas anteriores quedan

$$\begin{aligned} \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor - \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor &= \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \frac{k}{2} - \sum_{k=0: k \text{ impar}}^{2n} \frac{k+1}{2} \\ &= \sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \frac{k}{2} - \sum_{k=0: k \text{ impar}}^{2n-1} \frac{k+1}{2} \end{aligned}$$

Donde la última igualdad es pues estoy considerando solo los términos impares por lo que el $2n$ no se incluye. Finalmente si recordamos que todo par se escribe como $2j$ y todo impar $2j-1$ podemos hacer un cambio de variable y queda:

$$\sum_{k=0: k \text{ par}}^{2n} \frac{k}{2} - \sum_{k=0: k \text{ impar}}^{2n-1} \frac{k+1}{2} = \sum_{j=0}^n \frac{2j}{2} - \sum_{j=1}^n \frac{2j-1+1}{2} = \sum_{j=0}^n j - \sum_{j=1}^n j = 0$$

Pues el primer término de la primera suma es 0.

P6. Sea E un conjunto no vacío y considere $K \in \mathcal{P}(E)$ fijo, con $K \neq \emptyset$. Se define en $\mathcal{P}(E)$ la relación $\mathcal{R}_K$ por

$$A\mathcal{R}_K B \Leftrightarrow B \cap K \subseteq A.$$

a) Pruebe que $\mathcal{R}_K$ es refleja y transitiva.

R:

- Refleja: $A\mathcal{R}_K A \Leftrightarrow A \cap K \subseteq A \Leftrightarrow V$.
- Transitiva: $A\mathcal{R}_K B \wedge B\mathcal{R}_K C \Leftrightarrow B \cap K \subseteq A \wedge C \cap K \subseteq B \Rightarrow C \cap K \subseteq A$ veamos esto último, tomemos un x en $C \cap K$ por hipótesis, x está en B y como ya sabíamos que estaba en K tiene que estar en $B \cap K$ y por hipótesis está en A .

b) Proponga un conjunto $K \in \mathcal{P}(E)$ de modo que $\mathcal{R}_K$ sea una relación de orden. Justifique.

R: Ya sabemos que es refleja y transitiva, falta solo que sea antisimétrica para que sea de orden. Veamos que A cumple que si $A\mathcal{R}_K B \wedge B\mathcal{R}_K A \Rightarrow A = B$, después de un rato uno se da cuenta que tomando $K = E$ se concluye (claramente hay otros, por ejemplo $K = A \cup B$). En efecto: $A\mathcal{R}_E B \wedge B\mathcal{R}_E A \Leftrightarrow A \cap E \subseteq B \wedge B \cap E \subseteq A \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Leftrightarrow A = B$.