MA1101-6 Introducción al Álgebra

Profesor: Martín Matamala

Auxiliar: Matías Azócar Carvajal

Auxiliar 10: Estructuras Algebraicas

18 de julio de 2018

- Una **ley de composición interna** (o *l.c.i.*) es una operación definida sobre un conjunto A (no vacío) que se queda en él mismo cuando se aplica. En resumen, una función así:

$$\begin{aligned} \star : A \times A &\rightarrow A \\ (x, y) &\rightarrow x \star y \end{aligned}$$

- Una **estructura algebraica** será un conjunto no vacío dotado de una *l.c.i.* que se aplique sobre él. Lo anotaremos de la forma $(A, \star)$ (Por ejemplo $(\mathbb{N}, +)$ es una estructura algebraica)

- Las operaciones tienen las siguientes gracias:

- $\star$ asocia si $\forall x, y, z \in A : (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$
- e es elemento neutro de $\star$ si $\forall x \in A : e \star x = x \star e = x$
- si e es elemento neutro de $\star$ y $x \in A$, entonces diremos que x tiene inverso si existe y en A tal que $x \star y = y \star x = e$
- $\star$ es conmutativa si $\forall x, y \in A : x \star y = y \star x$
- a será idempotente si $a \star a = a$
- a será absorbente si $\forall x, a \star x = x \star a = a$
- a será cancelable si para todo y, z se tiene: $a \star z = a \star y \Rightarrow z = y$ y además $z \star a = y \star a \Rightarrow z = y$

- Si $(A, \star, \Delta)$ es e.a. con dos operaciones, diremos que Δ distribuye respecto a $\star$ si para todo x, y, z se tiene $x \Delta (y \star z) = (x \Delta y) \star (x \Delta z)$ y $(x \star y) \Delta z = (x \Delta z) \star (y \Delta z)$

- De existir el neutro de una e.a., este es único
- De existir inversos en una e.a. con operación **asociativa**, estos son únicos
- Dadas dos e.a. $(A, \star), (B, \Delta)$ llamaremos homomorfismo de $(A, \star)$ en (B, Δ) a la función f que hace lo siguiente:

$$\forall x, y \in A, f(x \star y) = f(x) \Delta f(y)$$

- Si f es:
 - inyectiva, se llamará **monomorfismo**
 - epiyectiva, se llamará **epimorfismo**
 - biyectiva, se llamará **isomorfismo** entre $(A, \star)$ y (B, Δ)
 - Si $(A, \star) = (B, \Delta)$ el homomorfismo se llamará **endomorfismo** (si además es biyectivo, es llamado **automorfismo**)

P1.- Sea $(S, \star)$ una e.a. con neutro e y $\star$ una operación asociativa. Para a fijo, invertible para $\star$ y con inverso a^{-1} en S se define la operación Δ en S como:

$$\forall x, y \in S, x \Delta y = x \star a \star y$$

- Demuestre que la ley Δ es asociativa y tiene neutro (encuéntrelo!)
- Caracterice elementos invertibles según Δ y calcule el inverso de a respecto a Δ .

P2.- Se define en $\mathbb{R}^2$ la *l.c.i.* $\heartsuit$ por:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2, (a, b) \heartsuit (c, d) = (ac, bc + d)$$

- Estudie la conmutatividad de $\heartsuit$
- Estudie la asociatividad de $\heartsuit$
- Determine el neutro de $\heartsuit$
- Encuentre que elementos son invertibles según $\heartsuit$
- Determine elementos idempotentes para $\heartsuit$

P3.- Sea $(G, \circ)$ una estructura en la que $\circ$ es una l.c.i. asociativa, conmutativa e idempotente.

Se define en G la relación $\mathcal{R}$ por $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \circ y = y$. Demuestre que $\forall a, b \in G$ se cumple:

a) $a\mathcal{R}(a \circ b)$ y $b\mathcal{R}(a \circ b)$

b) Si $\exists x \in G$ tal que $x\mathcal{R}a \wedge x\mathcal{R}b$ entonces $x\mathcal{R}(a \circ b)$ (Son ambas condiciones necesarias?)

P4.- Sea f un homomorfismo, no necesariamente epiyectivo, de $(A, \circ)$ en $(B, \diamond)$, con neutros e_A y e_B , respectivamente. Demuestre:

a) $e_B = f(e_A)$

b) Si $a \in A$ tiene inverso b para $(A, \circ)$, entonces $f(a)$ tiene inverso $f(b)$ para $(B, \diamond)$

c) Supongamos que todos los elementos son invertibles. Un homomorfismo $f : A \rightarrow B$ de $(A, \circ)$ en $(B, \diamond)$ es un monomorfismo, si y solo si $f^{-1}(\{e_B\}) = \{e_A\}$