FI4004-1 Electrodinámica

Profesor: Simón Casassus.

Auxiliar: Matías Araya Satriani.

Tarea 2

Fecha de entrega: 5 de Diciembre

1. Un dipolo magnético $\vec{m}$ esta incrustado en el centro de una esfera (de radio R) de material magnético lineal (permeabilidad μ). Muestre que el campo magnético dentro de la esfera es:

$$\frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{1}{r} [3(\vec{m} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{m}] + \frac{2(\mu_0 - \mu)\vec{m}}{(2\mu_0 + \mu)} R^3 \right)$$

2. Dos esferas conductoras concéntricas de radio a y b tienen una carga de $\pm Q$. El espacio vacío entre las esferas es llenado a la mitad por un dieléctrico (con constante dieléctrica ϵ/ϵ_0), como se muestra en la figura:

- a Encuentre el campo eléctrico entre las esferas.
 - b Calcule la densidad de carga superficial de la esfera interior.
 - c Calcule la densidad de carga de polarización inducida en el dieléctrico en $r = a$.
3. Una esfera de radio a tiene una densidad de carga uniforme ω . La esfera rota con una velocidad angular constante w . Encuentre el potencial vector y la densidad de flujo magnético dentro y fuera de la esfera.
 4. Una carga puntual q se coloca en un espacio libre a una distancia d del centro de una esfera dieléctrica de radio a ($a < d$) y constante dieléctrica ϵ/ϵ_0 :
 - a Encuentre el potencial en todo el espacio como una expansión de armónicos esféricos.
 - b Calcule las componentes rectangulares del campo eléctrico *cerca* del centro de la esfera.
 - c Verifique que en el caso que $\epsilon/\epsilon_0 \rightarrow \infty$ se obtiene el mismo resultado que para la esfera conductora.