Auxiliar 4 - Efecto Zeeman y Estructura Fina

Profesor: Fernando Lund

Auxiliar: Nicolás Valdés

- P1.** Comente por qué el efecto Zeeman para nosotros es más “rico” que el efecto Stark.
- P2.** Cuando un átomo se coloca en presencia de un campo magnético externo los niveles de energía se desplazan. Este fenómeno se conoce como efecto Zeeman. La perturbación es

$$H_Z = -(\vec{\mu}_l + \vec{\mu}_s) \cdot \vec{B}_{ext} = \frac{e}{2m}(\vec{L} + 2\vec{S}) \cdot \vec{B}_{ext} \quad (1)$$

El efecto Zeeman puede ser grande o pequeño en comparación a las perturbaciones responsables de la estructura fina. Considerando los valores $e = 1.6 \times 10^{-19}C$, $\hbar = 1.05 \times 10^{-34}Js$, $\epsilon_0 = 8.9 \times 10^{-12}C^2/Nm^2$, $m = 9.1 \times 10^{-31}kg$, $a = 0.53 \times 10^{-10}m$,

- (a) Estime el campo magnético interno del átomo de hidrógeno en el acoplamiento spin-órbita,

$$\vec{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e}{mc^2 r^3} \vec{L}, \quad (2)$$

y caracterice cuantitativamente un campo de Zeeman “débil” y “fuerte”. ¿Es fácil preparar un campo de Zeeman fuerte? El campo magnético terrestre es $\sim 5 \times 10^{-5}T$.

Ahora consideramos un campo de Zeeman débil.

- (b) ¿Cuáles son los buenos números cuánticos en este caso?
- (c) Calcule explícitamente la corrección a la energía de los estados $n = 1$ y $n = 2$. Haga un diagrama representando la división de los niveles de energía debido primero a la estructura fina y luego al efecto Zeeman. La corrección debido a la estructura fina es

$$E_{fs} = \frac{E_n^2}{2mc^2} \left(3 - \frac{4n}{j + 1/2} \right) \quad (3)$$

- P3.** Suponga que el Hamiltoniano H de un sistema es función de algún parámetro λ . Sean $E_n(\lambda)$ y $\psi_n(\lambda)$ los autovalores y autoestados de $H(\lambda)$. Asumiendo que los E_n no son degenerados, o que si lo son, los ψ_n son la “buena” combinación de las autofunciones degeneradas, demuestre el teorema de Feynman-Hellman:

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle \psi_n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| \psi_n \right\rangle \quad (4)$$

- P4.** Calcule $\langle 1/r \rangle$ y $\langle 1/r^2 \rangle$ para el hidrógeno. Recuerde que

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}, \quad E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2(j_{max} + l + 1)^2} \quad (5)$$