

MA1002-4 Cálculo Diferencial e Integral**Profesor:** Leonardo Sánchez C.**Auxiliar:** Marcelo Navarro**Auxiliar 6: Aplicaciones de la Integral**

9 de noviembre de 2018

P1. a) Considerando la partición $P = \{0, \frac{1}{2}, 1\}$ demuestre que

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{e^{\frac{1}{4}}} + \frac{1}{e} \right) \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{e^{\frac{1}{4}}} \right)$$

b) Calcule $\int_a^b e^x dx$ usando una partición equiespaciada.**P2.** Sea f definida y acotada en $[a, b]$, Riemann-Integrable tal que $\forall x \in [a, b], f(x) \geq 0$. Pruebe que f^2 es también Riemann-Integrable en $[a, b]$.**P3. [Límites y Series]**

a)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$$

b) Demuestre que $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{n} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n}\right)}$ y luego calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sqrt[n]{\frac{(2n)!}{n!}}$

P4. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y no negativa en $[a, b]$. Pruebe que si $\int_a^b f(t) dt = 0$ entonces $f(t) = 0$, para todo $t \in [a, b]$

- Sea $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo. El conjunto $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ es una *partición del intervalo* $[a, b]$ si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Diremos que la norma de la partición P es:

$$|P| = \sup_{i \in \{1, \dots, n\}} \Delta x_i$$

donde $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ y denotamos al conjunto de todas las particiones de $[a, b]$ como $\mathcal{P}_{[a, b]}$.

Importante: notar que $(x_i - x_{i-1}) \leq |P|$

- Sea $P \in \mathcal{P}_{[a, b]}$ y $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definimos su suma superior e inferior como:

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad s(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

donde $M_i(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ y $m_i(f) = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$

- Si $P, Q \in \mathcal{P}_{[a, b]}$ y $P \subseteq Q$ tenemos que:

$$s(f, P) \leq s(f, Q) \leq S(f, Q) \leq S(f, P)$$

- Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ definimos su integral superior e inferior como:

$$\overline{\int_a^b f(x) dx} = \inf_{P \in \mathcal{P}_{[a, b]}} S(f, P)$$

$$\underline{\int_a^b f(x) dx} = \sup_{P \in \mathcal{P}_{[a, b]}} s(f, P)$$

- Diremos que una función es Riemann-Integrable (o simplemente integrable) si su integral superior e inferior coinciden. En dicho caso definimos la integral como:

$$\int_a^b f(x) = \overline{\int_a^b f(x)} = \underline{\int_a^b f(x)}$$

- **Criterio de Riemann:** una función f definida y acotada en $[a, b]$ es integrable si y sólo si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists P \in \mathcal{P}_{[a, b]}, S(f, P) - s(f, P) \leq \varepsilon$$

- Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es acotada y monótona, entonces es integrable en $[a, b]$.
- Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, entonces es integrable en $[a, b]$.
- Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua o acotada y monótona, entonces:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{|P| \rightarrow 0} s(f, P) = \lim_{|P| \rightarrow 0} S(f, P)$$

$$= \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x_i$$

Donde $\bar{x}_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

- Dos particiones comunes son la equiespaciada:

$$x_i = x_0 + i\Delta x = a + i \frac{b-a}{n}$$

y la geométrica: $x_i = aq^i = a \left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}} \right)^i$.

- Propiedades de la integral

- $\int_a^b c = c(b-a)$
- $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ si $f(x) \leq g(x)$ en todo $[a, b]$
- $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$

- **Segundo TFC:** Si f es integrable en $[a, b]$ y existe una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) tal que $F' = f$ en (a, b) . Entonces: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.