MA1102-3: Álgebra Lineal

Profesor: Jaime San Martín

Auxiliar: Felipe Hernández Castro

Auxiliar 5 - Preparación C1

22 de octubre de 2018

P1. [P2 C1 2011-2]

Sea $B \in \mathcal{M}_{nn}(\mathbb{R})$ invertible tal que satisface la condición $B^3 = 0$. Para cada $\lambda \in \mathbb{R}$ se define $M(\lambda) \in \mathcal{M}_{nn}(\mathbb{R})$ por :

$$M(\lambda) = I + \lambda B + \frac{\lambda^2}{2} B^2$$

(a) Pruebe que: $\forall \lambda, \beta \in \mathbb{R}, M(\lambda + \beta) = M(\lambda)M(\beta)$ y deduzca que $M(\beta)M(\lambda) = M(\lambda)M(\beta)$

(b) Pruebe que $M(\lambda)$ es invertible y que $M(\lambda)^{-1} = M(-\lambda)$.

P2. [P3 C1 2015-2]

Sea $J \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ la matriz definida por $J_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i + 1 \\ 0 & \text{si } j \neq i + 1 \end{cases}$

a) Probar que la matriz $D = J^2$ satisface:

$$D_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i + 2 \\ 0 & \text{si } j \neq i + 2 \end{cases}$$

b) Usando el resultado anterior demuestre por inducción en k que J^k es la matriz:

$$J_{ij}^k = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i + k \\ 0 & \text{si } j \neq i + k \end{cases}$$

Escriba la matriz J^n .

P3. [P1 C1 2011-2]

Considere el siguiente sistema lineal a coeficientes reales:

$$\begin{array}{rclcl} -x_1 & & + & \alpha x_3 & + & \beta x_4 & = & 0 \\ & x_2 & + & \alpha x_3 & + & \beta x_4 & = & 0 \\ \alpha x_1 & + & \beta x_2 & & & & = & 0 \\ \beta x_1 & + & \beta x_2 & + & \alpha x_3 & & = & 0 \end{array}$$

Determine las condiciones sobre los parámetros reales α y β que garanticen que el sistema tenga una única solución.

P4. [P3 C1 2014-1]

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Calcule mediante el método de Gauss la inversa de A.

P5. [P1 C2 2014-1] Sea $L_1 : \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a) Hallar la ecuación vectorial de la recta L_2 tal que interseca perpendicularmente a L_1 y contiene al punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcular la distancia entre L_2 y el punto $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$.
- b) Hallar la ecuación normal del plano Π que contiene a las rectas L_1 y L_2 .

P6. [P1 C2 2014-1]

- a) Encontrar la ecuación vectorial del plano Π_1 que contiene a los puntos $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- b) Sea L la recta de ecuación $L : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Encontrar las coordenadas de $P = \Pi_1 \cap L$.
- c) Hallar la ecuación del plano Π_2 que es paralelo a Π_1 y cumple que $d(P, Q) = 9$, donde $Q = \Pi_2 \cap L$.

P7. [P1 C2 2013-2]

- a) Sea $P \in \mathbb{R}^3$ un punto y L una recta de vector posición A y vector director d ($P \notin L$). Determine el punto Q , simétrico de P con respecto a L .
- b) Considere las rectas $L : x = A + \lambda d$, $\lambda \in \mathbb{R}$ y $L' : x = B + \mu d'$, $\mu \in \mathbb{R}$. Demuestre que el conjunto de puntos simétricos de cada punto de L' con respecto a L es una recta y determine su ecuación vectorial.

P8. [P3 C1 2009-2]

Sea $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ y W definido por

$$W = \{A \in \mathcal{M}_{nn}(\mathbb{R}) \mid A \text{ es simétrica y } \sum_{i=0}^n a_{ii} = 0\}$$

- a) Probar que W es s.e.v. de $\mathcal{M}_{nn}(\mathbb{R})$.
- b) Considere el caso $n = 3$ y las matrices de $\mathcal{M}_{33}(\mathbb{R})$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- 1) Pruebe que $\{A, B, C, D, E\}$ es l.i.
- 2) Pruebe que $W = \langle \{A, B, C, D, E\} \rangle$