MA1102-3: Álgebra Lineal

Profesor: Jaime San Martín

Auxiliar: Felipe Hernández Castro

Auxiliar 4 - Geometría II

17 de octubre de 2018

P1. Sea Π un plano, $L \subset \Pi$ una recta y sea $P \in \mathbb{R}^3$ un punto cualquiera. Denotamos:

- R a la proyección ortogonal de P sobre el plano Π .
- Q a la proyección ortogonal de P sobre la recta L .

Demuestre que si $R \neq Q$, entonces la recta que pasa por los puntos R y Q es perpendicular a la recta L .

P2. Sea $P = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ y Π_1 el plano que pasa por el origen y tiene vectores directores $d_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $d_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- (a) Calcule la proyección ortogonal P_0 de P sobre el plano Π_1 .
- (b) Calcule la ecuación de la recta L que se obtiene como la intersección de Π_1 con el plano Π_2 de ecuación $x + 2y = 2$
- (c) Calcule la proyección ortogonal de P_0 sobre la recta L .
- (d) Calcule la distancia de P a la recta L .

P3. Considere el plano:

$$\Pi : x + y + z = 1$$

Determine las coordenadas del punto proyección del origen sobre el plano Π y calcule la distancia del origen al plano Π

P4. Sean $p, d, n \in \mathbb{R}^3$ con $d \neq 0$ y $n \neq 0$, se definen los conjuntos:

$$L = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid (x - p) \times d = 0\}$$

$$\Pi = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \langle x, n \rangle = 0\}$$

- a) Demuestre que L es una recta.
- b) Encuentre las condiciones que deben satisfacer p , d y n para que $L \cap \Pi = \emptyset$

P5. Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$. Demuestre que x es ortogonal a y si y solo si $(\forall \lambda \in \mathbb{R}) \quad \|x + \lambda y\| \geq \|x\|$.

Resumen

- **[Producto cruz]:** Sean $x, y \in \mathbb{R}^3$, tales que $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, definimos el producto cruz $x \times y$ como el siguiente vector:

$$x \times y = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix} = \hat{i} \begin{vmatrix} x_2 & x_3 \\ y_2 & y_3 \end{vmatrix} - \hat{j} \begin{vmatrix} x_1 & x_3 \\ y_1 & y_3 \end{vmatrix} + \hat{k} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

En donde:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

- **[Propiedades del producto cruz]:**
 - $x \times x = 0$
 - $v \times (x + y) = v \times x + v \times y$, es decir, el producto cruz distribuye con respecto a la suma.
 - Si $z = x \times y$, entonces z es perpendicular a x e y , es decir: $\langle z, x \rangle = 0 = \langle z, y \rangle$
 - $x \times y = -y \times x$, es decir, el producto cruz es antisimétrico.
 - La norma del producto cruz esta dada por $\|x \times y\| = \|x\| \|y\| |\text{sen}\theta|$ con θ el ángulo que subtienden x e y .
 - Dados $x, y \in \mathbb{R}^3 - \{0\}$ tales que $x \times y = 0$ entonces $(x \parallel y)$
- **[Proyección de un punto a una recta]:** Sea $L : p + \lambda d$ una recta y q un punto en $\mathbb{R}^3$. Si llamamos r a la proyección de q sobre L , entonces tenemos que:

$$r = p + \langle q - p, \hat{d} \rangle \hat{d}$$

Donde $\hat{d} = \frac{d}{\|d\|}$

- **[Proyección de un punto a un plano]:** Sea $\Pi : \langle x - p, n \rangle$ un plano y q un punto en $\mathbb{R}^3$. Si llamamos r a la proyección de q sobre Π , entonces tenemos que:

$$r = q + \langle p - q, \hat{n} \rangle \hat{n}$$

- **[Distancia de un punto a un plano]:** Dado un plano Π cuya ecuación cartesiana este dada por: $Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 + D = 0$ y q un punto en $\mathbb{R}^3$. Entonces se tiene que:

$$d(q, \Pi) = \frac{|Aq_1 + Bq_2 + Cq_3 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$