Pauta P2(a), Auxiliar 11

Profesor: Patricio Aceituno

Auxiliares: César Gallegos, Gabriel Cáceres y Mauricio Rojas

2. Considere dos anillos de masa m cada uno, que deslizan con roce despreciable, uno por una barra horizontal (A_h) y el otro por una barra vertical (A_v) manteniéndose unidos por una cuerda de largo L . El anillo A_h está atado a un resorte de constante elástica k y largo natural L_0 , como se indica en la Figura 1. Estando el sistema en posición de equilibrio se impulsa el anillo A_h hacia la derecha con una velocidad inicial v_0 .

(a) Pruebe que la suma de los trabajos que realizan las fuerzas de tensión de la cuerda sobre los dos anillos es nula.

Figure 1: A la izquierda está el diagrama del problema 2. A la derecha está el diagrama del problema 3.

(a) Para comenzar vamos a definir el origen en la esquina del triángulo que se forma por las dos masas. Además vamos a definir la distancia x desde el origen hasta la masa horizontal, y la distancia y desde el origen hasta la masa vertical. Notemos que durante todo el movimiento $x > 0$ e $y < 0$. Además notemos que al ser un triángulo rectángulo, se cumple que

$$x^2 + y^2 = L^2 . \quad (1)$$

Ahora vamos a escribir correctamente las tensiones que va a cada masa. Comencemos con al tensión que va sobre la masa horizontal, que es

$$\vec{T}_h = T_h(-\sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j}) , \quad (2)$$

con θ el ángulo que se forma entre la vertical y la cuerda que conecta ambas masas. Por otra parte, para la masa vertical

$$\vec{T}_v = T_v(\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j}) . \quad (3)$$

Notemos que ambas expresiones se han escrito de manera vectorial y la información del signo está dentro del parentesis, de esta manera $T_v > 0$ y $T_h > 0$. Y dado que la cuerda es inextensible $T_v = T_h = T$.

Ahora que tenemos las fuerzas involucradas, vamos a definir un dominio de integración arbitrario para poder calcular el trabajo. Sea x_0 el punto de inicial para la masa horizontal y x_f su punto final. Además dada la ecuación 1, podemos encontrar el punto inicial para la masa vertical usando $x_0^2 + y_0^2 = L^2$, además del punto final usando $x_f^2 + y_f^2 = L^2$. Remarquemos que cuando la masa horizontal está en x_0 entonces la masa vertical está en y_0 , y cuando la masa horizontal está en x_f entonces la masa vertical está en y_f . Ahora, vamos a calcular el trabajo sobre la masa horizontal

$$W_h = \int_{x_0}^{x_f} \vec{T}_h d\vec{x} \quad (4)$$

$$= \int_{x_0}^{x_f} T(-\sin \theta \hat{i} - \cos \theta \hat{j})(\hat{i} dx) \quad (5)$$

$$= - \int_{x_0}^{x_f} T \sin \theta dx . \quad (6)$$

Y para la masa vertical

$$W_v = \int_{y_0}^{y_f} \vec{T}_v d\vec{y} \quad (7)$$

$$= \int_{y_0}^{y_f} T(\sin \theta \hat{i} + \cos \theta \hat{j})(\hat{j} dy) \quad (8)$$

$$= \int_{y_0}^{y_f} T \cos \theta dy . \quad (9)$$

Antes de continuar vamos a fijar nuestra atención en las funciones trigonométricas dentro de las integrales. Por geometría, es evidente que

$$\sin \theta = \frac{x}{L} , \quad (10)$$

por otra parte, no es tan evidente que

$$\cos \theta = \frac{|y|}{L} \quad (11)$$

$$= \frac{-y}{L} , \quad (12)$$

esto debe ser así puesto que $\cos\theta$ debe ser mayor que cero e y es menor que cero, por lo tanto debemos corregir el signo. Al reemplazar esto en el trabajo vemos que

$$W_h = - \int_{x_0}^{x_f} T \frac{x}{L} dx , \quad (13)$$

$$W_v = \int_{y_0}^{y_f} T \frac{-y}{L} dy . \quad (14)$$

Tomando la forma diferencial de la ecuación (1)

$$2x dx + 2y dy = 0 , \quad (15)$$

y por lo tanto

$$dy = - \frac{x}{y} dx , \quad (16)$$

y todo esto para hacer un cambio de variable en el trabajo vertical. Al hacer el cambio de variable de $y \rightarrow x$ en la integral también debemos cambiar los límites de integración $y_0 \rightarrow x_0$ e $y_f \rightarrow x_f$. Y de esta forma, el trabajo vertical queda

$$W_v = \int_{x_0}^{x_f} T \frac{-y}{L} \left(-\frac{x}{y} dx\right) \quad (17)$$

$$= \int_{x_0}^{x_f} T \frac{x}{L} dx , \quad (18)$$

y si sumamos ambos trabajos

$$W_h + W_v = \int_{x_0}^{x_f} T \frac{x}{L} dx - \int_{x_0}^{x_f} T \frac{x}{L} dx \quad (19)$$

$$= 0 . \quad (20)$$