

Índice general

Índice general	1
0 Prefacio	2
1 Cardinalidad.	3
1.1. Conjuntos, secuencias y palabras.	3
1.2. Cardinales finitos y principio biyectivo.	5
1.3. Principio Inyectivo y Principio Sobreyectivo	7
1.4. Demostraciones Combinatorias. Principios de la suma y el producto.	8
1.5. Multiconteo o sobreconteo	12
1.6. Principio general del producto. Ordenamientos.	12
1.7. Ordenamientos circulares.	14
1.8. Ejercicios	14
2 Selecciones de elementos.	17
2.1. Selecciones de objetos de un conjunto fijo	17
2.2. Variaciones, ordenamientos y permutaciones de un conjunto.	19
2.3. Combinaciones: subconjuntos y multiconjuntos	20
2.4. Ejercicios	22

Capítulo 0

Prefacio

Este texto surge a partir de las clases del Curso de Combinatoria realizadas los años 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019 en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y puede ser usado como un apunte o guía de referencia. El texto está en gran medida basado en la versión del curso dictada por Martín Matamala y por mí en años anteriores, complementado con material creado para cursos para profesores de educación media en combinatoria en conjunto con el CMAT (campeonato nacional de matemática) de Chile. Incluye bastante material a modo de referencia, no necesariamente visto en clase, sino que discutido con alumnos y auxiliares fuera de clase.

El material está pensado para ser usado por alumnos de pregrado que ya hayan alcanzado cierta madurez matemática o alumnos iniciando su posgrado. El ritmo del apunte es mucho más lento que el ritmo de un curso completo – en una clase es posible cubrir muchas páginas de material– esto es particularmente cierto para las secciones introductorias. No obstante lo anterior, gran parte del material puede ser adaptado a un nivel avanzado pre-universitaria.

Una advertencia: muchos de los ejemplos iniciales de cada sección son rudimentarios y simples. Estos no deben ser usado como una medida de la dificultad de los problemas que pretendemos atacar, sino más bien como una forma de *digerir* nociones nuevas.

Este borrador contiene con alta probabilidad errores de tipeo y formato. Si encuentra alguno por favor comuníquelo al correo electrónico jsoto@dim.uchile.cl.

José A. Soto.
Julio 2019.

Capítulo 1

Cardinalidad.

La Combinatoria es un área de la Matemática muy amplia a la que se le asocia el estudio de *estructuras finitas* o *discretas*. Aspectos de la Combinatoria incluyen *contar* estructuras de cierto tipo o decidir su *existencia*. En estas notas nos enfocaremos en problemas de *combinatoria enumerativa*. Es decir, problemas relacionados con determinar la cardinalidad de conjuntos de objetos. Supondremos conocidas estructuras básicas en Matemática: conjuntos, funciones y relaciones. Asimismo, usaremos elementos básicos de álgebra, cálculo y probabilidades, sin llegar a ser estos requisitos fuertes. Cada vez que necesitemos notación especial la definiremos.

1.1. Conjuntos, secuencias y palabras.

Definición 1.1 (Conjuntos típicos). $\mathcal{P}(X) = \{A : A \subseteq X\}$ denota al conjunto potencia del conjunto X . Usamos $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ para denotar a los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos respectivamente. Para $n \in \mathbb{N}$, denotamos $[n] = \{j \in \mathbb{N} : 1 \leq j \leq n\} = \{1, 2, \dots, n\}$ y $\mathbb{N}_n = \{j \in \mathbb{N} : j < n\} = \{0, 1, \dots, n-1\}$. En particular, $\mathbb{N}_0 = [0] = \emptyset$. Finalmente, el super-índice $+$ indica restricción a números reales positivos ($\mathbb{N}^+ = \mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}^+, \mathbb{R}^+$).

Definición 1.2 (Corchete de Iverson). La expresión $\llbracket P \rrbracket$ vale 1 si P es una proposición verdadera, y vale 0 en otro caso.

Esta notación es muy versátil. Por ejemplo, la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \text{ es par,} \\ x & \text{si } x \text{ es impar,} \end{cases}$ se puede escribir como $f(x) = x + 2\llbracket x \text{ es par} \rrbracket$. La primera forma de definir f es mejor en claridad, mientras que la segunda es más compacta. Por convención evaluamos a 0 todos los productos de tipo $\llbracket F \rrbracket \cdot J$, donde J es cualquier cosa (incluso algo indefinido o sin sentido) y F es falso. Por ejemplo, para todo $a \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$ se tiene la igualdad:

$$\sum_{k=0}^n a^k = \llbracket a \neq 1 \rrbracket \frac{a^n - 1}{a - 1} + \llbracket a = 1 \rrbracket (n + 1),$$

donde el primer término para el caso $a = 1$ es 0 por un término indefinido.

El corchete de Iverson también permite manipular sumas múltiples con facilidad:

$$\sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^i j = \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j \in \mathbb{N}} j \llbracket j \leq i \rrbracket \llbracket i \leq N \rrbracket = \sum_{i \in \mathbb{N}} \sum_{j \in \mathbb{N}} j \llbracket j \leq i \leq N \rrbracket = \sum_{j \in \mathbb{N}} \sum_{i \in \mathbb{N}} j \llbracket j \leq N \rrbracket \llbracket j \leq i \leq N \rrbracket = \sum_{j=0}^N j \sum_{i=j}^N 1.$$

Para evitar sobrecargar notación de sumas, siempre supondremos que el índice a sumar pertenece a los naturales (de no ser así, lo indicaremos). Por ello, si el límite inferior es 0, se omitirá. Así,

$$\sum_i a_i := \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i; \quad \sum_i^k a_i := \sum_{i=0}^k a_i.$$

Trabajaremos bastante con secuencias y palabras, que formalizamos a continuación.

Definición 1.3 (Alfabeto, secuencias y palabras). Sea Σ un conjunto cualquiera llamado *alfabeto* cuyos elementos se llaman *símbolos*, *letras* o *dígitos*. Una *secuencia* sobre Σ , de largo $k \in \mathbb{N}$, es una función $w: [k] \rightarrow \Sigma$, donde usamos la notación w_i en vez de $w(i)$ para la evaluación de w en i . Llamamos Σ^k al conjunto de todas las secuencias de largo k . Usamos *notación de secuencias* $w = (w_1, \dots, w_k)$ o *notación de palabras* $w = w_1 w_2 \cdots w_k$ para referirnos a un objeto $w \in \Sigma^k$.

Observación 1.4. La notación de palabras es, solo eso, una notación y como tal puede ser ambigua. Por ejemplo, si por mala suerte, nuestro alfabeto fuera $\Sigma = \{a, aa\}$, entonces no es claro si aa se refiere a la palabra de largo 1 (aa) o a la palabra de largo 2 (a, a). Para evitar esto, solo usaremos alfabetos con símbolos cuya escritura no admita confusiones como esta.

Definición 1.5 (Palabra vacía). Denotamos a la palabra vacía, i.e., al único elemento de Σ^0 , por ε .

Observación 1.6. Un detalle muy técnico respecto a funciones y palabras. Usualmente dos funciones con distinto codominio se consideran distintas incluso si tienen igual asignación, sin embargo para el caso de palabras se considerarán iguales. Por ejemplo la palabra $w = ab$ puede verse como una función $w: [2] \rightarrow \{a, b\}$ sobre el alfabeto $\{a, b\}$ o como una función $w: [2] \rightarrow \{a, b, c\}$ sobre un alfabeto más grande. En rigor, ambas funciones son distintas, pero nosotros las consideraremos iguales. Así, por ejemplo, la palabra vacía ε resulta ser única independiente del alfabeto utilizado.

Por ejemplo, si $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, se tiene que $aba \in \Sigma^3$, $cada \in \Sigma^4$, etc. Además, es importante aclarar qué pasa para $\Sigma = \emptyset$. En dicho caso,

$$\emptyset^k = \begin{cases} \emptyset, & \text{si } k \geq 1. \\ \{\varepsilon\}, & \text{si } k = 0. \end{cases}$$

Definición 1.7 (Conjunto de palabras. Lenguajes). El conjunto de todas las palabras sobre Σ se denota por Σ^* . Luego,

$$\Sigma^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \Sigma^k.$$

Denominamos *lenguaje* sobre Σ a todo conjunto de palabras, es decir a todo subconjunto de Σ^* . Denominamos *subalfabeto* a todo subconjunto de Σ .

Definición 1.8 (Largo, concatenación, potencias). Si $w \in \Sigma^*$, denotamos al largo de w como $|w|$. Dadas dos palabras $w, w' \in \Sigma^*$, podemos definir su concatenación como la palabra $ww' \in \Sigma^*$, que tiene largo $|w| + |w'|$. Notamos que concatenar es una operación asociativa y no conmutativa, con elemento neutro la palabra vacía ε . Identificamos Σ^1 con Σ , es decir no hacemos diferencia entre un símbolo y la palabra que tiene dicho símbolo. Usamos notación de potencia ($w^0 = \varepsilon$; $w^k = w^{k-1}w$, para $k \geq 1$) para concatenación iterada. Por ejemplo: $(01^30)^2 = 0111001110$ y $ab^0a = aa$. Como estructura algebraica, Σ^* con la operación concatenar es el monoide libre sobre Σ .

Definición 1.9 (Concatenación de lenguajes). Dados dos lenguajes B y C sobre el mismo alfabeto Σ ,

$$B \circ C = BC = \{bc : b \in B, c \in C\}$$

denota al lenguaje que contiene todas las concatenaciones de palabras de B con palabras de C . Usaremos la notación $B^{\circ k}$ para denotar la concatenación iterada de un lenguaje B consigo mismo k veces y llamamos $B^* = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} B^{\circ k}$. (Notamos que $\Sigma^k = \Sigma^{\circ k}$ por lo cual no hay confusión al escribir Σ^*).

Definición 1.10 (Concatenación de subalfabetos corresponde a producto de conjuntos). Sean A_1, \dots, A_k una secuencia de subconjuntos de un alfabeto Σ . Se define su **producto** como su concatenación, es decir como el lenguaje que contiene todas las palabras sobre B , de largo k , tal que su i -ésimo símbolo está en A_i . Es decir,

$$\prod_{i=1}^k A_i = \{w \in \Sigma^k : w_i \in A_i, \forall i \in [k]\}.$$

Recordando que las palabras son secuencias, $\prod_{i=1}^k A_i$ corresponde a la definición clásica de producto finito de conjuntos, donde el alfabeto es la unión de los conjuntos que participan del producto.

Observación 1.11. ¡Cuidado! la concatenación de lenguajes y el producto de lenguajes pueden ser diferentes. Por ejemplo, si $\Sigma = \{a\}$ y $A = \{a, aa\}$ entonces $\prod_{i=1}^2 A = A \times A = \{(a, a), (a, aa), (aa, a), (aa, aa)\}$ tiene 4 elementos pero $A \circ A = \{aa, aaa, aaaa\}$ tiene 3 elementos.

Siempre será importante detenernos a entender *para que valores de k tiene sentido la definición anterior*. Ciertamente tiene sentido para $k \geq 1$. El caso $k = 0$ se ve un poco extraño:

$$\prod_{i=1}^0 A_i = \{w \in \Sigma^0 : w_i \in A_i, \forall i \in [0]\} = \{\varepsilon\}.$$

En otras palabras el producto vacío de conjuntos resulta tener un elemento: la palabra vacía.

Observación 1.12. Si todos los A_i son iguales a un conjunto dado, digamos $A \subseteq \Sigma$, entonces se obtiene la siguiente propiedad natural. Para todo $k \in \mathbb{N}$

$$\prod_{i=1}^k A = A^k.$$

1.2. Cardinales finitos y principio biyectivo.

Cuando le pedimos a alguien que *cuente* los elementos de un conjunto probablemente ella comenzará a marcar cada elemento asociando a cada elemento marcado un número: *uno, dos, tres,...* hasta terminar con los elementos. De seguro responderá que la cantidad de elementos corresponde al último número, digamos n , dicho¹. En consecuencia, lo que en verdad está haciendo esta persona es encontrar una correspondencia entre los objetos a contar y un conjunto básico y conocido de referencia (el conjunto $[n]$). Este proceso se puede hacer ciertamente sin necesidad de usar $[n]$ como conjunto de referencia: Un niño pequeño puede contar antes de saber los nombres de los números. Por ejemplo, en vez de decir la cantidad de elementos, levantará *tantos dedos* como elementos ha visto.

Así, vemos que la definición más básica para contar no es la de “declarar una cantidad” sino más bien la de “poner en correspondencia dos conjuntos”.

Definición 1.13. Equipotencia.

Dos conjuntos A y B se dicen *equipotentes* o *equinumerosos* si existe $f: A \rightarrow B$ función biyectiva. Anotamos en este caso $|A| = |B|$. También decimos (informalmente) que A y B tienen el mismo número de elementos.

Otra forma de interpretar la definición de equipotencia es la siguiente

Definición 1.14. Principio Biyectivo. Probar que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos equivale a encontrar una biyección entre ambos.

Observación 1.15. Ser equipotente es relación² de equivalencia (pruébelo como ejercicio). Luego también

¹Si no alcanza a decir nada, entonces responderá que hay cero elementos.

²No se preocupe sobre cual es el conjunto maximal (¡no hay!) donde esta relación está definida, esto es tema para otro curso.

se puede probar que dos conjuntos son equipotentes exhibiendo un tercer conjunto que sea equipotente con ambos.

Notamos que en la definición de equipotencia, la expresión $|A|$ por sí sola no significa nada; pero la expresión $|A| = |B|$ significa que hay una biyección de A en B . Deseamos también poder declarar cuantos elementos tiene un conjunto. Para esto usamos la siguiente definición.

Definición 1.16. Cardinales finitos.

Sea A conjunto y $n \in \mathbb{N}$. Escribimos $|A| = n$ si $|A| = |[n]|$ y decimos en este caso que *el cardinal* de A es n . Decimos que el conjunto A es *finito* si existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $|A| = n$. De otro modo decimos que A es infinito.

Observación 1.17. Para que la expresión $|A| = n$ esté bien definida, es necesario probar que n es el único número natural para el cual $|A| = |[n]|$. De otra forma la notación deja de ser útil ya que podríamos tener que $|A| = n \neq m = |A|$. Dejamos esta demostración como ejercicio (Ejercicio 1.2) al final de la sección.

Informalmente, $|\cdot|$ es una función “cardinalidad” cuyo valor está bien definido para conjuntos finitos.

Comentario 1.18. La definición anterior de cardinal como función es poco rigurosa y no es útil para cardinales infinitos. Otra solución, un poco mejor, es considerar a la equipotencia es una relación de equivalencia y que $|A|$ es la clase de A para esta relación.

Observación 1.19. Al decir que A tiene n elementos, estamos afirmando que existe una biyección $a: [n] \rightarrow A$, y luego, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Decimos que a enumera A .

Veamos un par de ejemplos para ejercitar las nociones anteriores.

Ejemplo 1.20. Sean A_1, \dots, A_k conjuntos con $k \geq 2$, y $A = \times_{i=1}^k A_i = (\dots((A_1 \times A_2) \times A_3) \times \dots) \times A_k$. Pruebe que $|A_1 \times A_2| = |A_2 \times A_1|$ y que $|A| = |\prod_{i=1}^k A_i|$.

Solución. Use la biyección $A_1 \times A_2 \rightarrow A_2 \times A_1$, dada por $(a, b) \mapsto (b, a)$. Para el segundo ejemplo usamos la biyección que asigna $((((a_1, a_2), a_3), \dots), a_k) \mapsto (a_1, a_2, a_3, \dots, a_k)$ \square

La biyección anterior entre producto cartesiano y producto es la que justifica escribir $A \times A \times A = A^3$.

Ejemplo 1.21. Pruebe que $|\mathbb{N}_n| = n$.

Solución. En efecto, la función $\mathbb{N}_n \rightarrow [n]$ dada por $i \mapsto i + 1$ es biyectiva (su inversa es $j \mapsto j - 1$). \square

Ejemplo 1.22. En un campeonato de fútbol juegan n equipos en una modalidad de eliminación: cada vez que un equipo pierde un partido, sale del campeonato. Además, cada partido debe tener un ganador y un perdedor (no hay empates). ¿Cuál el número mínimo y máximo de partidos que se deben jugar para que quede un solo equipo no eliminado?

Solución. La pregunta está formulada de manera que no entregue pistas hacia su solución. La verdad es que la respuesta es que se deben jugar exactamente $n - 1$ partidos. Para ver esto, basta notar que existe una biyección entre el conjunto de partidos jugados y el conjunto de equipos eliminados (hay un perdedor por cada partido que es eliminado, y estos no se pueden repetir). Por lo tanto si deseamos que hayan $n - 1$ eliminados, deberán jugarse $n - 1$ partidos. \square

El ejemplo anterior muestra lo simple y curiosamente útil que es el principio biyectivo. Otro ejemplo similar se encuentra en el Ejercicio 1.1 al final de este capítulo.

1.3. Principio Inyectivo y Principio Sobreyectivo

Primero enunciaremos un resultado auxiliar simple de probar:

Lema 1.23. Para todo $n \in \mathbb{N}$, si $X \subseteq [n]$ entonces X es finito y $|X| \leq n$.

Demostración. Como el único subconjunto de $[0] = \emptyset$ es $[0] = \emptyset$ que es finito, el resultado vale para $n = 0$. Sea $n \geq 1$, y sea $X \subseteq [n]$. Si $X = [n]$ entonces $|X| = n$ y X es finito. Si $X \subseteq [n-1]$ entonces, por inducción, X es finito y $|X| \leq n-1$. El caso restante es que $n \in X \subseteq [n]$, luego debe existir $a < n$, $a \notin X$. Sea $Y = X \setminus \{n\} \cup \{a\}$. La biyección $f: X \rightarrow Y$ dada por $f(n) = a$ y $f(x) = x$ para todo $x \in X \setminus \{n\}$ muestra que $|X| = |Y|$. Por otro lado $Y \subseteq [n-1]$, Y es finito. Por lo tanto X es finito y $|X| = |Y| \leq n-1$. \square

Proposición 1.24 (Principio Inyectivo). Sean A y B conjuntos donde B es finito.

A es finito y $|A| \leq |B|$ si y solo si existe una inyección de A a B .

Demostración. (\Rightarrow) Sean $n = |A| \leq |B| = m$ y $f: A \rightarrow [n] \subseteq [m]$, $g: [m] \rightarrow B$ biyecciones. Su composición $h: A \rightarrow B$ dada por $h(x) = g(f(x))$ es inyectiva.

(\Leftarrow) Sea $h: A \rightarrow B$ una función inyectiva y sea $g: B \rightarrow [m] = |B|$ una biyección. Luego $f = g \circ h: A \rightarrow [n]$ es inyectiva. Como f es biyección entre A y $f(A) \subseteq [n]$, tenemos del lema anterior que $|A| = |f(A)| \leq n = |B|$. \square

Comentario 1.25. El principio inyectivo enunciado anteriormente para cardinales finitos, se entiende como una *definición* para cardinales generales: $|A| \leq |B|$ se define como la existencia de una función inyectiva de A en B .

Otra forma de interpretar el principio anterior es el siguiente.

Proposición 1.26. (**Principio Inyectivo**) (*informal*) Para probar que un conjunto tiene una cantidad menor o igual de elementos que otro, basta encontrar una inyección del primer conjunto al segundo. En particular, si se encuentra una inyección de A en B , y una inyección de B en A , entonces A y B tienen el mismo cardinal.

Comentario 1.27. La última afirmación también es cierta para conjuntos infinitos, y se conoce como el Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein (este teorema no requiere del axioma de elección).

Una variante del principio anterior es la siguiente

Proposición 1.28 (Principio Sobreyectivo). Sean A y B conjuntos donde B es finito.

A es finito y $|A| \leq |B|$ si y solo si existe una función sobreyectiva de B a A .

Demostración. (\Rightarrow) Sean $n = |A| \leq |B| = m$ y $f: [n] \rightarrow A$ y $g: B \rightarrow [m]$ biyecciones. Defina $f': [m] \rightarrow A$ como $f'(x) = f(\min(x, n))$. Como f es sobreyectiva y coincide con f' en $\text{Dom}(f) = [n]$, f' también es sobreyectiva. Como la composición de funciones sobreyectivas es sobreyectiva, concluimos que $f' \circ g: B \rightarrow A$ es sobreyectiva.

(\Leftarrow) Sea $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ y $h: B \rightarrow A$ una función sobreyectiva. La función $g: A \rightarrow B$ dada por $g(a) = b_i$ donde i es el mínimo índice tal que $h(b_i) = a$ está bien definida (siempre existe este índice pues $h^{-1}(\{a\}) \neq \emptyset$ y \mathbb{N} es bien ordenado). Además es fácil ver que h es inyectiva. Por la proposición anterior A es finito y $|A| \leq |B|$. \square

Comentario 1.29. La versión para conjuntos infinitos del principio sobreyectivo sirve solo si se supone el axioma de elección.

Podemos describir el principio sobreyectivo de una manera coloquial como sigue.

Proposición 1.30. (Principio Sobreyectivo) (informal) Para probar que un conjunto tiene una cantidad menor o igual de elementos que otro, basta encontrar una sobreyección del segundo conjunto al primero. En particular, si se encuentra una sobreyección de A en B , y una sobreyección de B en A , entonces A y B tienen el mismo cardinal.

Los principios anteriores distintas maneras de probar que dos conjuntos tienen el mismo cardinal.

Corolario 1.31. Sean A y B dos conjuntos finitos. Los siguientes son equivalentes.

1. $|A| = |B|$.
2. Existe una inyección de A en B y una inyección de B en A .
3. Existe una sobreyección de A en B y una sobreyección de B en A .
4. Existe una inyección de A en B y una sobreyección de A en B .

Demostración. Directa de los principios inyectivo y sobreyectivos. □

Como para números naturales hay tricotomía (para $a, b \in \mathbb{N}$, $a < b$, $a > b$ o $a = b$) concluimos como corolario:

Corolario 1.32. Si A y B son dos conjuntos finitos entonces exactamente una de las siguientes se cumple:

1. Existe una inyección de A en B no sobreyectiva.
2. Existe una sobreyección de A en B no inyectiva.
3. Existe una biyección de A en B .

1.4. Demostraciones Combinatorias. Principios de la suma y el producto.

Una aplicación importante de todos los principios que hemos enunciado es que nos permiten en varios casos demostrar identidades usando argumentos combinatoriales.

Definición 1.33. Para probar una identidad del tipo $r = s$, donde r y s son expresiones aritméticas que se evalúan a números naturales, podemos encontrar conjuntos R y S , con $|R| = r$ y $|S| = s$ y luego encontrar una biyección entre R y S . A este tipo de demostraciones se le conoce como **demostración combinatorial**. El método anterior se extiende también para probar desigualdades $r \leq s$. En dicho caso basta encontrar una inyección de R en S o una sobreyección de S en R .

Estamos listos para formalizar dos principios básicos para el conteo: los principios de la suma y del producto.

Definición 1.34. Principio de la suma. Sean A y B conjuntos finitos *disjuntos* entonces

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

Definición 1.35. Principio del producto. Sean A y B conjuntos finitos.

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|.$$

Los principios de la suma y del producto tradicionalmente se enuncian de manera coloquial como sigue.

Definición 1.36. Principio de la suma (informal) Si una actividad se puede realizar de a maneras y una segunda actividad se puede realizar de b maneras. Entonces existe un total de $a + b$ maneras de realizar *exactamente una* de las dos actividades.

Definición 1.37. Principio del producto (informal) Si hay a formas de hacer una actividad y b maneras de hacer una segunda actividad entonces existen $a \cdot b$ formas de realizar *ambas* actividades de manera secuencial.

Demostración combinatorial del principio de la suma. Sean $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ conjuntos finitos disjuntos. La función $f: [n + m] \rightarrow A \cup B$ dada por $f(i) = \begin{cases} a_i & \text{si } i \in [n], \\ b_{i-n} & \text{si } n + 1 \leq i \leq n + m \end{cases}$ es una biyección. \square

Demostración combinatorial del principio del producto. Sean $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ conjuntos finitos. La función $f: A \times B \rightarrow [n \cdot m]$ dada por $f(a_i, b_j) = (i - 1)m + j$ es una biyección. \square

Ejemplo 1.38.

1. Una alumna debe elegir un ramo electivo para llenar su curriculum. El departamento de matemáticas ofrece 12 ramos electivos que ella puede tomar y el departamento de física ofrece 9. Como los cursos son distintos, el principio de la suma nos dice que ella tiene $12 + 9 = 21$ opciones.
2. Un menú simple en el casino consiste de un plato de entrada y un plato de fondo. El casino ofrece cada día 3 opciones de platos de entrada y 2 de platos de fondo. Luego el número de menús simples distintos es $3 \cdot 2 = 6$.

Algunas consecuencias inmediatas de lo que tenemos hasta ahora:

Corolario 1.39. Sean A, B, C, D conjuntos finitos.

1. (Principio de la Diferencia) $|B \setminus A| = |B| - |A \cap B|$.
2. (Principio de inclusión-exclusión básico: cardinalidad es modular) $|A \cup B| + |A \cap B| = |A| + |B|$.
3. $|A \Delta B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$.
4. $|(A \times A) \cap (B \times B)| = |A \cap B|^2$.
5. $|(A \times B) \cap (C \times D)| = |A \cap C| \cdot |B \cap D|$.

Demostración. Ejercicio 1.4. \square

Los principios de la suma y del producto se generalizan inmediatamente a múltiples conjuntos.

Proposición 1.40 (Principio de la Suma). Si $\{A_1, \dots, A_k\}$ es una colección de conjuntos disjuntos cuya unión es A entonces $|A| = \sum_{i=1}^k |A_i|$. Esto vale incluso si $k = 0$, en cuyo caso $A = \emptyset$, $|A| = 0$ y $\sum_{i=1}^0 |A_i| = 0$.

Proposición 1.41 (Principio del Producto). Si (A_1, \dots, A_k) es una secuencia finita de conjuntos finitos entonces $|\times_{i=1}^k A_i| = |\prod_{i=1}^k A_i| = \prod_{i=1}^k |A_i|$. Esto vale incluso si $k = 0$, en cuyo caso, $\prod_{i=1}^0 A_i = \times_{i=1}^0 A_i = \{\varepsilon\}$ y luego $|\prod_{i=1}^0 A_i| = 1 = \prod_{i=1}^0 |A_i|$.

Los principios anteriores se prueban por inducción en k o directamente, de manera combinatorial.

Corolario 1.42. Para todo conjunto finito A y todo $k \in \mathbb{N}$, $|A^k| = |A|^k$, donde entendemos (como siempre en aritmética natural) que $0^0 = 1$.

Recordemos que A^k no es más que una notación agradable para denotar al conjunto de funciones de $[k]$ en A . Esta notación es muy flexible y se extiende como sigue.

Definición 1.43. El conjunto de funciones de A en B se denota como B^A .

Con esto $A^{[k]} = A^k$ por definición.

Proposición 1.44. Para A y B finitos,

$$|B^A| = |B|^{|A|}.$$

Demostración. Sea $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, con $n = |A|$. La función $\varphi: B^A \rightarrow B^n$ dada por $\varphi(f)_i = f(a_i)$ es una biyección. \square

Ejemplo 1.45.

1. ¿Cuántos números naturales entre 1 y 1000 comienzan por la cifra 6?

Solución: Separemos estos números por cantidad de cifras. De una cifra, hay 1 número que comienza por 6 (el 6). De dos cifras, tenemos los 10 números entre 60 y 69. De tres cifras tenemos los 100 números entre 600 y 699. Luego en total hay $1 + 10 + 100 = 111$ números que satisfacen lo pedido.

2. ¿Cuántos números naturales de a lo más 5 cifras se escriben sin usar la cifra 5?

Solución: Hay al menos dos formas de contar este conjunto. Una de ellas involucra contar mediante el principio de producto la cantidad de números de i cifras que se escriben sin el 5, y luego sumar las cardinalidades sobre todo i . Esta manera si bien es válida, es algo larga y merece cuidado: Se debe recordar que los números de i cifras (con $i \geq 2$) no pueden empezar con la cifra 0.

Una solución alternativa es encontrar una biyección entre el conjunto contado y las secuencias $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ donde cada a_i puede ser uno de los 9 elementos de $\mathbb{N}_{10} \setminus \{5\}$. La biyección consiste en completar cada número con 0's a la izquierda. El principio del producto nos garantiza entonces que hay 9^5 números.

Ejemplo 1.46. Probar combinatorialmente que para todo número $n \in \mathbb{N}^+$,

$$n^2 = (n+1)(n-1) + 1.$$

Solución: El lado izquierdo es la cardinalidad de $Y = [n]^2$, mientras que el lado derecho es la cardinalidad del conjunto $X = ([n+1] \times [n-1]) \cup \{(n+1, n)\}$. Se puede obtener una biyección de X en Y notando que

$$\begin{aligned} X &= [n] \times [n-1] \cup \{n+1\} \times [n]. \\ Y &= [n] \times [n-1] \cup [n] \times \{n\}. \end{aligned}$$

es fácil entonces escribir la biyección

$$(x, y) \mapsto \begin{cases} (x, y) & \text{si } (x, y) \in [n] \times [n-1], \\ (y, n) & \text{si } (x, y) = (n+1, y) \in \{n+1\} \times [n]. \end{cases}$$

La demostración anterior es algo forzada, ya que realmente es muchísimo más simple probarla de manera algebraica. No siempre esto es así. A continuación veamos que la fórmula para la suma geométrica se puede probar combinatorialmente.

Ejemplo 1.47. Pruebe combinatorialmente que para todo n, m números naturales con $m \geq 2$, se tiene

$$(m-1) \sum_{i=0}^n m^i = m^{n+1} - 1.$$

Solución: El lado izquierdo cuenta el conjunto $X = \{w = y\sigma : y \in [m]^*, 0 \leq |Y| \leq n, \sigma \in [m-1]\}$. Mientras que el lado derecho cuenta el conjunto $Y = [m]^{n+1} \setminus \{(m, m, \dots, m)\}$. Cada $w \in X$ tiene largo $|w| \leq n+1$.

Considere la función $\varphi: X \rightarrow Y$, que toma cada palabra de X y le agrega al final símbolos m hasta que la palabra tenga largo $n + 1$, es decir:

$$\varphi(w) = wm^{n+1-|w|}.$$

Como la palabra w termina en un símbolo σ distinto de m , φ es biyectiva (su inversa consiste en eliminar letras m del final de la palabra hasta que ésta no termine en m).

Ejemplo 1.48.

1. ¿Cuántas palabras de A^* tienen a lo más k símbolos, para un conjunto finito A ?

Solución: Estamos buscando $|\bigcup_{i=0}^k A^i| = \sum_{i=0}^k |A|^i$. La cantidad anterior depende del cardinal de A y se simplifica usando suma geométrica a ser:

$$\llbracket |A| \neq 1 \rrbracket \frac{|A|^{k+1} - 1}{|A| - 1} + \llbracket |A| = 1 \rrbracket (k + 1).$$

Note que la fórmula también vale para $A = \emptyset$ (en dicho caso, $\bigcup_{i=0}^k A^i = A^0 = \emptyset^0 = \{\emptyset\}$ que tiene $1 = \frac{0-1}{0-1}$ elementos).

2. ¿Cuántos números naturales de a lo más k cifras se escriben sin usar la cifra 0?

Solución: El conjunto que deseamos contar está en biyección con las palabras en $[9]^*$ que tienen entre 1 y k símbolos. Usando el ejercicio anterior, éstas son exactamente

$$\frac{9^{k+1} - 1}{9 - 1} - |[9]|^0 = \frac{9^{k+1} - 9}{8}.$$

3. Una palabra es palíndroma si al leerse de derecha a izquierda se obtiene la misma palabra. ¿Cuántas palabras palíndromas hay en A^k ?

Solución: La solución depende de si k es par o impar.

Si k es par, entonces toda palabra palíndroma en A^k se escribe como ww^R , con $w \in A^{k/2}$, donde w^R es la palabra w escrita de derecha a izquierda.

Si k es impar, entonces toda palabra palíndroma en A^k se escribe como wxw^R , con $w \in A^{(k-1)/2}$, $x \in A$. Luego la cantidad pedida es:

$$\llbracket k \text{ par} \rrbracket \cdot |A^{k/2}| + \llbracket k \text{ impar} \rrbracket \cdot |A^{(k-1)/2}| \cdot |A| = A^{\lceil k/2 \rceil}.$$

Un ejemplo importante de demostración combinatorial consiste en probar que el conjunto potencia de $[n]$ tiene exactamente 2^n elementos.

Ejemplo 1.49. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$|\mathcal{P}(n)| = 2^n.$$

Solución: Más generalmente, si A es conjunto cualquiera (no necesariamente finito), probamos que $|\mathcal{P}(A)| = |\{0, 1\}^A|$. Para esto considere la biyección $\varphi: \mathcal{P}(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$ dada por su indicatriz $\varphi(X) = \chi^X$, es decir

$$\varphi(X)_i = \llbracket i \in X \rrbracket, \forall i \in A.$$

Con esto, $|\mathcal{P}(n)| = |\{0, 1\}^n| = 2^n$. ■

Observación 1.50. Mucha gente simplemente llama 2^X a $\mathcal{P}(X)$. Esto viene de la biyección anterior, y usando la definición de Von Neumann de los naturales como conjuntos ($n := \mathbb{N}_n$, es decir $2 = \mathbb{N}_2 = \{0, 1\}$).

Aunque menos frecuentes, también podemos dar demostraciones combinatoriales de desigualdades:

Ejemplo 1.51. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n \leq 2^n,$$

Demostración. Usamos la inyección $[n] \rightarrow \mathcal{P}([n])$ dada por $i \mapsto \{i\}$. □

Ejemplo 1.52. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$n^2 \leq 2(2^n - 1),$$

Demostración. El lado derecho cuenta $\{-, +\} \times \mathcal{P}([n] \setminus \{\emptyset\})$, es decir pares (s, X) con s un signo y X un subconjunto no vacío de $[n]$. La función $(s, X) \mapsto \begin{cases} (\text{mín } X, \text{máx } X) & s = +, \\ (\text{máx } X, \text{mín } X) & s = -, \end{cases}$ es claramente sobreyectiva en $[n]^2$, probando la igualdad. □

1.5. Multiconteo o sobreconteo

Una aplicación muy importante del principio de la suma es el siguiente:

Lema 1.53. Sea $G = (L \cup R, E)$ un grafo bipartito, entonces $\sum_{v \in L} d_G(v) = \sum_{w \in R} d_G(w)$. En particular, si el grafo G es (s, t) -regular (i.e., el grado de cada vértice en L es s , y el grado de cada vértice en R es t) se concluye que $|L|s = |R|t$.

Demostración. Basta notar que $\bigcup_{v \in L} \delta(v) = E = \bigcup_{v \in R} \delta(v)$. □

La propiedad anterior es la base de una técnica llamada multiconteo. En general cada grafo bipartito codifica una relación binaria entre dos conjuntos. Si esta relación es, por ejemplo una función biyectiva, ambos conjuntos tienen el mismo cardinal (esto corresponde a un grafo bipartito 1-regular). Si la relación es una función tal que cada elemento del conjunto de llegada R tiene exactamente k preimágenes en L , entonces el grafo es $(1, k)$ -regular y aplicando multiconteo se tiene que $|R| = |L|k$. Esta técnica general es muy útil cuando se desea probar combinatorialmente ecuaciones del tipo $|A| = |B| \frac{p}{q}$.

Postergaremos su uso hasta tener un poco más de vocabulario, pero damos un ejemplo simple a continuación.

Lema 1.54. (*Handshaking lemma*) Si $G = (V, E)$ es un grafo cualquiera, entonces $|E| = \frac{\sum_{v \in V} d_G(v)}{2}$.

Demostración. Considere el grafo bipartito H con bipartición $V(G)$, y $E(G)$ donde ve es arista si v es un extremo de e . Como cada elemento $v \in V(G)$ está conectado en H con $d_G(v)$ elementos $e \in E(G)$ tenemos que $|E(H)| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v)$. Por otro lado, cada arista de $E(G)$ está conectada en H con dos vértices de V . Luego $|E(H)| = 2|E(G)|$. Igualando se concluye la demostración. □

1.6. Principio general del producto. Ordenamientos.

Muchas veces deseamos contar secuencias de k tareas, donde la i -ésima tarea se puede elegir dentro de un conjunto dado, pero no todas las secuencias son válidas. Un caso donde esto ocurre es cuando una vez que las primeras $i - 1$ tareas se han elegidos, existen exactamente n_i posibilidades para elegir la i -ésima tarea de modo que la secuencia se puede completar a una secuencia válida. En dicho caso, al igual que con el principio tradicional, el número total de secuencias válidas es $\prod_{i=1}^k n_i$.

La descripción formal de este principio está a continuación y su demostración se deja propuesta (Ejercicio 1.9).

Definición 1.55. Sea $B \subseteq A^*$ un lenguaje sobre un alfabeto cualquiera. Decimos que una palabra $w \in A^*$ es un prefijo de B si existe $w' \in A^*$ tal que $ww' \in B$. Decimos que w es sufijo de B si existe w' tal que $w'w \in B$.

Proposición 1.56. [Principio general del producto] Sea $\emptyset \neq B \subseteq A^k$, para $k \in \mathbb{N}$, un conjunto de palabras de largo k . Suponga que los valores $s_1, s_2, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ satisfacen que para todo $1 \leq j \leq k$ y todo prefijo w de B , con $|w| = j - 1$ existen exactamente s_j símbolos a en A tal que wa es prefijo de B , entonces $|B| = \prod_{i=1}^k s_i$.

Una aplicación habitual corresponde a calcular el número de ordenamientos de un conjunto.

Definición 1.57. Un ordenamiento de un conjunto finito A es una palabra en $A^{|A|}$ con todos sus elementos distintos. Así, por ejemplo los ordenamientos de $\{a, 1, 2\}$ son $\{a12, a21, 1a2, 12a, 2a1, 21a\}$. Llamamos $\text{ord}(A)$ al conjunto de ordenamientos de A , y definimos $n! := |\text{ord}([n])|$.

Proposición 1.58. $n! = \prod_{i=1}^n i$.

Demostración. Notamos que $\text{ord}(\emptyset) = \emptyset^0 = \{\varepsilon\}$ por lo que $0! = 1$. Tomemos ahora $n \geq 1$. El primer símbolo de un ordenamiento de $[n]$ se puede elegir de n maneras; el segundo, de solo $n - 1$ (cualquiera excepto el primer símbolo); en general, el i -ésimo símbolo se puede elegir de $n - (i - 1)$ maneras, por lo tanto el número de ordenamientos es igual a $\prod_{i=1}^n (n - (i - 1)) = \prod_{i=1}^n i$. \square

Observación 1.59. Si A tiene n elementos, entonces podemos usar la biyección natural entre A y $[n]$ para concluir que $\text{ord}(A)$ también tiene $n! = |A|!$ elementos.

En esta sección veremos varias consecuencias del principio general del producto. Antes de ello, veamos un par de ejemplos que ilustran dificultades que podremos encontrar.

Ejemplo 1.60. ¿Cuántas secuencias w de $2n$ números enteros cumplen las siguientes condiciones simultáneamente?

- $w_n = 0$.
- Dos elementos consecutivos de la secuencia difieren en exactamente 1 unidad.

Solución. Para describir w , procedemos por pasos determinando un elemento de la secuencia a la vez en el siguiente orden: Primero w_n ; Luego todos los elementos que le siguen w_{n+1}, \dots, w_{2n} ; Finalmente los elementos que le preceden $w_{n-1}, w_{n-2}, \dots, w_1$. Notamos que a excepción por el primer paso que tiene 1 opción $w_n = 0$, en cada paso podemos elegir el elemento correspondiente de 2 maneras (como el sucesor o el antecesor del único elemento consecutivo que ya ha sido definido). Luego, el número de secuencias válidas es $1 \cdot 2^{2n-1} = 2^{2n-1}$. \square

El siguiente problema muestra que no siempre la primera idea funciona:

Ejemplo 1.61. ¿Cuántos ordenamientos de $[n]$ son tales que el conjunto de símbolos de cada prefijo es un intervalo? Por ejemplo, si $n = 4$, 3241 y 2134 satisfacen la propiedad pero 1243 no.

Solución. Si se intenta aplicar el principio del producto para construir la palabra símbolo por símbolo desde la izquierda rápidamente nos encontramos con problemas: si en algún minuto $w_i = 1$ o $w_i = n$, el siguiente símbolo está predeterminado y en cualquier otro caso, el siguiente símbolo tiene 2 opciones.

Resulta más simple resolver el problema de derecha a izquierda. Para w ordenamiento de $[n]$, e $I \subseteq [n]$, llamemos $w_I = \{w_i : i \in I\}$. Luego $w_{[n]} = [n]$ es intervalo. En cada momento $m \geq 2$, si $w_{[m]}$ es intervalo hay solo 2 opciones para w_m que dejan $w_{[m-1]}$ intervalo (elegir w_m como el extremo superior o como el extremo inferior de $w_{[m]}$). Sigue que hay 2 opciones para w_n , 2 para w_{n-1} , \dots , y 2 para w_2 , w_1 queda determinado por las decisiones anteriores. En conclusión hay 2^{n-1} tales ordenamientos. \square

1.7. Ordenamientos circulares.

Un conjunto A de n personas se desean sentar en una mesa circular. ¿Cuántas formas existen si dos formas se consideran idénticas cuando cada persona tiene el mismo vecino derecho, es decir si una es una rotación de la otra?

Llamemos a cada posible configuración un *ordenamiento circular* de A , y $\text{ord}_C(A)$ al conjunto de dichos elementos. Una forma de resolver este problema es creando una relación bipartita entre ordenamientos de A y ordenamientos circulares de A : un ordenamiento circular se relaciona con todos los ordenamientos lineales que se pueden leer eligiendo un elemento cualquiera de A como primer elemento y luego leyendo la palabra de A^n formada al avanzar en el sentido del reloj.

Cada ordenamiento circular se relaciona con n ordenamientos lineales y cada ordenamiento lineal se relaciona con 1 ordenamiento circular. De esto se deduce que $n|\text{ord}_C(A)| = 1|\text{ord}(A)|$ y luego

$$|\text{ord}_C(A)| = \llbracket n \geq 1 \rrbracket \frac{n!}{n} + \llbracket n = 0 \rrbracket = (n - 1)!$$

1.8. Ejercicios

Ejercicio 1.1. Felipe tiene una barra de chocolate pre-picada en nm cuadritos (n filas y m columnas). Esta barra es bastante dura por lo cual para comerla debe antes separar los cuadritos. Felipe puede en cada paso romper una de las piezas que tenga y, mediante un fuerte golpe, dividirla a través de una de las filas horizontales o verticales. ¿Cuál es el número mínimo de pasos que Felipe debe realizar para separar la barra completamente en nm cuadritos?

Ejercicio 1.2. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Demuestre que $n = m$ si y solo si existe biyección entre $[n]$ y $[m]$. Concluya que si un conjunto A es finito entonces existe un solo valor n tal que $|A| = n$.

Indicación: Suponga que $n \leq m$ y pruebe la afirmación por inducción en m .

Ejercicio 1.3. Pruebe que todos los subconjuntos de un conjunto finito son finitos³. Más aún pruebe que $A \subseteq B$ y B finito implica que A es finito y $|A| \leq |B|$.

Ejercicio 1.4. Pruebe el Corolario 1.39 .

Ejercicio 1.5. Pruebe los principios de la suma y producto para múltiples conjuntos (Proposiciones 1.40 y 1.41) de dos maneras: por inducción y también dando directamente una biyección natural entre $\cup_{i=1}^n A_i$ y $[\sum_{i=1}^n |A_i|]$ en el caso de la suma, y entre $\prod_{i=1}^n A_i$ y $[\prod_{i=1}^n |A_i|]$ en el caso del producto.

Ejercicio 1.6. Demostrar combinatorialmente que para todo $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$a^b \cdot a^c = a^{b+c}, (a^b)^c = a^{b \cdot c}, (ab)^c = a^c \cdot b^c$$

Usando las propiedades anteriores, deduzca que para todo par de conjuntos finitos disjuntos A y B , los conjuntos siguientes tienen todos el mismo cardinal $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A))^{\mathcal{P}(B)}$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(B))^{\mathcal{P}(A)}$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B))$

Ejercicio 1.7. Pruebe combinatorialmente la desigualdad de Bernoulli siguiente:

$$\forall n, k \in \mathbb{N}, \quad (1 + n)^k \geq 1 + nk.$$

Ejercicio 1.8. Pruebe combinatorialmente la desigualdad siguiente:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{N}^+, \quad (a + b)^c \geq a^c + b^c.$$

³Hágalo sólo usando la definición de equipotencia, no use el principio inyectivo

Ejercicio 1.9. Demuestre el principio general del producto, reduciéndolo al principio habitual (Proposición 1.56)

Ejercicio 1.10. ¿Cuántos números de 9 dígitos (notar que su primer dígito no puede ser 0) cumplen las siguientes condiciones simultáneamente?

- La cifra central es un 5.
- Dos cifras consecutivas difieren en exactamente 1 unidad.

Ejercicio 1.11. Vuelva a responder la misma pregunta del ejercicio anterior pero ahora considere números de 11 dígitos. *Indicación:* Puede ser más simple contar palabras en \mathbb{N}_{10}^* que satisfagan las propiedades y luego eliminar aquellas que no corresponden a números.

Cardinales generales

Los ejercicios siguientes pueden ser algo distantes al curso de combinatoria, pero se incluyen para los interesados.

Ejercicio 1.12. Defina las relaciones entre clases ($X \approx Y \iff |X| = |Y|$), ($X \leq Y \iff \exists f: X \rightarrow Y$ inyectiva), ($X \leq^* Y \iff \exists f: Y \rightarrow X$ sobreyectiva). Pruebe (sin usar axioma de elección) que \approx es de equivalencia, que \leq, \leq^* son preordenes y que $X \leq Y$ implica $X \leq^* Y$.

Ejercicio 1.13. Pruebe sin usar axioma de elección el teorema de Cantor-Schröder-Bernstein siguiente: $X \leq Y \leq X$ implica $X \approx Y$.

Indicación: Suponga $X \cap Y = \emptyset$, y sean $f: X \rightarrow Y$ y $g: Y \rightarrow X$ las inyecciones dadas por hipótesis. Considere el digrafo bipartito infinito $G = (X \cup Y, E)$ donde $E = \{(x, y) \in X \times Y: f(x) = y\} \cup \{(y, x) \in Y \times X: g(y) = x\}$. Para cada componente conexa C de G , cree una biyección $h: C \cap X \rightarrow C \cap Y$.

Ejercicio 1.14. (Análisis) Pruebe usando el axioma de elección que $X \leq^* Y$ implica $X \leq Y$, y deduzca el teorema dual de Cantor-Schröder-Bernstein. $X \leq^* Y \leq^* X$ implica $X \approx Y$.

Ejercicio 1.15. (Análisis) Pruebe usando el axioma de elección que \leq es una relación total (i.e. para todo X, Y , $X \leq Y$ o $Y \leq X$).

Indicación: El caso interesante es si X, Y son no vacíos. Defina en este caso $\mathcal{S} = \bigcup_{A \subseteq X, B \subseteq Y} \{f: A \rightarrow B, \text{biyectiva}\}$. Pruebe que $\mathcal{S} \neq \emptyset$ y defina un orden (\mathcal{S}, \leq) donde $f \leq g$ si g extiende a f . Use Lema de Zorn para este orden.

Ejercicio 1.16. Este ejercicio da una manera alternativa de definir conjuntos finitos que no depende de la existencia del conjunto de los números naturales. Un conjunto A se dice Dedekind-finito si no es equipotente con ninguno de sus subconjuntos propios, es decir

$$(\forall B \subseteq A), \quad |A| = |B| \iff A = B.$$

Se dice que es Dedekind-infinito si no es Dedekind-finito. Pruebe que los siguientes son equivalentes:

- A es Dedekind-infinito
- Existe una inyección $f: A \rightarrow A$ no sobreyectiva.
- Existe una inyección de \mathbb{N} en A .
- Existe $B \subseteq A$ con $|B| = |\mathbb{N}|$.

Ejercicio 1.17. Pruebe que si A es finito entonces es Dedekind-finito.

Ejercicio 1.18. (Análisis) Pruebe usando el axioma de elección la recíproca de de la proposición anterior, es decir que todo conjunto Dedekind-finito es finito.

Ojo: La demostración estándar que muestra que todo conjunto infinito A satisface $|\mathbb{N}| \leq |A|$ usa axioma de elección.

Ejercicio 1.19. (Análisis) Sean A, B, C conjuntos. Definimos la suma y producto de cardinales generales como sigue.

$$\begin{aligned} |A| + |B| = |C| &\iff \text{existen } A', B' \text{ disjuntos tal que } |A| = |A'|, |B| = |B'|, |A' \cup B'| = |C|. \\ |A| \cdot |B| = |C| &\iff |A \times B| = |C|. \end{aligned}$$

Pruebe que si al menos uno de A o B son infinitos, entonces (usando el axioma de elección),

$$|A| + |B| = |A| \cdot |B| = \max(|A|, |B|),$$

donde

$$\max(|A|, |B|) = \begin{cases} |B| & \text{si } |A| \leq |B| \\ |A| & \text{si } |B| \leq |A| \end{cases}$$

Capítulo 2

Selecciones de elementos.

2.1. Selecciones de objetos de un conjunto fijo

Hay dos parámetros importantes a considerar para clasificar selecciones de elementos de un conjunto dado A . (1) Si se permiten repetir elementos. (2) Si el orden importa. Cuando el orden importa, hablamos de **listas** o *secuencias* sobre A y usamos notación de palabras (ej: $abc \neq acb$). Cuando el orden no importa hablamos de **combinaciones** sobre A y usamos notación de conjuntos (si no se permite repetir) o de multiconjuntos. En particular, cuando deseemos considerar elementos repetidos, es útil poner los elementos en un paréntesis cuadrado (ej: $[a, a, b] = [a, b, a]$) donde permitimos agrupar términos como potencias (si no hay confusión, podemos evitar escribir las comas), $[a, a, b, c, c] = [a^2bc^2]$. La siguiente tabla nos ayudará a introducir notación.

Selecciones de k objetos.	Sin repetición	Con repetición
Importa el orden (Listas)	k -variaciones. A^k .	k -secuencias. A^k .
No importa el orden (Combinaciones)	k -conjuntos. $\binom{A}{k}$.	k -multiconjuntos. $\left(\binom{A}{k}\right)$.

Nota: En varios textos, A^k se denota por $(A)_k$. Usamos la primera notación para evitar confusión con el uso de subíndices.

Ejemplo 2.1. Si $X = \{x, y\}$ es un conjunto de 2 elementos, entonces la pregunta ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos elementos de X ? es ambigua ya que dependiendo del contexto, la respuesta puede ser 1, 2, 3 o 4:

- Hay 1 2-conjunto de X : $\binom{X}{2} = \{\{x, y\}\}$.
- Hay 2 2-variaciones de X : $X^2 = \{xy, yx\}$.
- Hay 3 2-multiconjuntos de X : $\left(\binom{X}{2}\right) = \{[xx], [xy], [yy]\}$.
- Hay 4 2-secuencias de X : $X^2 = \{xx, xy, yx, yy\}$.

Ejemplo 2.2. Para k pequeño, las k -variaciones, k -conjuntos y k -multiconjuntos de $A = \{a, b, c\}$ son:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= \{ab, ac, ba, bc, ca, cb\}, & A^3 &= \{abc, acb, bac, bca, cab, cba\}, & A^4 &= \emptyset. \\
 \binom{A}{2} &= \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}\}, & \left(\binom{A}{3}\right) &= \{\{a, b, c\}\}, & \left(\binom{A}{4}\right) &= \emptyset.
 \end{aligned}$$

$$\binom{A}{2} = \{[a^2], [ab], [ac], [ba], [b^2], [bc], [ca], [cb], [c^2]\}.$$

$$\binom{A}{3} = \{[a^3], [a^2b], [a^2c], [ab^2], [abc], [ac^2], [b^3], [b^2c], [bc^2], [c^3]\}.$$

$$\binom{A}{4} = \{[a^4], [a^3b], [a^3c], [a^2b^2], [a^2c^2], [a^2bc], [ab^3], [ac^3], [ab^2c], [abc^2], [b^4], [b^3c], [b^2c^2], [bc^3], [c^4]\}.$$

Observación 2.3. Caso especial: $k = 0$.

Para todo A , $A^0 = A^{\underline{0}} = \binom{A}{0} = \left(\binom{A}{0}\right) = \{\varepsilon\}$ donde ε representa la lista/combinación vacía.

Observación 2.4. Caso especial: $A = \emptyset$.

Para todo $k \geq 1$, $\emptyset^k = (\emptyset)_k = \binom{\emptyset}{k} = \left(\binom{\emptyset}{k}\right) = \emptyset$.

En lo que resta de la sección estudiaremos la cardinalidad de los conjuntos anteriormente definidos. Para ello, la siguiente notación es de utilidad.

Definición 2.5. Para todo $n, k \in \mathbb{N}$, (re)definimos

$$n^k := |[n]^k| \quad (\text{Potencias naturales})$$

$$n^{\underline{k}} := |[n]^{\underline{k}}| \quad (\text{Factorial decreciente})$$

$$\binom{n}{k} := \left| \binom{[n]}{k} \right| \quad (\text{Combinatorio de } n \text{ sobre } k, \text{ o coeficiente binomial de } n \text{ sobre } k)$$

$$\left(\binom{n}{k}\right) := \left| \left(\binom{[n]}{k} \right) \right| \quad (\text{Multicombinatorio de } n \text{ sobre } k)$$

Observación 2.6. Si $|A| = n$ entonces $|A^k| = n^k$, $|A^{\underline{k}}| = n^{\underline{k}}$, $\left| \binom{A}{k} \right| = \binom{n}{k}$ y $\left| \left(\binom{A}{k} \right) \right| = \left(\binom{n}{k}\right)$. Estas igualdades se prueban usando la biyección entre A y $[n]$.

Puede parecer extraño que hayamos *redefinido* las potencias naturales siendo una operación tan habitual. Sin embargo al hacerlo de esta manera respondemos de inmediato la siguiente duda ¿Cuál es la definición natural de 0^0 ? En general, ¿cómo definimos los valores anteriores cuando $n = 0$?

Observación 2.7. Usando las definiciones y observaciones anteriores, se concluye que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n^0 = n^{\underline{0}} = \binom{n}{0} = \left(\binom{n}{0}\right) = 1.$$

En particular,

$$0^0 = 0^{\underline{0}} = \binom{0}{0} = \left(\binom{0}{0}\right) = 1,$$

y

$$0! = 0^{\underline{0}} = 1.$$

Por otro lado, para todo $k \geq 1$

$$0^k = 0^{\underline{k}} = \binom{0}{k} = \left(\binom{0}{k}\right) = 0.$$

Como es de esperar, (por principio del producto), la definición de potencias naturales coincide con la definición habitual, es decir $n^k = |[n]^k| = \prod_{i=1}^k |[n]| = \prod_{i=1}^k [n]$.

2.2. Variaciones, ordenamientos y permutaciones de un conjunto.

Prosigamos con las variaciones de un conjunto. Recordamos que si A es un conjunto con n elementos, entonces directamente $|A^k| = n^k$. La próxima proposición da una fórmula para esta cantidad.

Proposición 2.8.

$$\forall n \in \mathbb{N} : n^n = n! = \prod_{i=1}^n i,$$

$$\forall n, k \in \mathbb{N} : n^k = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1) = \prod_{i=n-k+1}^n i.$$

y luego,

$$\forall n, k \in \mathbb{N} : n^k = \llbracket k \leq n \rrbracket \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Demostración. La primera parte sale del hecho que $[n]^n = \text{ord}([n])$ por definición. Luego $n^n = |\text{ord}([n])| = n! = \prod_{i=1}^n i$. Para la segunda, notamos que $[n]^k = \emptyset$ para $k \geq n+1$, por lo que $n^k = 0$ si $k \geq n+1$. En otro caso, la identidad se obtiene del principio general del producto. La tercera se obtiene de combinar las dos expresiones anteriores para el caso $k \leq n$. \square

Al igual que las secuencias están en biyección con cierto conjunto de funciones, las variaciones están en biyección con cierto conjunto de funciones inyectivas.

Definición 2.9. El conjunto de funciones inyectivas de A en B se denota como $\text{Iny}(A, B) = \{f \in B^A \mid f \text{ inyectiva}\}$.

Proposición 2.10. Para A y B finitos,

$$|\text{Iny}(A, B)| = |B|^{\underline{|A|}}.$$

Demostración. Sea $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, con $n = |A|$. La función $\varphi: \text{Iny}(A, B) \rightarrow B^n$ dada por $\varphi(f)_i = f(a_i)$ es una biyección. \square

Definición 2.11. Una permutación de A es una función biyectiva de A en si misma. Denotamos al conjunto de permutaciones de A como $\mathcal{S}_A = \{f \in A^A \mid f \text{ biyectiva}\}$. Además, denotamos $\mathcal{S}_n := \mathcal{S}_{[n]}$.

Proposición 2.12. Para A finito,

$$|\mathcal{S}_A| = |A|!$$

Demostración. Directo del hecho que $\mathcal{S}_A = \text{Iny}(A, A)$, y del hecho que $n! = n^n$. \square

Observación 2.13. Como las permutaciones de un conjunto A de cardinal n están en biyección con las n -variaciones (ordenamientos) de A , es común (pero confuso) llamar también permutación de A a los ordenamientos de A .

Dadas las proposiciones anteriores, es tentador denotar $\text{Iny}(A, B)$ como $B^{\underline{A}}$, y \mathcal{S}_A como $A!$. Nos resistiremos a esa tentación pues la última notación no es estándar.

2.3. Combinaciones: subconjuntos y multiconjuntos

Prosigamos con las combinaciones de un conjunto. Al igual que antes notamos que si A tiene n elementos, entonces directamente $|\binom{A}{k}| = \binom{n}{k}$. La próxima proposición nos da una fórmula para esta cantidad.

Proposición 2.14.

$$\forall n, k \in \mathbb{N} : \binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \mathbb{I}[k \leq n] \frac{n!}{(n-k)!k!}.$$

Demostración. Por multiconteo entre variaciones y combinaciones. Consideremos la función $f: [n]^k \rightarrow \binom{[n]}{k}$, que manda cada k -variación w a su conjunto de símbolos. Cada conjunto X en $\binom{[n]}{k}$ tiene exactamente $k!$ preimágenes pues $f^{-1}(X) = \text{ord}(X)$. Luego: $1n^k = k! \binom{n}{k}$, de lo que se deduce lo pedido. La segunda igualdad es una simplificación de $n^{\underline{k}}$. \square

Antes de proseguir con los multiconjuntos, detengámonos a resolver algunos problemas.

Ejercicios resueltos 2.15. De una demostración combinatorial de las siguientes identidades-

1. $\forall 0 \leq k \leq n : \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
2. $\forall k, n \in \mathbb{N} : \binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k}$.
3. $\sum_k^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Demostración.

1. Usar la biyección $\binom{[n]}{k} \rightarrow \binom{[n]}{n-k}$ dada por $X \mapsto [n] \setminus X$ (complemento).
2. Basta notar que $\binom{[n+1]}{k+1} = \underbrace{\binom{[n]}{k+1}}_{\text{Conjuntos sin } n+1} \cup \left\{ \{n+1\} \cup Y : Y \in \binom{[n]}{k} \right\}$ y que la unión es disjunta.
3. Directo de $\mathcal{P}([n]) = \cup_{k=0}^n \binom{[n]}{k}$, y del hecho que $2^n = |\mathcal{P}([n])|$. \square

Uno de los ejercicios anteriores nos permite dar una definición alternativa de los coeficientes binomiales en función de una recurrencia. Esto aparecerá con cierta frecuencia en el curso.

Proposición 2.16. Los números $\left(\binom{n}{k} \right)_{n,k \geq 0}$ están definidos por la siguiente recurrencia:

$$\forall k, n \geq 1 : \binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

con valores de borde, $\binom{n}{0} = 1$, para $n \geq 0$ y $\binom{0}{k} = 0$, para $k \geq 1$.

Tratemos ahora los multiconjuntos. Un multiconjunto de A es una selección de objetos de A donde cada elemento puede aparecer más de una vez y el orden no importa. Para poder tratar con ellos necesitamos una definición formal.

Definición 2.17. Sea A un conjunto. Un multiconjunto de A es una función $x: A \rightarrow \mathbb{N}$, donde $x(a)$ representa el número de veces que se selecciona $a \in A$. Llamamos tamaño de x a la cantidad $|X| = \sum_{a \in A} x(a)$ y soporte de x , al conjunto $\text{Sop}(x) = \{a \in A: x(a) \geq 1\}$, llamamos elementos de x a los elementos de $\text{Sop}(x)$. Decimos que $A = \text{dom}(x)$ es el conjunto de referencia de x .

Abusando notación, decimos que dos multiconjuntos B y C son iguales si tienen igual soporte e igual función multiplicidad restringida a su soporte¹. Podemos describir un multiconjunto listando sus elementos en cualquier orden considerando repeticiones $x = [a, a, b, c, c]$ o abreviadamente como $x = [a^2bc^2]$. Si cada elemento de un multiconjunto aparece con multiplicidad 1, identificamos el multiconjunto con el conjunto asociado.

Definición 2.18. Para A conjunto, llamamos $\mathcal{M}(A)$ al conjunto de sus multiconjuntos. En particular, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{M}(A)$, y \emptyset es multiconjunto de cualquier conjunto. Para $k \in \mathbb{N}$, llamamos $\binom{A}{k} = \{x \in \mathcal{M}(A): |X| = k\}$, Recordemos que para $n \in \mathbb{N}$, llamamos $\binom{n}{k} = |\binom{[n]}{k}|$.

Es directo notar que $\mathcal{M}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ y que si $A \neq \emptyset$, $\mathcal{M}(A)$ es infinito. Además $\binom{n}{0} = 1$ para $n \geq 0$ y $\binom{0}{k} = 0$ si $k > 0$. Ahora estamos listos para encontrar el valor de $\binom{n}{k}$ en otro caso.

Proposición 2.19. Para $n, k \in \mathbb{N}$. Si $n + k \geq 1$,

$$\binom{n}{k} = \binom{n+k-1}{k}$$

Demostración. Si $n = 0$ y $k \geq 1$, se tiene $\binom{0}{k} = 0 = \binom{k-1}{k}$. Así que supongamos que $n \geq 1$. Considere la biyección que a un multiconjunto x de $[n]$ de tamaño k le asocia la palabra binaria $x' \in \{0, 1\}^{n+k-1}$ dada por

$$x' = 0^{x(1)}10^{x(2)}1 \dots 10^{x(n-1)}10^{x(n)}.$$

La asignación $x \mapsto x'$ es una biyección entre $\binom{[n]}{k}$ y las palabras en $\{0, 1\}^{n+k-1}$ con exactamente k símbolos 0 y $n-1$ separadores 1. El último conjunto, a su vez, está en biyección con $\binom{[n+k-1]}{k}$, ya que cada palabra x' está definida exactamente por el conjunto de índices i en $[n+k-1]$ tales que $x'_i = 0$. \square

En nuestra notación actual, no tenemos la igualdad directa $\binom{n}{k} = \binom{n+k-1}{k}$ pues para el caso $n = k = 0$ el lado izquierdo es 1 y el derecho es $\binom{-1}{0}$ que no tiene sentido. Más adelante, le daremos significado a $\binom{-n}{k}$ y en ese momento la igualdad deseada $\binom{-1}{0} = 1$ se tendrá. Haciendo ese importante supuesto tenemos la igualdad

$$\binom{n}{k} = \binom{n+k-1}{k}.$$

En el futuro, volveremos a usar biyecciones como esta, así que le daremos nombre a esta biyección. Para x multiconjunto, llamamos a x' su palabra binaria asociada.

Al igual que antes, podemos dar una definición alternativa de los números $\binom{n}{k}$ via una recurrencia.

Proposición 2.20. Los números $\left(\binom{n}{k} \right)_{n,k \geq 0}$ están definidos por la siguiente recurrencia:

$$\forall k, n \geq 1: \binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

con valores de borde, $\binom{n}{0} = 1$, para $n \geq 0$ y $\binom{0}{k} = 0$, para $k \geq 1$.

Demostración. Propuesta. \square

¹ Este abuso de notación está en el mismo espíritu de considerar iguales dos funciones que formalmente tengan distinto codominio pero igual asignación.

2.4. Ejercicios

Ejercicio 2.1. Para $n, k, m \in \mathbb{N}$, dé demostraciones directas puramente biyectivas de

$$\begin{aligned} n! &= (n-k)!n^k \\ n! &= \binom{n}{k}(n-k)!k! \\ m^k \binom{n}{k} &= n^k \binom{m}{k} \\ n^k (n-k)^m &= n^m (n-m)^k \end{aligned}$$

Ejercicio 2.2. Demostrar combinatorialmente que para todo $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} n! &\leq n^n. \\ n^k &\leq n^k. \\ \binom{n}{k} &\leq \binom{\binom{n}{k}}{k}. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.3. Las siguientes identidades son simples de probar algebraicamente, para $n, k, a, b, c \in \mathbb{N}$. Pruébelas combinatorialmente:

$$\begin{aligned} (k+1) \binom{n+1}{k+1} &= (n+1) \binom{n}{k} = (n+1-k) \binom{n+1}{k}. \\ \binom{a+b+c}{a} \binom{b+c}{b} &= \binom{a+b+c}{b} \binom{c+a}{c} = \binom{a+b+c}{c} \binom{a+b}{a}. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.4. Veinte autos corren en una carrera. Sabiendo que no hay empates, conteste cada una de las preguntas por separado: ¿Cuántos posibles resultados tiene la carrera si el resultado consiste en...

1. conocer el lugar de cada corredor?
2. determinar solo los 10 mejores corredores (la carrera es una clasificatoria, el orden entre los clasificados no importa)?
3. es una competencia con medallas y solo importa quien sacó Oro, Plata y Bronce?

Ejercicio 2.5. Demuestre combinatorialmente la Proposición 2.20.

Ejercicio 2.6. Para A conjunto, llame $\mathcal{P}_k(A) = \{x \in \mathcal{M}(A) : x_a \leq k, \forall a \in A\}$ al conjunto de los multiconjuntos que tienen a cada símbolo a lo más k veces, de modo que $\mathcal{P}_1(A) = \mathcal{P}(A)$ y $\mathcal{M}(A) = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{P}_k(A)$. Pruebe combinatorialmente que $|\mathcal{P}_k(A)| = (k+1)^{|A|}$.

Ejercicio 2.7. Use las recurrencias de las proposiciones 2.16 y 2.20 para llenar 3 filas adicionales de los siguientes triángulos de Pascal (no escriba los ceros).

$\binom{n}{k}$	k										
n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	1	1									
2	1	2	1								
3	1	3	3	1							
4	1	4	6	4	1						
5	1	5	10	10	5	1					
6	1	6	15	20	15	6	1				
7	1	7	21	35	35	21	7	1			
8											
9											
10											

$\binom{\binom{n}{k}}$	k										
n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	1	3	6	10	15	21	28	36	45	55	66
4	1	4	10	20	35	56	84	120	165	220	286
5											
6											
7											

¿Puede notar que un triángulo es una rotación del otro?

Ejercicio 2.8. Probar **directamente** de manera combinatorial o por doble conteo. Es decir, encuentre biyecciones entre 2 conjuntos con las cardinalidades requeridas, o cuente un conjunto de dos maneras distintas, **además** identifique la igualdad en el triángulo de Pascal correspondiente. Para todo $n, m, k \in \mathbb{N}$.

$$\binom{n+1}{2} = \sum_i^n i, \quad \binom{n+1}{k+1} = \sum_i^n \binom{i}{k},$$

$$\binom{\binom{n+1}{k}}{k} = \sum_i^k \binom{\binom{n}{i}}{i}, \quad \binom{\binom{n+1}{k+1}}{k+1} = \sum_i^n \sum_j^k \binom{\binom{i}{j}}{j}.$$

Ejercicio 2.9. Probar **directamente** de manera combinatorial o por doble conteo. Es decir, encuentre biyecciones entre 2 conjuntos con las cardinalidades requeridas, o cuente un conjunto de dos maneras distintas.

$$\sum_i i \binom{n}{i} = n2^{n-1}.$$

$$\sum_i i^k \binom{n}{i} = n^k 2^{n-k}.$$

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} = \binom{n+m}{k}. \quad \text{(Identidad de Vandermonde)}$$

$$\binom{\binom{n+1}{k}}{k} = \binom{\binom{k+1}{n}}{n}$$

Ejercicio 2.10. Una dulcería ofrece dulces de 10 sabores distintos. Si uno desea comprar una bolsa de 20 dulces (no necesariamente distintos). ¿Cuántas posibles bolsas se pueden formar? ¿Es $\binom{20}{10}$ o $\binom{10}{20}$?

Ejercicio 2.11. Imagine que tiene un librero con n casilleros y considere un conjunto de k libros distintos (identificado con $[k]$) que desea apilar en esos casilleros (en otras palabras, en cada casillero hay una lista ordenada de libros, que eventualmente puede estar vacía). Llamemos (n, k) -libreros a cada posible configuración. Por ejemplo, hay 12 $(3, 2)$ -libreros distintos (codificados como listas separadas por barras a continuación).

|12| | | ; |12| | ; | |12| ; |21| | | ; | |21| | ; | |21| ;
 |1|2| | | ; |1| |2| | ; |2|1| | | ; |2| |1| | ; | |1|2| | ; | |2|1| | .

Definamos (provisoriamente), $n^{\bar{k}}$ como el cardinal del conjunto de los (n, k) -libreros. Pruebe por inducción² en k que

$$n^{\bar{k}} = n(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1) = \prod_{i=n}^{n+k-1} i = (n+k-1)^{\underline{k}}.$$

La cantidad $n^{\bar{k}}$ se conoce como factorial creciente de n sobre k . ¿Puede dar una demostración combinatorial de la identidad³ $n^{\bar{k}} = (n+k-1)^{\underline{k}}$?

Ejercicio 2.12. Usando el ejercicio anterior se puede notar que para $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \llbracket n \geq 1 \rrbracket \binom{n+k-1}{k} + \llbracket n = k = 0 \rrbracket \\ &= \llbracket n \geq 1 \rrbracket \frac{(n+k-1)^{\underline{k}}}{k!} + \llbracket n = k = 0 \rrbracket = \llbracket n \geq 1 \rrbracket \frac{n^{\bar{k}}}{k!} + \llbracket n = k = 0 \rrbracket = \frac{n^{\bar{k}}}{k!}. \end{aligned}$$

Pruebe combinatorialmente la igualdad resultante. Específicamente, pruebe de manera biyectiva que

$$k! \binom{n}{k} = n^{\bar{k}}.$$

Indicación: Recuerde como se probó que

$$k! \binom{n}{k} = n^{\underline{k}}.$$

Ejercicio 2.13. Hay n personas en una fila. Queremos asignarle a cada una de ellas un número del 1 al 9 de modo que para cada persona (excepto los extremos), la diferencia entre los números de sus vecinos izquierdo y derecho no sea divisible por 3. ¿De cuántas formas podemos lograr esto?

Ejercicio 2.14. Encuentre, para $n \in \mathbb{N}$ la cantidad de conjuntos de números enteros entre $-n$ y n (inclusive) que no contienen dos elementos con el mismo valor absoluto.

Ejercicio 2.15. Un cubo de 1 metro se subdivide en 1000 cubitos de 10 por 10 por 10 cm. ¿Cuántos cubitos tienen sus tres coordenadas (fila, columna, altura) distintas?

Ejercicio 2.16. Encuentre la cantidad de números entre 0 y 999999 cuya expresión decimal es una secuencia estrictamente decreciente de dígitos al ser leído de izquierda a derecha.

Ejercicio 2.17. Considere un tablero cuadrulado de $n \times n$ casilleros. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar en dicho tablero una ficha roja y una ficha azul de forma que no queden en casilleros contiguos (horizontal o verticalmente)? ¿Cómo cambia su respuesta si se desean ubicar dos fichas blancas indistinguibles que cumplan la propiedad anterior?

Ejercicio 2.18. Sea $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Encuentre una fórmula para el número de divisores positivos de n en función de su descomposición prima.

Ejercicio 2.19. Pruebe combinatorialmente que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_k \binom{n}{2k} = \sum_k \binom{n}{2k+1} + \llbracket n = 0 \rrbracket$$

²Piense que está *poniendo* los libros uno a uno en el librero.

³Para el lado derecho piense que está *sacando* los libros uno a uno del librero.

Ejercicio 2.20. Pruebe combinatorialmente que para todo $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=1}^{n-1} k!k = n! - 1$$

Ejercicio 2.21. Demostrar combinatorialmente que para todo $n, k \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=1}^n k! \leq n^n, \quad \binom{n}{k} \geq \sum_{j=1}^k \binom{n}{j}.$$

Ejercicio 2.22. Una torre es una pieza de ajedrez que puede atacar a piezas en su misma fila o columna. Responda las siguientes preguntas en orden (no se salte partes, use la solución más simple que encuentre para cada una, justificándola apropiadamente)

1. Sea $k \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $k \times k$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?
2. Sean $k, n \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $n \times n$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?
3. Sean $k, n, m \in \mathbb{N}$ ¿De cuántas maneras se pueden ubicar k torres indistinguibles en un tablero rectangular de $n \times m$ casilleros de modo tal que ninguna torre pueda atacar a otra?