MA1101 - Introducción al Álgebra

Auxiliar 10

Matías Azócar Carvajal

Universidad de Chile

07 de Julio de 2020

Resumen

Estructuras algebraicas

- **Def:** Dado un conjunto A no vacío. Una *ley de composición interna* (o *l.c.i*) en A es una función

$$\begin{aligned} * : A \times A &\rightarrow A \\ (x, y) &\rightarrow x * y \end{aligned}$$

Es decir, una operación que toma dos elementos de un conjunto cuyo resultado es un elemento del conjunto.

- Ejemplos de ello son:
- $+$ en $\mathbb{R}$
- $\cdot$ en $\mathbb{Q}$
- $\cup$ en $\mathcal{P}(A)$, donde A es un conjunto
- entre otros...

Resumen

Estructuras algebraicas

- Si $*$ es una *l.c.i.* sobre A , entonces al par $(A, *)$ lo llamamos estructura algebraica.
- Si tenemos una segunda operación Δ sobre A , entonces denotamos por $(A, *, \Delta)$ la estructura algebraica que considera ambas leyes de composición interna en A .
- Ejemplos de ello son:
 - $(\mathbb{N}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$
 - $(\{V, F\}, \wedge, \vee)$
 - entre otros...

Resumen

Estructuras algebraicas

- Recuerdo de la estructura $(\mathbb{Z}_n, +_n, \cdot_n)$
- $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$
- $[a]_n +_n [b]_n = [a + b]_n \longrightarrow$
- $[a]_n \cdot_n [b]_n = [a \cdot b]_n$
- Esto será importante para los próximos contenidos, así que vale la pena mencionarlo (es una estructura algebraica con dos l.c.i.)
- En general, en vez de escribir tantas cosas sub n , haremos lo siguiente

$$a + b \equiv c \pmod{n}$$

señalando que todo es trabajo en $\mathbb{Z}_n$

$\mathbb{Z}/\equiv_n$

$$\begin{aligned} &k \cdot n + a + k' \cdot n + b \\ &= (k + k') \cdot n + a + b \\ &= [a + b]_n \end{aligned}$$

Resumen

Estructuras algebraicas

Las *l.c.i.* tienen las siguientes posibles propiedades:

- Asociatividad $\forall x, y, z (x * y) * z = x * (y * z)$
- Elemento neutro (e), $\forall x, x * e = e * x = x$
- Inverso x de y y viceversa $x * y = y * x = e$
- Conmutatividad $\forall x, y x * y = y * x$
- Absorbente (a), $\forall x, x * a = a$
- Idempotente (a), $a * a = a$
- Cancelable (a),

$$\forall x, y a * x = a * y \Rightarrow x = y \wedge x * a = y * a \Rightarrow x = y$$

- Δ distribuye respecto a $*$

$$\forall x, y, z x \Delta (y * z) = (x \Delta y) * (x \Delta z) \wedge (x * y) \Delta z = (x \Delta z) * (y \Delta z)$$

Estructuras Algebraicas

P1.

Dado un conjunto no vacío A , sea $F = \{f : A \rightarrow A \mid f \text{ es biyectiva}\}$.
Se define la operación $*$ de la siguiente manera:

$$\forall f, g \in F, f * g = f \circ g$$

- Pruebe que $*$ es una ley de composición interna.
- Estudie la asociatividad de $*$
- Estudie la conmutatividad de $*$
- Encuentre el elemento neutro de $*$
- Estudie la existencia de elementos inversos en F .

Estructuras Algebraicas

Demostración

i) $*$ es l.c.i. $\rightarrow$ cómo dem. eso? $f \circ g \in F \dots$ pero, es así?

$$F = \{ f \mid f: A \rightarrow A \text{ y es biyectiva} \}$$

$$f, g \in F \Rightarrow f \circ g \in F? \quad f \circ g: A \rightarrow A \quad \begin{array}{l} \text{pues } g: A \rightarrow A \text{ y} \\ f: A \rightarrow A. \end{array}$$

$f \circ g$ es biy. pues tanto f como g son biyectivos.

ii) Asociatividad: Sí, por contenidos vistos anteriormente.

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

$$(f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))) = f \circ (g \circ h)(x)$$

Estructuras Algebraicas

Demostración iii) Conmutatividad ¿sí o no?

$$f \circ g \neq g \circ f, \quad f, g \in F.$$

$$\begin{array}{l} f: 2x+3 \\ g: x+1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} (f \circ g)(x) = 2(g(x)) + 3 = 2(x+1) + 3 = 2x+5 \\ (g \circ f)(x) = (f(x)) + 1 = 2x+3+1 = 2x+4 \end{array}$$

iv) elemento neutro: $f(x) = x$ ojalá apañe.

$$f \circ g = g \circ f = g \quad \forall g \in F.$$

$$\begin{array}{l} (f \circ g)(x) = f(g(x)) = g(x) \\ (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x) \end{array} \Rightarrow = g(x) \quad \text{luego, } f \text{ es elemento neutro.}$$

Estructuras Algebraicas

Demostración or) Sea $g \in F$, queremos ver si g tiene inverso: (i será el inverso)

$g \circ i = i \circ g = f \rightarrow f$ es la identidad
(quizás llamarlo e sería mejor)

Intuitivamente, los meches proponen la función inversa. ¿Será que con eso están listos?

- las funciones en f son biyectivas, entonces tienen inversa.
- van de A en A entonces sus inversas también.
- la inversa también es biyectiva, entonces está en F .

Luego, $g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = \text{Identidad} \rightarrow$ todos los elementos de F tienen inv.

Estructuras Algebraicas

P2.

Sea $S = \{a, b, c\}$ (donde a , b y c son todos distintos) y $*$ la ley de composición interna dada por la siguiente tabla

$*$	a	b	c
a	c	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

$$\rightsquigarrow a * c = a$$

Determine si $*$ es asociativa en S .^{*} Identifique el elemento neutro^{*} de S , encuentre los inversos para $*$ y determine si son únicos. ✓

ii) c es el elemento neutro (basta ver su fila y su columna)

$$i) (a * b) * c = a * (b * c) \Rightarrow a * b = a * b$$

Estructuras Algebraicas

Demostración

*	a	b	c
a	c	c	a
b	c	a	b
c	a	b	c

$$(x * y) * z = x * (y * z)$$

$$\begin{array}{ccc}
 & a & b \\
 & \swarrow & \searrow \\
 (a * b) * b & & a * (b * b) \\
 \parallel & & \parallel \\
 c * b & & a * a \\
 \parallel & & \parallel \\
 b & \neq & c
 \end{array}$$

* no asocia.

inversos: $x * i = i * x = c$

$a * a = c \rightarrow a$ es inverso de si mismo

$a * b = c \rightarrow a$ es inverso de b y viceversa.

$b * a = c$

$c * c = c$

no son únicos, pues a tiene 2 inversos.

Estructuras Algebraicas

P3.

Considere la estructura algebraica $(\mathbb{Z}_5, \cdot_5)$.

- Construya la tabla para la operación $\cdot_5$ en $\mathbb{Z}_5$.
- ¿Es $(\mathbb{Z}_5, \cdot_5)$ un grupo?
- Muestre que $(\mathbb{Z}_5 \setminus \{[0]\}, \cdot_5)$ es un grupo abeliano.
- ¿Es $(\mathbb{Z}_4, \{[0]\}, \cdot_4)$ un grupo?

Estructuras Algebraicas

Demostración

$$(a, b) * (1, 0) = (a \cdot 1, b \cdot 1 + 0) \\ = (a, b)$$

$$(1, 0) * (a, b) = (1 \cdot a, 0 \cdot a + b) \\ = (a, b)$$

$\Rightarrow (1, 0)$ es el neutro.

Estructuras Algebraicas

Demostración

$$\begin{aligned} & (\alpha c, bct + d) * (e, f) \\ & (\alpha ce, bce + de + f) \\ & (\alpha, b) + (ce, de + f) \\ & (\alpha ce, bce + de + f) \end{aligned}$$

$\alpha \neq 0 \Rightarrow \text{invert.}$

$$(\alpha, b) * (i_1, i_2) = (1, 0)$$

$$(\alpha i_1, b i_1 + i_2) = (1, 0) \rightarrow i_1 = \frac{1}{\alpha}$$

$$\frac{b}{\alpha} + i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = -\frac{b}{\alpha}$$

Estructuras Algebraicas

Demostración $(\mathbb{Z}_m, +_m) \rightarrow \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$

i) $+_m$ es asociativa:

$$\begin{aligned} & \underbrace{([a]_m +_m [b]_m)} +_m [c]_m \\ & [a+b]_m +_m [c]_m = [(a+b)+c]_m \\ & = [a+(b+c)]_m = [a]_m +_m [b+c]_m \\ & = [a]_m +_m ([b]_m +_m [c]_m) \end{aligned}$$

Estructuras Algebraicas

Demostración • $e + [a]_m = [a]_m + e = [a]_m$

$[0]_m + [a]_m = [a+0]_m = [a]$, lo mismo en
la otra dirección. $\therefore [0]_m$ es neutro para $+_m$.

• Sea $[a]_m \in \mathbb{Z}_m$.

$[a]_m + i = [0]_m$, $i + [a]_m = [0]_m$

el candidato (el buen candidato) es $[m-a]_m$

reemplazando:

$$[a]_m + [m-a]_m = [a+m-a]_m = [m]_m = [0]_m$$

$$[m-a]_m + [a]_m = [m-a+a]_m = [m]_m = [0]_m$$

Estructuras Algebraicas

Demostración ¿Por qué $[m-a]_m$ y no solo $[-a]_m$?

Son lo mismo, pero, la definición del conjunto $\mathbb{Z}_m$ es con clases representadas por enteros de 0 a $m-1$, $-a$ estaría fuera, para evitar problemas, usamos $m-a$.

$$0 \leq a \leq m \Rightarrow 0 \geq -a \geq -m$$

$$m \geq m-a \geq 0 \Rightarrow [m-a]_m \in \mathbb{Z}_m.$$

Luego, todos los elementos de $\mathbb{Z}_m$ son invertibles para $+$.

Estructuras Algebraicas

Demostración

$$\begin{aligned} [m]_m &= k \cdot m + m = (k+1) \cdot m + 0 \\ &\Rightarrow [m]_m = [0]_m. \end{aligned}$$