FI1000-7 Introducción a la Física Clásica

Profesor: Roberto Rondanelli

Auxiliares: Tomás Vatel R. & José López M.

Ayudantes: Dayna Sheldon, Enzo Bassano & Miguel Letelier

Auxiliar #7: Trabajo y Energía

12 de mayo de 2021

- P1.** En un parque de entreteniciones, un carro de masa m se desliza por una rampa sin roce desde una altura h , partiendo inicialmente desde el reposo. El carro, luego de bajar por la rampa, ingresa a un loop de radio R . Emergiendo del loop, el carro ingresa a la región de frenado, donde en un trayecto de largo L se tiene un coeficiente de roce cinético μ_c . Sin embargo, el carro no alcanza a detenerse durante la primera pasada, siguiendo de largo para colisionar con un resorte de constante elástica k . El carro vuelve a ingresar a la región de frenado y finalmente se detiene en el centro de ella.

- ¿Qué condición deben satisfacer h y R para que el carro, por lo menos, alcance a llegar al punto B ?
- Suponiendo que se cumple lo anterior, encuentre la velocidad v_B del carro en el punto B ubicado en lo más alto del loop.
- Usando lo calculado en (b), encuentre una condición más restrictiva sobre h , tal que el carro alcance a completar todo el loop sin caerse.
- Suponiendo que se cumple lo anterior, encuentre la máxima compresión Δx que alcanza a tener el resorte.
- Encuentre una expresión para μ_c .

P2. Un bloque de masa m sube por un plano inclinado cuyo ángulo de elevación es θ . Los coeficientes de roce estático y cinético entre la masa y el plano son μ_e y μ_c respectivamente.

- ¿Qué altura máxima H que alcanza el bloque, si parte con rapidez v_0 desde la base del plano?
- ¿Qué condición debe satisfacerse para que el bloque vuelva a descender?
- Si se cumple la condición anterior, demuestre que la rapidez v_f con la que el bloque llega a la base del plano inclinado está dada por:

$$v_f = v_0 \cdot \sqrt{\frac{1 - \mu_c \cdot \cot g(\theta)}{1 + \mu_c \cdot \cot g(\theta)}}$$

d) **Propuesto:**

- Analice el caso $1 < \mu_c \cdot \cot g(\theta)$ (note que, aparentemente, v_f sería imaginaria). ¿Es esto posible?
- Si $m = 1$ kg, $\theta = 30^\circ$, $\mu_e = 0.3$, $\mu_c = 0.2$ y $v_0 = 1$ m/s, calcule numéricamente H , v_f y verifique si se cumple o no la condición de (b).