MA1102-4. Álgebra Lineal-2021.

Profesor: Jaime San Martín A.

Auxiliares: Vicky Andaur O. & Félix Brokering P.

27 de septiembre de 2021

Pauta Auxiliar 5

Espacios vectoriales

Figura 1: El robo de la identidad no es un chiste

P1 Sea $V \subseteq \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de las matrices triangulares superiores. Se define:

$$W = \{A \in V \mid \text{la suma de cada fila de } A \text{ es cero}\}$$

a) Pruebe que W es s.e.v. de V .

$$W \text{ es sev ssi } \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, A, B \in W, C = \lambda_1 A + \lambda_2 B \in W$$

Sabemos que:

$$\sum_{i=1}^3 A_{ij} = 0, \sum_{i=1}^3 B_{ij} = 0,$$

$$\text{PDQ: } \sum_{i=1}^3 C_{ij} = 0,$$

$$\text{Tenemos que } C_{ij} = \lambda_1 A_{ij} + \lambda_2 B_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^3 C_{ij} = \sum_{i=1}^3 (\lambda_1 A_{ij} + \lambda_2 B_{ij}) = \lambda_1 \sum_{i=1}^3 (A_{ij}) + \lambda_2 \sum_{i=1}^3 (B_{ij}) = 0 \text{ Por lo tanto } W \text{ es sev}$$

b) Pruebe que:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

es un generador de W .

Trivialmente $G \subseteq W$

Sea $A \in W$ arbitraria, entonces $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & d & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$, pero además

$$a + b + c = 0$$

$$d + e = 0$$

$$f = 0$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} c &= -a - b \\ e &= -d \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b & -a-b \\ 0 & d & -d \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entonces G es generador de W , ya que $\forall A \in W, \exists \lambda_1 = a, \lambda_2 = b, \lambda_3 = c, \lambda_4 = 0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$A = \begin{pmatrix} a & b & -a-b \\ 0 & d & -d \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c) Extraiga de G una base para W .

Para extraer una base basta eliminar los elementos *l.d.*

Al ojo

$$W = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

PDQ que

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si solo si $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$

Y en efecto:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & -\lambda_1 - \lambda_2 \\ 0 & \lambda_3 & -\lambda_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \implies \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

P2 a) Estudie la dependencia lineal de los siguientes conjuntos:

i) $U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \in \mathbb{R}^3$

Resolvamos la ecuación, para $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Lo que es equivalente a resolver:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$f_3 = f_3 - f_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -6 & 0 \end{array} \right)$$

$$f_2 = f_2 - f_1 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 9 & -6 & 0 \end{array} \right)$$

$$f_3 = f_3 - \frac{3}{2}f_2 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 9 & -6 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Como λ_3 es variable libre, entonces el sistema tiene infinitas soluciones y al menos una de esas es para $\lambda_3 \neq 0$, por lo tanto el U es *l.d.*

ii) $V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\} \in \mathcal{M}_{22}(\mathbb{R})$

Resolvamos la ecuación, para $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$:

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 & \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 \\ \lambda_3 + \lambda_4 & \lambda_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Lo que implica que $\lambda_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, 4\}$, por lo que V es *l.i.*

iii) $W = \{e^x, xe^x, x^2e^x\}$ en el espacio $\mathcal{F} = \{f|f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ es función}\}$.

Resolvamos la ecuación, para $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$:

$$\lambda_1 e^x + \lambda_2 x e^x + \lambda_3 x^2 e^x = 0$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2) e^x = 0$$

Como $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$ podemos dividir por e^x .

$$\lambda_1 + \lambda_2 x + \lambda_3 x^2 = 0$$

Podemos derivar respecto a x :

$$\lambda_2 + 2\lambda_3 x = 0$$

$$2\lambda_3 = 0$$

Entonces $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Por lo que W es *l.i.*

b) Sean E, F espacios vectoriales sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Sea $T : E \rightarrow F$ una función que satisface

(1) $T(0_E) = 0_F$

(2) $\forall x \in E, \forall \alpha \in \mathbb{K}, T(\alpha x) = \alpha T(x)$

(3) $\forall x, y \in E : T(x + y) = T(x) + T(y)$

Considere el conjunto $T(E) = \{y \in F : y = T(x), x \in E\}$.

i) (Propuesto) Demuestre que $T(E)$ es s.e.v. de F .

ii) Suponga además que T satisface que $\forall x \in E, T(x) = 0 \implies x = 0$. Muestre que si $\{u_1, u_2, \dots, u_n\} \subseteq E$ es l.i., entonces $\{T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_n)\} \subseteq F$ es l.i.

Que un conjunto sea l.i., implica que para $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0 \implies \lambda_i = 0 \forall i = 1, \dots, n$
 PDQ: Para $(\alpha_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R} : \sum_{i=1}^n \alpha_i T(u_i) = 0, \implies \alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i T(u_i) = 0$$

Por propiedad (2) $\alpha_i T(u_i) = T(\alpha_i u_i)$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i T(u_i) = \sum_{i=1}^n T(\alpha_i u_i) = 0$$

Por propiedad (3) e inducción sobre n **:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i T(u_i) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right) = 0$$

Por hipótesis:

$$T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right) = 0 \implies \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i = 0$$

Y como u_i es l.i., entonces $\alpha_i = 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ QED

INDUCCIÓN **:

Caso base: $n = 2 : \sum_{i=1}^2 T(a_i) = T(a_1) + T(a_2) = T(a_1 + a_2) = T(\sum_{i=1}^2 a_i)$

Suponemos que es cierto para $n = k : \sum_{i=1}^k T(a_i) = T(\sum_{i=1}^k a_i)$

Demostremos para $n = k + 1 :$

Por HI tenemos: $\sum_{i=1}^{k+1} T(a_i) = T(\sum_{i=1}^k a_i) + T(a_{k+1})$

Y finalmente por propiedad (3) $T(\sum_{i=1}^k a_i) + T(a_{k+1}) = T(\sum_{i=1}^k a_i + a_{k+1}) = T(\sum_{i=1}^{k+1} a_i)$

P3 Para $n \in \mathbb{N}$ se define $P_n(\mathbb{R})$ como el e.v de los polinomios con grado menor o igual a n a coeficientes reales.

Sea: $V = \{p(x) \in P_3(\mathbb{R}) : \exists q(x) \in P_1(\mathbb{R}), p(x) = q(x)(x^2 + 5)\}$

a) Encuentre una base de V

Los elementos de V tienen la forma: $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y $q(x)$ tiene la forma: $q(x) = b_1x + b_0$ pero además

$p(x) = (b_1x + b_0)(x^2 + 5)$, para $a_3, a_2, a_1, a_0, b_1, b_0 \in \mathbb{R}$

$p(x) = (b_1x^3 + b_0x^2 + 5b_1x + 5b_0) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$

Por lo que:

$$a_3 = b_1$$

$$a_2 = b_0$$

$$a_1 = 5b_1 = 5a_3$$

$$a_0 = 5b_0 = 5a_2$$

Entonces, reordenando $p(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + 5a_3x + 5a_2 = a_3(x^3 + 5x) + a_2(x^2 + 5)$

Entonces proponemos que $B = \{(x^3 + 5x), (x^2 + 5)\}$ es una base de V

Tenemos que $V = \langle B \rangle$

Ahora revisemos que B es l.i

$$\lambda_1(x^3 + 5x) + \lambda_2(x^2 + 5) = 0$$

Podemos derivar respecto a x :

$$\lambda_1(3x^2 + 5) + \lambda_2(2x) = 0$$

$$\lambda_1(6x) + \lambda_2(2) = 0$$

$$6\lambda_1 = 0$$

La $6\lambda_1 = 0$ ssi $\lambda_1 = 0$, y si $\lambda_1 = 0$, entonces $(\lambda_2(2) = 0$ ssi $\lambda_2 = 0)$

Por lo tanto B es *l.i.*, entonces B es base de V

b) Calcule $\dim(V)$

$$\dim(V) = \#B = 2$$

Resumen

Espacio vectorial Dado un grupo abeliano $(V, +)$ y un cuerpo $(\mathbb{K}, +, \cdot)$, con una ley de composición externa. Diremos que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ ssi la ley de composición externa satisface $\forall \lambda, \beta \in \mathbb{K}, x, y \in V$:

$$(EV1) \quad (\lambda + \beta)x = \lambda x + \beta x$$

$$(EV2) \quad \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$$

$$(EV3) \quad \lambda(\beta x) = (\lambda\beta)x$$

$$(EV4) \quad 1 \cdot x = x, \text{ donde } 1 \text{ es el neutro multiplicativo del cuerpo } \mathbb{K}.$$

En tal caso, los elementos de V se denominan vectores y los de $\mathbb{K}$, escalares.

Subespacio vectorial: Sea un espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Diremos que $U \neq \emptyset$, es un subespacio vectorial (s.e.v) de V ssi:

- $\forall u, v \in U, u + v \in U$
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u \in U, \lambda u \in U$

Es decir, ambas operaciones, la interna y la externa, son cerradas en U .

Combinación lineal Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$, y una colección de vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, y de escalares $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Denominamos combinación lineal a la suma ponderada de estos vectores:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_n v_n$$

Dependencia e independencia lineal Sea $\{v_i\}_{i=1}^n \subseteq V$, diremos que estos vectores son **linealmente dependientes** (*l.d.*) si y solo si: existen escalares $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$, no todos nulos, tales que $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0$. En caso contrario, es decir $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = 0 \implies \lambda_i = 0 \forall i = 1, \dots, n$, diremos que el conjunto de vectores $\{v_i\}_{i=1}^n$ es **linealmente independiente** (*l.i.*).

Generadores de un e.v. Sea V un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. Diremos que los vectores $v_1, \dots, v_n \subseteq V$, generan V si y sólo si:

$$\langle \{v_1, \dots, v_n\} \rangle = V$$

o de manera equivalente:

$$\forall v \in V, \exists \{\lambda_i\}_{i=1}^n \subseteq \mathbb{K}, \text{ tal que } v = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i$$

Base Dado un espacio vectorial V sobre $\mathbb{K}$, diremos que el conjunto de vectores $\{v_i\}_{i=1}^n$ es una base de V si y sólo si:

- (1) $\{v_i\}_{i=1}^n$ es un conjunto *l.i.*
- (2) $V = \langle \{v_1, \dots, v_n\} \rangle$

Teorema. Si $X = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ es un conjunto generador, entonces es posible extraer un subconjunto $B = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_s}\}$ que es base de V .

Teorema Supongamos que tenemos $B = \{v_i\}_{i=1}^n$, base de V y un conjunto arbitrario $X = \{w_i\}_{i=1}^m \subseteq V$. Si $m > n$, entonces el conjunto X es *l.d.*

Dimensión Sea V espacio vectorial, sea B base de V , $\dim(V) = \#B = n$, con n finita (si n es infinita, entonces la dimensión de V es infinita)