MA2002-3,4 Cálculo Avanzado y Aplicaciones

Profesor: Carlos Conca

Auxiliares: Fabián Ulloa, Cristóbal Godoy, Renzo Aburto, Jesús Sayes

Auxiliar 5: Integral de flujo y Teorema de la divergencia

Pregunta 1. [La consentida]

Calcule la integral de flujo del campo $\vec{F}(x, y, z) = (x^2, xy, xz)$, a través del triángulo de vértices $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$, orientado según la normal exterior.

Pregunta 2. [Ay cariño, si supieras]

Para la superficie dada por $z = x^2 + y^2, z \leq 1$. Calcule, $\iint_S \frac{x^2}{z} dA$

Pregunta 3. [El trompo, tiki tiki ti]

Calcular el flujo del campo vectorial $\vec{F} = (x, 0, -z)$ en cada una de las superficies $\Sigma_1, \Sigma_2, \Sigma_3$, cuya reunión es el borde del volumen Ω de la figura. Use para su cálculo la orientación definida por la normal exterior a Ω ,

Pregunta 4. [P1.a) C1 Electro 2021]

Una esfera de radio R genera un campo eléctrico dado por $\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 R^3}{4\epsilon_0 r^2} \hat{r}$. Determine el flujo del campo eléctrico a través del manto del cono (superficie gris).

Pregunta 5. [Terremoto de Gauss][Propuesto]

Sea Ω una región sólida de $\mathbb{R}^3$ de borde $S := \partial\Omega$. Pruebe utilizando el teorema de Gauss que:

$$\iint_S \text{rot } \vec{F} \cdot \hat{n} dS = 0$$

Definición 1 (Superficie). Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^3$ se llama superficie si existe una función continua $\vec{\varphi} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $S = \{\vec{\varphi}(u, v) \mid (u, v) \in D\}$. La función φ se llama parametrización de la superficie. Esta además puede ser:

- Suave: $\vec{\varphi} \in C^1$
- Simple: $\vec{\varphi}$ es inyectiva.

Definición 2 (Vectores Tangente). Se definen los vectores tangentes a S en el punto $\varphi(u_0, v_0)$, mediante:

$$\hat{t}_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u} / \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial u} \right\| \quad \hat{t}_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v} / \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial v} \right\|$$

Definición 3 (Parametrización y Superficie Regular). Y se dirá que φ es regular si $\hat{t}_u, \hat{t}_v$ son linealmente independientes. Además, diremos que una superficie es regular si admite una parametrización $\vec{\varphi} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, que es regular en todo punto $(u, v) \in \text{Int}(D)$, y que es regular por pedazos si se descompone en una unión finita de superficies regulares.

Definición 4 (Vector Normal). Definimos el vector normal a S en el punto $\varphi(u_0, v_0)$ como:

$$\hat{n} = \frac{\hat{t}_u \times \hat{t}_v}{\|\hat{t}_u \times \hat{t}_v\|}$$

Y con ello el plano tangente al plano generado por $\hat{t}_u, \hat{t}_v$, normal a $\hat{n}$.

Definición 5 (Superficie regular orientable). Diremos que una superficie regular S está orientada según el campo de vectores normales $\hat{n} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ cuando éste quede bien definido globalmente como una función continua sobre toda la superficie.

Definición 6 (Integral de superficie). Sea S una superficie simple y regular, y $\vec{\varphi} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una parametrización regular de esta. Si $\rho : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función escalar continua definida en un abierto Ω que contiene a S , definimos la integral de superficie de ρ sobre S :

$$\iint_S \rho \, dA = \iint_D \rho(\vec{\varphi}(u, v)) \cdot \left\| \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v}(u, v) \right\| \, du \, dv$$

Definición 7 (Integral de flujo). Sean S una superficie regular orientable, $\hat{n} : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo de normales continuo sobre S , y $\vec{F} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial continuo definido sobre un abierto Ω que contiene a S . Definimos la integral de flujo del campo $\vec{F}$ a través de la superficie S orientada según $\hat{n}$ mediante:

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} \, dA = \iint_D \vec{F}(\vec{\varphi}(u, v)) \cdot \left[\frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v}(u, v) \right] \, du \, dv$$

donde $\vec{\varphi} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización regular de S compatible con la orientación, esto es, tal que:

$$\hat{n} = \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v} / \left\| \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial v} \right\|$$

Teorema 1 (Gauss). Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ un abierto acotado cuya frontera $\partial\Omega$ es una superficie regular por pedazos, orientada según la normal exterior. Sea $\vec{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase C^1 sobre un abierto $U \supseteq \bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$. Entonces:

$$\iint_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot d\vec{A} = \iiint_{\Omega} \text{div}(\vec{F}) \, dV$$