Resumen Introducción al Cálculo

Matías Carvajal Pérez
Nicolás Fuenzalida Sáez

6 Trigonometría

6.1 Medida de ángulos en radianes

Definición 1 (Ángulo positivo) Dado un punto P en la circunferencia, llamaremos ángulo positivo AOP al ángulo en el que hay que rotar el rayo OA , en el sentido contrario de los punteros del reloj, para obtener el rayo OP .

La medida de este ángulo en radianes, será el largo del arco de circunferencia que va desde A hasta P , moviéndose en el sentido contrario a los punteros del reloj.

Definición 2 (Ángulo negativo) Llamaremos **ángulo negativo** AOP al ángulo en el que hay que rotar el rayo OA , en el sentido de los punteros del reloj, para obtener el rayo OP .

Algunos ángulos positivos

Algunos ángulos negativos

6.2 Funciones trigonométricas

Dado $x \in \mathbb{R}$, sea P_x el punto de la circunferencia de centro $(0, 0)$ y de radio 1, que se obtiene al girar un ángulo cuya medida en radianes es x , partiendo desde el punto $(1, 0)$.

Definición 3 (Función coseno) Definimos la función **coseno** ($\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) como aquella que a cada x le asocia la abscisa del punto P_x .

Definición 4 (Función seno) La función **seno** ($\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) queda definida como aquella que a cada x le asocia la ordenada del punto P_x .

A partir de estas definiciones, tenemos la Identidad Trigonométrica Fundamental:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

Propiedad 1 (Función coseno)

- La función es periódica de periodo 2π .
- Es una función par. Por lo tanto bastará con conocerla en $I = [0, \pi]$ para tener su comportamiento global.
- Tiene un cero en $x = \frac{\pi}{2}$, por lo que $\cos^{-1}(\{0\}) = \{x = \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
- En $[0, \frac{\pi}{2}]$ es positiva y es negativa en $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.
- Decece en $[0, \pi]$.

Propiedad 2 (Función seno)

- La función es periódica de periodo 2π .
- Es una función impar. Por lo tanto bastará con conocerla en $I = [0, \pi]$ para tener su comportamiento global.
- Tiene un cero en $x = 0$ y otro en $x = \pi$. Luego $\sin^{-1}(\{0\}) = \{x = k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.
- En $[0, \pi]$ es siempre positiva.
- Crece en $[0, \frac{\pi}{2}]$ y decece en $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

Definición 5 (Función tangente) Se define la función tangente por $\tan : A \rightarrow \mathbb{R}$, donde $A = \{x \in \mathbb{R} : \cos(x) \neq 0\}$ que a x asocia $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$.

Propiedad 3 (Función tangente)

- La función es periódica de periodo π .
- Sus ceros son los ceros de la función sen.
- Es una función impar
- En positiva en el intervalo $(0, \frac{\pi}{2})$.
- Es estrictamente creciente en cada intervalo de la forma $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$.

6.3 Trigonometría del triángulo rectángulo

Consideremos un triángulo rectángulo de vértices A, B y C (el vértice A en el origen y rectángulo en C), de lados a, b y c , opuestos a los vértices A, B y C respectivamente, y ángulos interiores α, β y γ , se tiene que:

Teorema 1 En un triángulo rectángulo se satisface que

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}, \quad \text{sen}(\alpha) = \frac{a}{c} \quad \text{y} \quad \tan(\alpha) = \frac{a}{b}.$$

6.4 Funciones recíprocas

Definición 6 (Funciones recíprocas) Se definen:

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$$

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

$$\csc(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$$

Propiedad 4 • Si $\cos(x) \neq 0$, entonces $\tan^2(x) + 1 = \sec^2(x)$. Esto se obtiene al dividir la identidad fundamental por $\cos^2(x)$.

- Si $\text{sen}(x) \neq 0$, entonces $\cot^2(x) + 1 = \csc^2(x)$. Esto se obtiene al dividir la identidad fundamental por $\text{sen}^2(x)$.

x	$\text{sen } x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$	$\sec x$	$\csc x$
0	0	1	0	-	1	-
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	-	1	-	1
π	0	-1	0	-	-1	-
$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	-	0	-	-1

6.5 Independencia de sistemas de coordenadas

Propiedad 5 (Diferencia de ángulos en coseno)

$$\cos(\beta - \alpha) = \cos(\beta) \cos(\alpha) + \text{sen}(\beta) \text{sen}(\alpha).$$

6.6 Propiedades importantes

La ecuación anterior nos arroja una gran cantidad de información que veremos a continuación:

- $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, lo que significa que la función cos es par.
- $\cos(\beta - \pi/2) = \text{sen}(\beta)$.
- $\cos(\beta) = \text{sen}(\beta + \pi/2)$.
- $\cos(\beta + \pi/2) = -\text{sen}(\beta)$.
- $-\cos(\beta) = \text{sen}(\beta - \pi/2)$.
- $\text{sen}(-\alpha) = -\text{sen}(\alpha)$, lo que significa que la función sen es impar.
- $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$, lo que significa que la función tan es impar.

6.7 Suma y resta de ángulos

Propiedad 6 (Suma de ángulos en coseno)

$$\cos(\beta + \alpha) = \cos(\beta) \cos(\alpha) - \text{sen}(\beta) \text{sen}(\alpha).$$

Propiedad 7 (Suma de ángulos en seno)

$$\text{sen}(\beta + \alpha) = \text{sen}(\beta) \cos(\alpha) + \cos(\beta) \text{sen}(\alpha).$$

Propiedad 8 (Diferencia de ángulos en seno)

$$\text{sen}(\beta - \alpha) = \text{sen}(\beta) \cos(\alpha) - \cos(\beta) \text{sen}(\alpha).$$

Regla de los cuadrantes.

- $\text{sen}(2\pi + \alpha) = \text{sen}(\alpha)$ y $\cos(2\pi + \alpha) = \cos(\alpha)$
- $\text{sen}(2\pi - \alpha) = -\text{sen}(\alpha)$ y $\cos(2\pi - \alpha) = \cos(\alpha)$
- 1. $\text{sen}(\pi + \alpha) = -\text{sen}(\alpha)$ y $\cos(\pi + \alpha) = -\cos(\alpha)$
- 2. $\text{sen}(\pi - \alpha) = \text{sen}(\alpha)$ y $\cos(\pi - \alpha) = -\cos(\alpha)$
- 3. $\cos(\pi/2 - \alpha) = \text{sen}(\alpha)$ y $\text{sen}(\pi/2 - \alpha) = \cos(\alpha)$
- 4. $\cos(\pi/2 + \alpha) = -\text{sen}(\alpha)$ y $\text{sen}(\pi/2 + \alpha) = \cos(\alpha)$

6.8 Identidades útiles

Identidades

$$1. \tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x)\tan(y)}$$

$$2. \tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x)\tan(y)}$$

$$3. \operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)$$

$$4. \cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2(x)$$

$$5. \operatorname{sen}^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \quad \text{y} \quad \cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$$

$$6. \left| \operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \cos(x))} \quad \text{y}$$

$$\left| \cos\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1}{2}(1 + \cos(x))}$$

$$7. \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| = \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}, \quad \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{1 + \cos(x)} \quad \text{y}$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos(x)}{\operatorname{sen}(x)}$$

$$8. \operatorname{sen}(x) \pm \operatorname{sen}(y) = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{x \pm y}{2}\right) \cos\left(\frac{x \mp y}{2}\right)$$

$$9. \cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$10. \cos(x) - \cos(y) = -2 \operatorname{sen}\left(\frac{x + y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x - y}{2}\right)$$

$$11. \tan(x) \pm \tan(y) = \frac{\operatorname{sen}(x \pm y)}{\cos(x) \cos(y)}$$

Definición 7 (Co-función)

- $f = \operatorname{sen} \implies \operatorname{cof} = \cos.$
- $f = \cos \implies \operatorname{cof} = \operatorname{sen}.$
- $f = \tan \implies \operatorname{cof} = \cot.$
- $f = \cot \implies \operatorname{cof} = \tan.$
- $f = \sec \implies \operatorname{cof} = \operatorname{csc}.$
- $f = \operatorname{csc} \implies \operatorname{cof} = \sec.$

7 Trigonometría

7.1 Funciones trigonométricas inversas

Definición 8 (Arcoseno) Llamamos arcoseno a la función inversa de $f(x) = \text{sen}(x)$, es decir:

$$\text{arc sen} : [-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$$

tal que

$$y = \text{arc sen}(x) \iff x = \text{sen}(y)$$

Definición 9 (Arcocoseno) Llamamos arcocoseno a la función inversa de $f(x) = \text{cos}(x)$, o sea:

$$\text{arc cos} : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$$

tal que

$$y = \text{arc cos}(x) \iff x = \text{cos}(y)$$

Definición 10 (Arcotangente) Llamamos arcotangente a la función inversa de $f(x) = \text{tan}(x)$, o sea:

$$\text{arctan} : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$$

tal que

$$y = \text{arctan}(x) \iff x = \text{tan}(y)$$

Gráficos de arcoseno y arcocoseno.

Gráfico de arcotangente.

7.2 Ecuaciones trigonométricas

1. Consideremos la ecuación $\text{sen}(x) = a$ donde $a \in \mathbb{R}$, si $|a| \leq 1$ es fácil encontrar una solución $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$, que corresponde a $\alpha = \text{arc sen}(a)$. La solución general suele escribirse de la siguiente forma:

$$x = k\pi + (-1)^k \alpha$$

donde $k \in \mathbb{Z}$.

2. Consideremos la ecuación $\text{cos}(x) = a$ donde $a \in \mathbb{R}$, si $|a| \leq 1$ es fácil encontrar una solución $\alpha \in [0, \pi]$, que corresponde a $\alpha = \text{arc cos}(a)$. La solución general suele escribirse de la siguiente forma:

$$x = 2k\pi \pm \alpha$$

donde $k \in \mathbb{Z}$.

3. Consideremos la ecuación $\text{tan}(x) = a$ donde $a \in \mathbb{R}$, es fácil encontrar una solución $\alpha \in (-\pi/2, \pi/2)$, que corresponde a $\alpha = \text{arctan}(a)$. La solución general suele escribirse de la siguiente forma:

$$x = k\pi + \alpha$$

donde $k \in \mathbb{Z}$.

7.3 Aplicaciones en triángulos

Teorema 2 (Teorema del seno)

$$\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} = \frac{\text{sen}(\beta)}{b} = \frac{\text{sen}(\gamma)}{c} = k$$

Teorema 3 (Teorema del coseno)

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\gamma)$$