Auxiliar 3

Coordenadas ortogonales y teorema de la divergencia

Profesor: Ricardo Carlos Freire
Auxiliar: Bruno Pollarolo

Pregunta 1

Considere el cambio de variables parabólico donde

$$\begin{aligned}x &= uv \cos \theta \\y &= uv \sin \theta \\z &= \frac{1}{2}(u^2 - v^2)\end{aligned}$$

con $u, v \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi]$. Calcule los factores escalares, vectores unitarios y verifique que este es un sistema ortogonal.

Pregunta 2

De acuerdo a la teoría de Yukawa, el potencial generado en una interacción protón-neutrón está dado por

$$U(r) = -g^2 \frac{e^{-\alpha r}}{r}$$

en coordenadas esféricas, para ciertas constantes $g, \alpha > 0$.

- Encuentre la fuerza asociada para $r \neq 0$. (**Hint:** $\mathbf{F} = -\nabla U$).
- Calcule directamente el flujo a través de un casquete esférico de radio R centrado en el origen, orientado según la normal exterior.
- Pruebe que $\nabla^2 U = \alpha^2 m^2 U$, en $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.
- Demuestre que si Ω es un abierto acotado que contiene al origen, cuya frontera es una superficie regular y orientada según la normal exterior, entonces

$$\iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -4\pi g^2 - \alpha^2 m^2 \iiint_{\Omega} U dV$$

Pregunta 3

a) Sea $A \subseteq \mathbb{R}^3$ abierto no vacío y $g : A \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar C^2 . Muestre que

$$\operatorname{div}(g\nabla g) = g\Delta g + \|\nabla g\|^2 \quad \text{en } A$$

b) Considere el campo escalar h definido por $h(x, y, z) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$. Explique brevemente por qué es C^2 en $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.

c) Expresar h y ∇h en coordenadas esféricas.

d) Muestre que la derivada direccional $\frac{\partial h}{\partial \hat{u}}$ se anula en $\mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.

Indicación: Para un campo escalar f se tiene la igualdad $\frac{\partial f}{\partial \hat{u}} = \nabla f \cdot \hat{u}$, en el dominio en el que f es C^1 , y para $\hat{u}$ vector unitario.

e) Sea $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$. Calcule

$$\iiint_{\Omega} h\Delta h dV$$

Coordenadas ortogonales

Sistema de coordenadas curvilíneas: Sea $\mathbf{R} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ suficientemente diferenciable e invertible tal que a cada $(u, v, w) \in D$ le corresponde un punto $(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \in \mathbb{R}^3$.

Sistema ortogonal: Sea $\mathbf{R}$ un sistema de coordenadas. Se dice que $\mathbf{R}$ es ortogonal si los vectores

$$\mathbf{u} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u}, \quad \mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial v}, \quad \mathbf{w} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial w},$$

son mutuamente ortogonales.

Factores escalares:

$$h_u = \left\| \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial u} \right\|, \quad h_v = \left\| \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial v} \right\|, \quad h_w = \left\| \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial w} \right\|.$$

Representación de un campo vectorial en otro sistema: Sea $\mathbf{F} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase C^1 , Ω abierto y $\mathbf{R}$ un sistema de coordenadas. Se define:

$$F_u = F_u(u, v, w) = \mathbf{F}(\mathbf{R}(u, v, w)) \cdot \hat{\mathbf{u}}(u, v, w),$$

$$F_v = F_v(u, v, w) = \mathbf{F}(\mathbf{R}(u, v, w)) \cdot \hat{\mathbf{v}}(u, v, w),$$

$$F_w = F_w(u, v, w) = \mathbf{F}(\mathbf{R}(u, v, w)) \cdot \hat{\mathbf{w}}(u, v, w).$$

Se tiene que $\mathbf{F} = F_u \cdot \hat{\mathbf{u}} + F_v \cdot \hat{\mathbf{v}} + F_w \cdot \hat{\mathbf{w}}$.

Algunos sistemas de coordenadas

- Coordenadas cilíndricas: $\mathbf{R}(\rho, \theta, z) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, z)$.
- Coordenadas esféricas: $\mathbf{R}(r, \theta, \phi) = (r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta)$.

Operadores diferenciales en coordenadas ortogonales:

- Divergencia:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} := \frac{1}{h_u h_v h_w} \left(\frac{\partial}{\partial u} (F_u h_v h_w) + \frac{\partial}{\partial v} (F_v h_u h_w) + \frac{\partial}{\partial w} (F_w h_u h_v) \right)$$

- Rotor:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{h_u h_v h_w} \det \begin{pmatrix} h_u \hat{\mathbf{u}} & h_v \hat{\mathbf{v}} & h_w \hat{\mathbf{w}} \\ \frac{\partial}{\partial u} & \frac{\partial}{\partial v} & \frac{\partial}{\partial w} \\ h_u F_u & h_v F_v & h_w F_w \end{pmatrix}$$

- Gradiente:

$$\nabla f = \frac{1}{h_u} \frac{\partial f}{\partial u} \hat{\mathbf{u}} + \frac{1}{h_v} \frac{\partial f}{\partial v} \hat{\mathbf{v}} + \frac{1}{h_w} \frac{\partial f}{\partial w} \hat{\mathbf{w}}$$

Teoremas fundamentales

Integral de línea: La integral de línea de una función $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sobre Γ , parametrizada por la función $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ se calcula como

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(\tau)) \cdot \frac{d\mathbf{r}}{d\tau} d\tau$$

Propiedad: $\mathbf{F} = -\nabla g \Rightarrow \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

Integral de flujo: La integral de flujo de una función $\mathbf{F} : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ sobre S , parametrizada por la función $\mathbf{r} : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se representa por

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dS = \iint_U \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) (u, v) du dv$$

donde $dS = \left\| \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) \right\| du dv$.

Teorema de Stokes: Sea $S \subseteq \mathbb{R}^3$ una superficie regular por trozos cuyo borde $\Gamma = \partial S$ es una curva cerrada, simple y regular por trozos. Sea $\mathbf{F} : \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase C^1 tal que $\Lambda \supseteq S \cup \partial S$ con Λ abierto, entonces

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \quad (1)$$

donde Γ se recorre en sentido antihorario con respecto a $\hat{\mathbf{n}}$ (se satisface regla de la mano derecha).

Teorema de Green (Stokes 2D): Aplicando el Teorema de Stokes para $S \subseteq \mathbb{R}^2$ y $\mathbf{F} : \Lambda \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ entonces

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Teorema de la divergencia (o Gauss): Sea $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ abierto acotado cuya frontera $\partial\Omega$ es una superficie regular por trozos orientada según la normal exterior. Sea $\mathbf{F} : \Omega_0 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial de clase C^1 tal que $\Omega_0 \supseteq \Omega = \Omega \cup \partial\Omega$, entonces

$$\oiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV \quad (2)$$

Análogamente a Stokes, en 2D el teorema de la divergencia toma la siguiente forma:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = \iint_S \nabla \cdot \mathbf{F} dS$$

lo cual para $\mathbf{F} = (P, Q)$

$$\oint_{\partial S} P dx - Q dy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

(prácticamente igual a Green).