Auxiliar 5: Polinomio Característico

Subiendo de nivel

Profesora: Gabrielle Nornberg
Auxiliares: Iñaki Ramírez, Rocío Yáñez

P1.- EDO's de orden 2

- $y'' + 3y' + 4y = 0$
- $4y'' - 12y' + 9y = 0; y(0) = 1; y'(0) = 2$
- $y'' - 7y' + 10y = 0$

P2.- Buscando soluciones

Considere el problema de Cauchy:

$$(PC) \quad u'' + \frac{2}{t}u' + V(t)u = 0, \quad u(1) = 0, \quad u'(1) = 1,$$

donde el potencial V es continuo y acotado para $t \geq 1, u' = \frac{du}{dt}$.

(a) Compruebe que el problema (PC) tiene única solución local definida positivamente en un vecindario a la derecha de $t_0 = 1$.

(b) Muestre que si u es una solución positiva de (PC) en $(1, R)$ con $u(R) = 0$ entonces $u'(R) < 0$.

P3.- Ecs. de Cauchy-Euler

Una ecuación de la forma:

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = g(x)$$

se denomina ecuación de Cauchy-Euler y una forma de resolverlas es probando una solución de la forma $y = x^m$. Resuelva las siguientes ecuaciones:

- $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$
- $4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 15y = 0; y(1) = -1; y'(1) = -\frac{1}{2}$
- $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 4x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 4x \frac{dy}{dx} = 0$

Resumen

Def. 1 (Operador a coef. constantes): Un operador diferencial lineal de orden n a coef. constantes tiene la forma:

$$P(D) = \sum_{k=0}^n a_k D^k$$

$$= a_n D^n + a_{n-1}(x) D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0,$$

Def. 2 (EDO a coef. variables): Una EDO lineal de orden n a coef. variables es de la forma general

$$P(x, D)y = \bar{Q}(x)$$

donde $P(x, D) = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k(x) D^k$ es un operador diferencial de orden n , $\bar{a}_k$ son los coef. (con $\bar{a}_n = 1$) y $\bar{Q}$ el lado derecho.

Def. 3 (EDO a coef. constantes): Una EDO lineal de orden n a coef. constantes es una identidad de la forma:

$$P(D)y = \bar{Q}(x)$$

donde $P(D) = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k D^k$, $\bar{a}_n = 1$

Def. 4 (EDO homogénea): Una EDO lineal a coef. variables o constantes se dice homogénea si $\bar{Q} \equiv 0$.

EDO lineal orden n	homogénea subespacio $\mathcal{H}$ de soluciones homogéneas	no homogénea hiperplano S de soluciones particulares
coeficientes constantes	$P(D)y = 0$ polinomio característico valores característicos	$P(D)y = \bar{Q}$ coeficientes indeterminados variación de parámetros
coeficientes variables	$P(x, D)y = 0$ fórmula de Abel fórmula de Liouville	$P(x, D)y = \bar{Q}$ representación de Green variación de parámetros

CUADRO 1. Tabla resumen del estudio de EDO lineales de este capítulo.

Def. 5 (Polinomio característico): El polinomio característico de una EDO es:

$$p(\lambda) = \sum_{k=0}^n \bar{a}_k \lambda^k$$

y sus raíces se llaman valores.

Def. 6 (Sol. de la EDO lineal): Se dice que y es solución de la EDO lineal

$$P(x, D)y = \bar{Q}$$

en el intervalo I si $y \in C^n(I)$ y $P(x, D)y(x) = \bar{Q}(x)$ para todo $x \in I$.

Def. 7 (PC. para EDO's lineales de orden n): El problema de Cauchy para EDO lineales de orden n consiste en encontrar $y \in C^n(I)$ tal que:

$$(PC) = \begin{cases} P(x, D)y(x) = \bar{Q}(x); \forall x \in I \\ (y(x_0), y'(x_0), \dots, y^{n-1}(x_0)) = (y_0^{(0)}, y_0^{(1)}, \dots, y_0^{(n-1)}), \end{cases}$$

Teo. 1 (TEU): Supongamos que las funciones $\bar{a}_k(x)$, $k = 1, \dots, n-1$ y $\bar{Q}(x)$ son continuas en I . Entonces para cada $x_0 \in I$ y para cada vector de condiciones iniciales, el PC tiene una única solución.

Cor. 1: Notemos que, bajo las hipótesis del teorema anterior, si la EDO lineal es homogénea y con condiciones iniciales nulas, la única solución es la solución nula. Esto es si $\bar{Q} \equiv 0$ y $y_0^{(k)} = 0$ para cada $k = 0, \dots, n-1$, entonces $y \equiv 0$.

Teo. 2: La solución homogénea y_h de la EDO a coeficientes constantes con valores característicos λ_1, λ_2 está dada por:

1. $y_h = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$ si $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, \lambda_1 \neq \lambda_2$.
2. $y_h = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}$ si $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$.
3. $y_h = C_1 e^{\sigma x} \sin(wx) + C_2 e^{\sigma x} \cos(wx)$ si $\lambda_{1,2} = \sigma \pm iw$, con $w \neq 0$

Def. 8 (Wronskiano): El Wronskiano de una EDO de orden 2 corresponde a:

$$W(x) = W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x)$$

Donde y_1, y_2 son sols. de la ec. homogénea.