FI3111-1 Mecánica Clásica

Profesor: Fernando Lund Plantat

Auxiliar: Manuel Díaz Zúñiga

Ayudantes: Pedro Aguilera Rojas y Kevin Vásquez

Auxiliar Extra:

8 de octubre de 2024

P1. Inestabilidad en el puente de Tacoma:

Una descripción simplificada de un puente colgante como el de Tacoma, bajo la influencia del viento es considerar que este es descrito por sus modos de torsión y desplazamiento transversales (flexión simétrica). La dinámica de estos modos cerca del equilibrio es descrita por las variables $X(t)$ e $Y(t)$ respectivamente, las cuales satisfacen las siguientes ecuaciones

$$\ddot{X} = -\omega^2 X - MY + \alpha v Y \quad (1)$$

$$\ddot{Y} = -\Omega^2 Y - MX, \quad (2)$$

Figura 1: Puente de Tacoma colapsando.

donde ω es la frecuencia natural de oscilación de los modos desacoplados, M es el término de acoplamiento elástico entre los modos, v es la velocidad del viento y α es un factor de forma.

Realice análisis de estabilidad mediante el estudio de valores propios y encuentre el valor crítico de v para el cual ocurre el fenómeno de confusión de frecuencias, es decir, cuando dos valores propios complejos conjugados colisionan (parte imaginaria distinto de cero) y se salen del eje imaginario.

Extra:

Considere el siguiente sistema físico acoplado y analice su estabilidad.

$$m\ddot{x} = -ax + cxy^2 \quad (3)$$

$$m\ddot{y} = -by + cx^2y \quad (4)$$

Con a, b de dimensiones $\left[\frac{\text{Newton}}{m}\right]$ y $c \left[\frac{\text{Newton}}{m^3}\right]$. **Hint:** Utilice la matriz Jacobiana y/o la Hessiana para sus análisis. Utilice que $\vec{F} = -\partial_x V \hat{x} - \partial_y V \hat{y}$.

P2. (Propuesto) Análogo mecánico de un Láser:

Considere el siguiente sistema mecánico, con $l = l_1 = l_2$ y $m = m_1 = m_2$, el cual consiste en un péndulo esférico al cual se añade un péndulo simple que está restringido a moverse en el plano perpendicular a la vertical, como se ve en la figura 2. Este sistema mecánico satisface la dinámica de un láser, descrito por las ecuaciones de Maxwell-Bloch.

- a) Encuentre el Lagrangiano asociado y derive las ecuaciones de movimiento.
- b) Encontrar e interpretar las cantidades conservadas. ¿Es integrable el sistema?
- c) Calcule los equilibrios del sistema y estudie su estabilidad.
- d) Estudie pequeñas oscilaciones alrededor de los equilibrios.

Figura 2: Péndulo esférico doble restringido

P3. (Propuesto) Principio de mínima acción en la superficie de la tierra:

Muestre que las geodésicas (línea de mínima longitud que une dos puntos en una superficie dada, y está contenida en esta superficie) de una superficie esférica corresponden a circunferencias cuyo centro coincide con el de la esfera. **Hint:** Plantee una ecuación de movimiento y luego describa que condición deben cumplir los puntos de la superficie para intersectar al plano.

Figura 3: Geodésicas trazadas por vuelo entre París y Tokio.

P4. (Propuesto) Potencial de Yukawa para fuerzas centrales:

En 1935, Hideki Yukawa propuso el siguiente potencial para modelar la interacción nuclear fuerte que ocurre entre nucleones (protones y neutrones). Considere el siguiente potencial central

$$U(r) = -\frac{\alpha e^{-\beta r}}{r}, \tag{5}$$

donde $\alpha, \beta > 0$.

Figura 4: Nucleo atómico.

- a) Encuentre el potencial efectivo $U_{eff}(r)$ asociado a una partícula de masa m que orbita en un radio r .
- b) Estudie las orbitas del sistema y determine la energía mecánica E y la magnitud l_0 del momento angular asociados a una órbita circular de radio R bajo este potencial. ¿Que tipo de trayectorias exhibe?
- c) Calcule la expresión para dichas orbitas.
- d) Estudie el límite de la expresión cuando r es muy grande. ¿Qué forma adquiere el potencial?

P5. (Propuesto) Scattering y Ley de Snell:

Considere una partícula de energía E la cual pasa por una región con potencial $-V_0$ (ver figura 5).

Figura 5: Ley de Snell para región de potencial $-V_0$.

- a) Muestre que la partícula es refractada y que el ángulo de incidencia, θ_0 , y el ángulo de refracción, θ_1 , satisfacen la Ley de Snell

$$\frac{\sin(\theta_0)}{\sin(\theta_1)} = n, \tag{6}$$

donde los ángulos son medidos con respecto a la normal y $n = \sqrt{1 + V/E}$ es el índice de refracción.

- b) Si una partícula que incide con un parámetro de impacto b sobre un potencial cuadrado

$$V(r) = \begin{cases} -V_0 & \text{si } r \leq a \\ 0 & \text{si } r > a. \end{cases} \tag{7}$$

es scattereada en un ángulo θ que satisface la relación

$$\frac{b^2}{a^2} = \frac{n^2 \sin^2(\theta/2)}{n^2 + 1 - 2n \cos(\theta/2)} \tag{8}$$

- c) Calcule la sección eficaz diferencial de scattering.

P6. (Propuesto) Cono rodante:

Considere un cono recto homogéneo de masa total M , con base de radio R , altura h , y con un ángulo de apertura 2α , como se ve en la figura 6.

Figura 6: Cono rodante. a) Cono sobre el plano. b) Cono con vértice en altura.

- a) Demuestre que los momentos principales de inercia con respecto al vértice del cono son $I_1 = I_2 = \frac{3M}{5} \left(\frac{R^2}{4} + h^2 \right)$, $I_3 = \frac{3MR^2}{10}$
- b) Determine el Lagrangiano y las ecuaciones de movimiento para cuando el cono rueda sobre un plano (figura 6.a)
- c) Determine el Lagrangiano y las ecuaciones de movimiento para cuando la base del cono rueda sobre un plano y cuyo vértice está fijo a una altura sobre el plano igual al radio de la base (figura 6.b).

P7. (Propuesto) Péndulo en parábola

Considere una parábola de concavidad α , la cual tiene roce despreciable con la superficie. Un anillo de masa despreciable puede deslizarse sobre la parábola sin roce. El anillo tiene a su vez enlazado un péndulo de masa m y largo l , el cual está restringido a moverse en el plano de la parábola. La parábola es sometida a girar con respecto a la vertical con una velocidad angular ω constante, como muestra la Figura 7.

Figura 7: Péndulo de Andronov modificado.

- Encontrar el Lagrangiano del péndulo y las ecuaciones de movimiento del péndulo.
- Encontrar los equilibrios del sistema para pequeñas oscilaciones, en función del espacio de parámetros del sistema.
- Considere que existe un roce lineal proporcional a la velocidad de la masa con la superficie, con constante de proporcionalidad λ . Caracterice los equilibrios como en el ítem anterior. Puede realizar todas las aproximaciones que estimen convenientes, justificándolas. Puede ser útil resolver numéricamente para corroborar los resultados analíticos.
- Caracterizar numéricamente las bifurcaciones en el espacio de fase del sistema con y sin roce.