Departamento de Ingeniería Matemática

MA3801 Análisis

Primavera 2024

Profesora: Hanne Van Den Bosch

Auxiliares: Martín Berríos y Ricardo Ziegele

fcfm

Ingeniería Matemática

FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Auxiliar 3: Espacios métricos completos y punto fijo

P1. (Aplicación de punto fijo de Banach)

Sea $C([a, b], \mathbb{R})$ el espacio de las funciones reales continuas con dominio en el intervalo $[a, b]$, y sea la métrica d_∞ la métrica inducida por la norma del supremo esencial, i.e

$$d_\infty(f, g) = \|f - g\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)|$$

- Pruebe que el espacio métrico $((C([a, b], \mathbb{R}), d_\infty)$ es completo.
- Dada la siguiente ecuación integral

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_a^b k(x, y) f(y) dy$$

donde $g(x) \in C([a, b], \mathbb{R})$, $k(x, y) \in C([a, b]^2, \mathbb{R})$, encuentre las condiciones sobre λ para que exista solución a esta ecuación. (**Hint:** Note que la ecuación es de la forma $T(f) = f$, y use Punto fijo de Banach)

P2. (Propiedades de espacios completos)

- Suponga (X, d_1) y (Y, d_2) dos espacios métricos, donde (X, d_1) es completo. Sea E un conjunto cerrado en X y sea $f : E \rightarrow Y$ una función continua. Pruebe que, si se tiene

$$d_2(f(x_1), f(x_2)) \geq d_1(x_1, x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in X$$

Entonces $f(E)$ es cerrado.

- Sea $f : (X, d_1) \rightarrow (Y, d_2)$ una isometría sobreyectiva. Pruebe que si (X, d_1) es completo, entonces (Y, d_2) lo es también.
- Dados (X, d_1) , (Y, d_2) espacios métricos completos, pruebe que $Z = X \times Y$ es completo con la métrica del producto

$$\rho((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = ((d_1(x_1, x_2))^2 + (d_2(y_1, y_2))^2)^{\frac{1}{2}}$$

P3. (Teorema de Picard-Lindelöf via punto fijo) Sea el problema de valor inicial

$$\frac{dx(t)}{dt} = f(t, x), \quad x(0) = x_0$$

donde $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función dada y $x(t)$ es la función desconocida de la EDO. Usaremos el teorema de punto fijo de Banach para demostrar el teorema de Picard-Lindelöf, que nos asegura existencia y unicidad de la solución de la ecuación anterior. Recordemos el enunciado del teorema:

Teorema (Picard-Lindelöf). Sea f continua en un rectángulo

$$R = \{(t, x) : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\},$$

y por tanto acotada en R , digamos $|f(t, x)| \leq c$. Supongamos que f satisface una condición de Lipschitz en R con respecto a su segundo argumento, es decir, existe una constante k tal que

$$|f(t, x) - f(t, y)| \leq k|x - y| \quad \text{para todo } (t, x), (t, y) \in R.$$

Entonces, el problema de valor inicial tiene una solución única que existe en un intervalo $[t_0 - \beta, t_0 + \beta]$, donde

$$\beta < \min \left\{ a, \frac{b}{c}, \frac{1}{k} \right\}.$$

- a) Re-escriba la EDO en forma de una ecuación integral y enuncie el problema integral equivalente.
- b) Forme un operador T sobre un espacio completo **Hint:** ¿Qué espacio demostramos en la P1 que era completo?
- c) Pruebe que el operador T es una contracción.
- d) Concluya mediante el teorema de punto fijo de Banach que la EDO inicial tiene solución y esta es única.