Auxiliar 4: Trigonometría

Profesora: Jessica Trespalcios J.
Auxiliar: Ignacio Dagach Abugattas

P1. Para comenzar

Encuentre los valores $x \in \mathbb{R}$ que satisfacen las siguientes ecuaciones trigonométricas:

a) $4 \sin\left(\frac{x}{4}\right) + 2 \cos\left(\frac{x}{2}\right) = 3$

b) $\sin(2x) \cos(x) = 6 \sin^3(x)$

c) $\sqrt{3} \sin(x) + \cos(x) = 1$

d) $(1 - \tan(x))(\sin(2x) + 1) = 1 + \tan(x)$

Demuestre las siguientes identidades trigonométricas:

e) $\cos(4x) = 1 - 8 \sin^2(x) \cos^2(x)$

f) $\cos(4x) = \frac{1 - \tan^2(2x)}{1 + \tan^2(2x)}$

g) $\frac{1}{2} \sin(x) \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos(x) \tan\left(\frac{x}{2}\right) = \sin(x)$

h) $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$,
además analícelo gráficamente

i) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$,
además analícelo gráficamente

j) $\cot(x) = \tan\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$

k) $\sin^4(x) + 4 \cos^2(x) = (1 + \cos^2(x))^2$

l) $\cos^2(y) - \sin^2(x) = \cos(x - y) \cos(x + y)$

m) $\cos(x + y) = 0 \implies \sin(x + 2y) = \sin(x)$

P2. Auxiliar 3.5: Funcionometría

- a) Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{|x|}{1 + |x|}$. Estudie la paridad de f y encuentre el conjunto imagen $\text{Im}(f)$. Pruebe que f es inyectiva en $[0, \infty)$ y encuentre una fórmula para $f^{-1}: \text{Im}(f) \rightarrow [0, \infty)$. Pruebe que f es estrictamente creciente en $[0, \infty)$ y estrictamente decreciente en $(-\infty, 0]$.
- b) Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = a - \sin(2x)$, con $a \in \mathbb{R}$ constante. Determine la paridad, el período mínimo, el/los cero/s de f y realice un esbozo del gráfico de f .
- c) Considere la función $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \tan(x) - \sin(2x)$. Determine el dominio de f , la paridad, el período mínimo y el/los cero/s de f .
- d) Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = |\sin(x)| + \cos(2x) - 1$. Determine la paridad, verifique que es periódica de período π y encuentre el/los cero/s de f en el intervalo $[0, \pi]$.

P3. Considere el siguiente triángulo

- a) Demuestre que el área A del triángulo está dada por $A = \frac{c^2}{2} \cdot \frac{\text{sen}(\alpha) \text{sen}(\beta)}{\text{sen}(\alpha + \beta)}$

[**Sugerencia:** Use el teorema del seno para expresar la altura trazada desde el vértice C , en función de c, α, β, γ .]

- b) Use el teorema del coseno para probar que si $a = 5$, $b = 7$ y $c = 11$, entonces el triángulo ABC tiene un ángulo que mide más de 90° y uno que mide menos de 30° .

0[**Nota:** Puede usar que $\frac{145}{154} > \frac{\sqrt{3}}{2}$.]

- 3) Demuestre que $b \cos(\gamma) - c \cos(\beta) = \frac{b^2 - c^2}{a}$

- iv) Use el teorema del seno para probar que $\frac{a + b}{c} = \frac{\text{sen}(\alpha) + \text{sen}(\beta)}{\text{sen}(\gamma)}$

- v) Demuestre la identidad trigonométrica $\text{sen}(\alpha) + \text{sen}(\beta) = 2 \text{sen}\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$

- vi) Use las partes iv), v) y una fórmula de ángulo doble para probar la fórmula de

$$\text{Mollweide } \frac{a + b}{c} = \frac{\cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)}{\text{sen}\left(\frac{\gamma}{2}\right)}$$

- 7) Demuestre que $a^2 + b^2 + c^2 = 2ab \cos(\gamma) + 2ac \cos(\beta) + 2bc \cos(\alpha)$

- 8) Demuestre que existe una constante $K \in \mathbb{R}$ que cumple que $A = \frac{1}{2} K abc$

- ix) Demuestre que:

$$\frac{\text{sen}(\alpha - \beta)}{\text{sen}(\alpha + \beta)} = \frac{\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} \frac{(a^2 + c^2 - b^2)}{2c} - \frac{\text{sen}(\beta)}{b} \frac{(b^2 + c^2 - a^2)}{2c}}{\frac{\text{sen}(\alpha)}{a} \frac{(a^2 + c^2 - b^2)}{2c} + \frac{\text{sen}(\beta)}{b} \frac{(b^2 + c^2 - a^2)}{2c}}$$

y utilícelo para concluir que:

$$\frac{\text{sen}(\alpha - \beta)}{\text{sen}(\alpha + \beta)} = \frac{a^2 - b^2}{c^2}$$