

MA1001-6 Introducción al Cálculo-2025.

Profesora: Jessica Trespalacios J.

Auxiliar: Sebastián P. Pincheira

26 de mayo de 2025



AUXILIAR EXTRA I

Sucesiones

Problema 1. Demuestre la continuidad de la raíz cuadrada. Es decir, para cualquier sucesión no negativa convergente (a_n) , $(\sqrt{a_n})$ converge y $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{\lim a_n}$.

Solución. Sea $l = \lim a_n$. Queremos mostrar que $\lim \sqrt{a_n} = \sqrt{l}$. Si $l \neq 0$, se tiene que $|\sqrt{a_n} - \sqrt{l}| = |(\sqrt{a_n} - \sqrt{l})(\sqrt{a_n} + \sqrt{l})| / (\sqrt{a_n} + \sqrt{l}) \leq |a_n - l| / \sqrt{l}$. Como $a_n - l \rightarrow 0$, se sigue que $|\sqrt{a_n} - \sqrt{l}| \rightarrow 0$ con lo que $\sqrt{a_n} \rightarrow \sqrt{l}$. Ahora, si $l = 0$, sea $\varepsilon > 0$ y n_0 tal que si $n \geq n_0$, entonces $|a_n| < \varepsilon^2$ (recordemos que $a_n \geq 0$), entonces $\sqrt{a_n} < \varepsilon$. Se sigue que $|\sqrt{a_n} - \sqrt{l}| = \sqrt{a_n} < \varepsilon$ y se concluye que $\sqrt{a_n} \rightarrow l$. $\square$

Problema 2. (a). ¹ (2 pts.) Sea $s_n = 3 + \frac{\sqrt{n}}{2n+3}$. Sea $\varepsilon > 0$. Muestre que existe un n_0 para el que se cumpla que si $n \geq n_0$ entonces

$$|s_n - 3| < \varepsilon.$$

(b). ² ($\geq$ 2 pts.) Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones tal que $a_n \rightarrow l$ y $b_n \rightarrow r$. Demuestre que $\max\{a_n, b_n\} \rightarrow \max\{l, r\}$.

(c). ³ Calcule

$$1). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sin \left(\frac{n^n n!}{\sqrt{n+1}} \right)$$

$$2). \lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 1} - n)n$$

$$3). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4 + 2n^2}{n^4 + 5n^3 + 3n + 6}$$

$$4). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{n} + \frac{3}{\sqrt{n}} \cos \left(\frac{n^n}{n!} \right) + \frac{2n+1}{3-3n}}{\frac{2^n}{n!} + \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{1-\frac{n!}{n}}}$$

$$5). \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + n}{na_n^2 + 1} \text{ donde } a_n \rightarrow l.$$

Solución. (a). Se quiere $|s_n - 3| < \varepsilon$, es decir $\sqrt{n}/(2n+3) < \varepsilon$. Se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{n}}{2n+3} &\leq \frac{\sqrt{n}}{2n} \\ &\leq \frac{\sqrt{n}}{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

con lo que basta que $\sqrt{1/n} < \varepsilon$ para que $|s_n - 3| < \varepsilon$. Sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para cualquier $n \geq n_0$, $1/n < \varepsilon^2$, este n_0 existe pues $1/n \rightarrow 0$. Se sigue que, si $n \geq n_0$, entonces $1/n < \varepsilon^2$, entonces $\sqrt{1/n} < \varepsilon$, entonces $|s_n - 3| < \varepsilon$.

¹MA1001-4 (Otoño 2020). Control 3, P1 (b).

²MA1001-4 (Otoño 2020), Auxiliar #10. P1. Este problema salió en el control del mismo semestre con $(a_n) = (1)$ y $r = 1$ (MA1001-4 (Otoño 2020). Control 3, P1 (c).).

³MA1001-4 (Otoño 2020), Auxiliar #10. P3.

(b). Se tiene que para cualquier $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\max\{x, y\} = \frac{x + y + |x - y|}{2}.$$

Con lo que se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \max\{a_n, b_n\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + b_n + |a_n - b_n|}{2} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n|}{\lim_{n \rightarrow \infty} 2} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - b_n|}{2} \\ &= \frac{l + r + |\lim_{n \rightarrow \infty} a_n - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n|}{2} \\ &= \frac{l + r + |l - r|}{2} \\ &= \max\{l, r\}. \end{aligned}$$

(c). 1). El primer termino es nulo y el segundo es acotado. Se sigue que $\frac{1}{n} \sin\left(\frac{n^n n!}{\sqrt{n+1}}\right) \rightarrow 0$.

2). Se tiene que

$$\begin{aligned} (\sqrt{n^2 + 1} - n)n &= \frac{(\sqrt{n^2 + 1} - n)(\sqrt{n^2 + 1} + n)}{(\sqrt{n^2 + 1} + n)}n \\ &= \frac{n^2 + 1 - n^2}{(\sqrt{n^2 + 1} + n)}n \\ &= \frac{n}{(\sqrt{n^2 + 1} + n)} \\ &= \frac{1}{(\sqrt{1 + 1/n^2} + 1)}. \end{aligned}$$

Se concluye que $\lim(\sqrt{n^2 + 1} - n)n = 1/2$ (pues $1 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 1$) y P1 (b).

3).

$$\frac{4n^4 + 2n^2}{n^4 + 5n^3 + 3n + 6} = \frac{4 + 2/n^2}{1 + 5/n + 3/n^3 + 6/n^4} \rightarrow 4$$

4). En el numerador, el primer término es nulo, el segundo es nulo por acotado, el tercero es igual a $(2 + 1/n)/(-3 + 3/n)$ por lo que converge a $-2/3$. Es decir, el numerador converge a $-2/3$. En el denominador, el segundo termino es nulo por acotado, el primero es nulo (última propiedad de la semana en el apunte) y, como $n!/n^n \rightarrow 0$ (penúltima propiedad de la semana en el apunte), se sigue que el último término converge a 1. Como el numerado converge a $-2/3$ y el denominador converge a 1, se concluye que $\frac{\frac{2}{n} + \frac{3}{\sqrt{n}} \cos\left(\frac{n^n}{n!}\right) + \frac{2n+1}{3-3n}}{\frac{2^n}{n!} + \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{1-\frac{n!}{n^n}}} \rightarrow -2/3$.

5). Se tiene que

$$\frac{a_n + n}{na_n^2 + 1} = \frac{a_n/n + 1}{a_n a_n + 1/n} \rightarrow \frac{1}{l^2}$$

donde se usó que a_n es acotada en el numerador, y que es convergente en el denominador.

□

Problema 3. (a). ⁴ (2 pts.) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones reales tales que $a_n \leq a$, $b_n \leq b$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Suponga que $a_n + b_n \rightarrow a + b$. Demuestre que $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$.

⁴MA1001 (Primavera 2022), Control 3, P1 b).

(b). ⁵ Sea $a \in \mathbb{R}$ y $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polinomio de grado $k \in \mathbb{N}$. Calcule $\lim p(n) \frac{a^n}{n^n}$.

(c). Sea (b_n) acotada y (a_n) tal que $(1/a_n)$ es nula. Muestre que $\frac{1}{a_n + b_n} \rightarrow 0$.

Solución. (a). Como $a_n \leq a$ y $b_n \leq b$, sumando b_n a la primera y a_n a la segunda se obtienen las desigualdades

$$a_n + b_n \leq a + b_n$$

$$a_n + b_n \leq b + a_n$$

y se sigue que

$$a_n + b_n - a \leq b_n$$

$$a_n + b_n - b \leq a_n$$

y usando la desigualdad del enunciado, se tiene que

$$a_n + b_n - a \leq b_n \leq b$$

$$a_n + b_n - b \leq a_n \leq a.$$

Con esto se tienen las siguientes desigualdades:

$$a_n + b_n - (a + b) \leq b_n - b \leq 0$$

$$a_n + b_n - (a + b) \leq a_n - a \leq 0$$

con lo que, multiplicando todo por -1 , se llega a

$$0 \leq |b - b_n| \leq |a + b - (a_n + b_n)| \quad (1)$$

$$0 \leq |a - a_n| \leq |a + b - (a_n + b_n)|. \quad (2)$$

Sea $\varepsilon > 0$ y sea $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq n_0$, entonces $|a + b - (a_n + b_n)| < \varepsilon$. Entonces para cada $n \geq n_0$, se tiene que $|b - b_n| < \varepsilon$ y $|a - a_n| < \varepsilon$ (por desigualdades (1) y (2)). Con lo que se concluye que $a_n \rightarrow a$ y $b_n \rightarrow b$.

(b). Se tiene que $p(x) = \sum_{i=0}^k b_i x^i$ con lo que

$$\begin{aligned} \lim p(n) \frac{a^n}{n^n} &= \lim \left(\sum_{i=0}^k b_i n^i \right) \frac{a^n}{n^n} \\ &= \lim \sum_{i=0}^k b_i n^i \frac{a^n}{n^n} \\ &= \sum_{i=0}^k \lim b_i n^i \frac{a^n}{n^n} \\ &= \sum_{i=0}^k b_i a^i \lim \frac{a^{n-i}}{n^{n-i}} \\ &= \sum_{i=0}^k b_i a^i 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

donde se utilizó que $a^n/n^n \rightarrow 0$. En efecto, si $\varepsilon > 0$ y N es tal que si $n \geq N$, entonces $a/n < \varepsilon$. Podemos definir $n_0 = \max\{a, N\}$ y se tiene que, si $n \geq n_0$, entonces $a^n/n^n = (a/n)^n \leq a/n < \varepsilon$.

⁵Apunte del Curso (MA1001), semana 9, problema P2.

(c). Sea $M > 0$ tal que $|b_n| \leq M$ para todo n . Sea $\varepsilon > 0$ y sea n_0 tal que para $n \geq n_0$, se tiene que $1/|a_n| < 1/(1/\varepsilon + M)$. Se tiene que

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{|a_n|} &< \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon} + M} \\
 \implies |a_n| &> \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon} + M} \\
 \implies |a_n| - M &> \frac{1}{\varepsilon} \\
 \implies |a_n| - |b_n| &> \frac{1}{\varepsilon} \\
 \implies |a_n| - |-b_n| &> \frac{1}{\varepsilon} \\
 \implies |a_n - (-b_n)| &> \frac{1}{\varepsilon} \\
 \implies |a_n + b_n| &> \frac{1}{\varepsilon} \\
 \implies \frac{1}{|a_n + b_n|} &< \varepsilon
 \end{aligned}$$

con lo que $\frac{1}{a_n + b_n} \rightarrow 0$.

□