

GENERALIDADES

ENTEROPARASITOSIS

Dr. Renzo Tassara O.
Unidad Docente de Parasitología
Facultad de Medicina Universidad de Chile

ENTEROPARASITOSIS

- Agentes parasitarios numerosos
- Mecanismos de infección variados
- Características epidemiológicas diversas
- Características clínicas: comunes y diferenciales

ENTEROPARASITOSIS

Manifestaciones clínicas:

- Diarrea aguda
- Diarrea intermitente y/o recurrente
- Diarrea crónica
- Síndrome disentérico
- Dolor abdominal recurrente
- Meteorismo
- Náuseas
- Vómitos
- Inapetencia
- Falla de incremento ponderal
- Baja de peso
- Síndrome anémico
- Prurito nasal y anal
- Rash urticariales
- Mal dormir
- Otros

ENTEROPARASITOSIS

N
E
M
A
T
O
D
O
S

- *Ascaris lumbricoides*
- *Trichiuris trichiura*
- *Enterobius vermicularis*
- *Anisakis sp.*
- *Strongyloides stercoralis*
- *Uncinarias*
 - *Ancylostoma duodenale*
 - *Necator americano*

ENTEROPARASITOSIS

C
E
S
T
O
D
O
S

- 
- **Taenia solium**
 - **Taenia saginata**
 - **Diphyllobotrium latum**
 - **Hymenolepis nana**

ENTEROPARASITOSIS

P
R
O
T
O
Z
O
O
S

- **Entamoeba histolytica**
- **Giardia intestinalis**
- **Blastocystis hominis**
- **Coccidios intestinales**
 - **Cryptosporidium parvum**
 - **Isospora belli**
 - **Cyclospora cayetanensis**
 - **Sarcocystis hominis**

Enteroparasitosis


FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS

CONTAMINACIÓN FECAL DEL SUELO y FUENTES DE AGUA

SANEAMIENTO AMBIENTAL

FACTORES
SOCIO-CULTURALES

CLIMA



Enteroparasitosis

Sin diferencias por sexo

Frecuencia depende de condiciones de vida

Mecanismo de transmisión

FECALISMO

Mayor frecuencia
en NIÑOS

Mecanismo de transmisión

CARNIVORISMO

Mayor frecuencia
en ADULTOS

ENTEROPARASITOSIS

FECALISMO

- Frecuente en NIÑOS
- Contaminación fecal ambiental
- Vía de ingreso ORAL
- Fuentes de infección:
 - Tierra, agua, alimentos, manos, fomites

ENTEROPARASITOSIS

FECALISMO

- Ascariosis
- Tricocefalosis
- Himenolepiosis
- Amebiosis
- Giardiosis
- Blastocistosis
- Criptosporidiosis
- Ciclosporiasis
- Isosporosis

ENTEROPARASITOSIS

CARNIVORISMO

- Frecuente en ADULTOS
- Hábitos alimentarios y costumbres
- Vía de ingreso ORAL
- Fuentes de infección:
 - Carnes cerdo, vacuno, pescados (crudo o mal cocido)

ENTEROPARASITOSIS

CARNIVORISMO

- Teniosis solium
- Teniosis saginata
- Difilobotriosis
- Anisakiosis
- Sarcocystis hominis

ENTEROPARASITOSIS

ANO-MANO-BOCA

- Frecuente en NIÑOS
- Autoinfecciones
- Vía de infección ORAL
- Fuentes de infección:
 - Márgenes anales, manos

ENTEROPARASITOSIS

ANO-MANO-BOCA

- Enterobius vermicularis
- Himenolepiosis

ENTEROPARASITOSIS

CONTACTO DIRECTO PIEL

- Exposición de piel con suelo
- Contaminación fecal suelo
- Vía de infección CUTANEA
- Fuente de infección: tierra

ENTEROPARASITOSIS

CONTACTO DIRECTO PIEL

- Estrongiloidosis
- Uncinarias: *Necator americano*
Ancylostoma duodenale

ENTEROPARASITOSIS

Protozoos Comensales Intestinales

- *Entamoeba coli*
- *Endolimax nana*
- *Iodamoeba butschli*
- *Chilomastix mesnili*
- *Entamoeba hartmanni*
- *Entamoeba gingivalis*
- Otras.

¿Bajo poder patógeno?

¿Relación con procesos alérgicos?

*Indicadoras de Fecalismo ******