

TUMOR	EDAD (años)	SEXO (M:F)	Huesos más afectados	Ubicación	Comportamiento
OSTEOMA	40-50	2:1	Cráneo y rostro	Frontal	Benigno
Osteoma osteoide	10-30	2:1	Fémur, tibia, húmero, manos, pies, vértebras, peroné	Cortical en la metáfisis	Benigno osteoesclerótico, doloroso
Osteoblastoma	10-30	2:1	Vértebras, tibia, fémur, húmero, pelvis, costillas	Medular en la metáfisis	Benigno
Osteocondroma	10-30	1:1	Fémur, tibia, húmero, pelvis	Cortical en metáfisis	Benigno
Condroma	10-40	1:1	Manos, pies, costillas, fémur, húmero	Médula de diáfisis	Benigno y expansivo
Condrioblastoma	10-25	2:1	Fémur, húmero, tibia, pie, pelvis, escápula	Epifisis adyacente a cartílago	Casi siempre benigno
Fibroma condromixoide	10-25	1:1	Tibia, fémur, pie, pelvis	Metáfisis	Benigno, osteolítico
Defecto fibroso cortical	<15		Fémur, húmero, tibia	Metáfisis	Involución espontánea
Displasia fibrosa	10-30	3:2	Costillas, fémur, tibia, mandíbula, cráneo	Médula de diáfisis o de metáfisis	Localmente agresiva, rara vez se complica con sarcoma
Fibroma no osificante	20-40		Huesos largos	Metáfisis	Benigno, osteolítico; en ocasiones múltiple
Hemangioma	20-50	1:1	Cráneo, vértebras, mandíbula	Médula	Benigno

Adaptado de Rosai-Ackerman